Данный документ вступает в силу с 01.03.2025 (пункт 3).

Зарегистрировано в Минюсте России 23 августа 2024 г. N 79273

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 26 июля 2024 г. N 374н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАЦИЙ И КРИТЕРИЕВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с частью второй статьи 7 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.105 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, приказываю:

1. Утвердить классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2019 г. N 585н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 ноября 2019 г., регистрационный N 56528);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 января 2021 г. N 17н "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к классификациям и критериям, используемым при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2019 г. N 585н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2021 г., регистрационный N 62615);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2021 г. N 680н "О внесении изменения в приложение N 1 к классификациям и критериям, используемым при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2019 г. N 585н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2022 г., регистрационный N 66904).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 г.

Министр

А.О. КОТЯКОВ

Приложение

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 26 июля 2024 г. N 374н

КЛАССИФИКАЦИИ И КРИТЕРИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

I. Общие положения

1. Классификации, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, включают основные виды стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выраженности, основные категории жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий, а также перечень целевых реабилитационных групп инвалидов (детей-инвалидов) в зависимости от структуры и степени выраженности стойких расстройств функций организма и ограничений основных категорий жизнедеятельности.

2. Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основания для установления групп инвалидности (категории "ребенок-инвалид"), а также для определения целевых реабилитационных групп инвалидам (детям-инвалидам).

II. Классификации основных видов стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выраженности

3. К основным видам стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, относятся:

а) нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, личностных особенностей, волевых и побудительных функций, внимания, памяти, психомоторных функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных функций высокого уровня, умственных функций речи, последовательных сложных движений);

б) нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия); письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи; нарушение голосообразования);

в) нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности; вестибулярной функции; боль);

г) нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (движения головы, туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц; статики, координации движений);

д) нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;

е) нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству; аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение размеров тела).

4. Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов.

5. Выделяются 4 степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами:

I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;

II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;

III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов;

IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов.

Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, устанавливается в соответствии с

количественными системами оценки, предусмотренными приложениями N 1 и 2 к настоящим классификациям и критериям.

Если приложениями N 1 и 2 к настоящим классификациям и критериям не предусмотрена количественная оценка степени выраженности стойких нарушений той или иной функции организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, имеющимися у освидетельствуемого лица, то степень выраженности стойких нарушений функций организма человека в процентном выражении устанавливается федеральным учреждением медико-социальной экспертизы в соответствии с абзацами вторым - пятым настоящего пункта исходя из клинико-функциональной характеристики заболеваний, последствий травм или дефектов, обусловивших вышеуказанные нарушения, характера и тяжести осложнений, стадии, течения и прогноза патологического процесса.

При наличии нескольких стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, отдельно оценивается и устанавливается степень выраженности каждого из нарушений функций организма в процентах. Сначала устанавливается максимально выраженное в процентах нарушение той или иной функции организма человека, после чего определяется наличие (отсутствие) влияния всех других имеющихся стойких нарушений функций организма человека на максимально выраженное нарушение функции организма человека. При наличии указанного влияния суммарная оценка степени нарушения функции организма человека в процентном выражении может быть выше максимально выраженного нарушения функций организма, но не более чем на 10 процентов.

III. Классификации основных категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий

6. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:

а) способность к самообслуживанию;

б) способность к самостоятельному передвижению;

в) способность к ориентации;

г) способность к общению;

д) способность контролировать свое поведение;

е) способность к обучению;

ж) способность к трудовой деятельности.

7. Выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности человека, предусмотренных пунктом 6 настоящих классификаций и критериев:

а) способность к самообслуживанию - способность человека самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе использовать навыки личной гигиены:

1 степень - способность к самообслуживанию при более длительном затрачивании времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при необходимости

вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и уходе, полная зависимость от других лиц;

б) способность к самостоятельному передвижению - способность самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом:

1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более длительном затрачивании времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к самостоятельному передвижению с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;

в) способность к ориентации - способность к адекватному восприятию личности и окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению времени и места нахождения:

1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к ориентации с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к ориентации (дезориентация) и нуждаемость в постоянной помощи и (или) надзоре других лиц;

г) способность к общению - способность к установлению контактов между людьми путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации:

1 степень - способность к общению со снижением темпа и объема получения и передачи информации, использование при необходимости вспомогательных технических средств, при изолированном поражении органа слуха - способность к общению с использованием невербальных способов общения и услуг по переводу русского жестового языка;

2 степень - способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;

д) способность контролировать свое поведение - способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических норм:

1 степень - периодически возникающее ограничение способности контролировать свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции;

2 степень - постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц;

3 степень - неспособность контролировать свое поведение, невозможность его коррекции, нуждаемость в постоянной помощи (надзоре) других лиц;

е) способность к обучению - способность к целенаправленному процессу организации деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том числе профессионального, социального, культурного, бытового характера), развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения образования в течение всей жизни:

1 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий (при необходимости) для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучение с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии, а также при невозможности обучения по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучение на дому с учетом заключения медицинской организации;

2 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий для получения образования только по адаптированным образовательным программам при необходимости обучение на дому по заключению медицинской организации и (или) с использованием дистанционных образовательных технологий с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

3 степень - способность к обучению только элементарным навыкам и умениям (профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе правилам выполнения только элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой сфере, в том числе на дому, по заключению медицинской организации, или ограниченные возможности способности к такому обучению в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма, определяемые с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

ж) способность к трудовой деятельности - способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям выполнения работы:

1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу по основной профессии (должности, специальности) при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации;

2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств;

3 степень - способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со значительной

помощью других лиц или невозможность (противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма.

8. Степень выраженности ограничения основных категорий жизнедеятельности человека определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей определенному периоду (возрасту) биологического развития человека.

IV. Критерий для установления инвалидности

9. Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте 18 лет и старше является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты.

Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной защиты ребенка.

V. Критерии для установления групп инвалидности и категории "ребенок-инвалид"

10. Критерии для установления групп инвалидности и категории "ребенок-инвалид" применяются после установления гражданину инвалидности в соответствии с критерием для установления инвалидности, предусмотренным пунктом 9 настоящих классификаций и критериев.

11. Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека с IV степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 90 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

12. Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с III степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

13. Критерием для установления третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со II степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 60 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

14. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается при наличии у ребенка II, III либо IV степени выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами.

VI. Перечень целевых реабилитационных групп, определяемых инвалидам, детям-инвалидам

15. Перечень целевых реабилитационных групп (далее - ЦРГ), определяемых при установлении группы инвалидности, включает:

а) ЦРГ 1 - инвалиды с преимущественными нарушениями психических функций, в том числе:

ЦРГ 1.1 - инвалиды вследствие нарушений интеллектуального развития;

ЦРГ 1.2 - инвалиды вследствие расстройств аутистического спектра;

ЦРГ 1.3 - инвалиды вследствие экзогенно-органических расстройств, а также эпизодических и пароксизмальных расстройств;

ЦРГ 1.4 - инвалиды вследствие эндогенных, аффективных, невротических и соматоформных расстройств;

б) ЦРГ 2 - инвалиды с преимущественными нарушениями языковых и речевых функций;

в) ЦРГ 3 - инвалиды с преимущественными нарушениями сенсорных функций, в том числе:

ЦРГ 3.1 - инвалиды вследствие слепоты или слабовидения;

ЦРГ 3.2 - инвалиды вследствие глухоты или слабослышания;

ЦРГ 3.3 - инвалиды вследствие сочетанных нарушений функций зрения и слуха;

г) ЦРГ 4 - инвалиды с преимущественными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, в том числе:

ЦРГ 4.1 - инвалиды вследствие церебрального паралича и других заболеваний, аномалий (пороков развития) центральной и периферической нервной системы, последствий травм периферической нервной системы, головного мозга и острых нарушений мозгового кровообращения;

ЦРГ 4.2 - инвалиды вследствие заболеваний костно-мышечной системы, а также последствий травм и аномалий (пороков развития), деформаций опорно-двигательного аппарата;

ЦРГ 4.3 - инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной верхней конечности;

ЦРГ 4.4 - инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обеих верхних конечностей;

ЦРГ 4.5 - инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной нижней конечности;

ЦРГ 4.6 - инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обеих нижних конечностей;

ЦРГ 4.7 - инвалиды вследствие спинальной травмы и связанных с ней повреждений спинного мозга;

д) ЦРГ 5 - инвалиды с преимущественными нарушениями функций сердечно-сосудистой и (или) дыхательной системы (систем);

е) ЦРГ 6 - инвалиды с преимущественными нарушениями функций пищеварительной и (или)

эндокринной системы (систем) и метаболизма;

ж) ЦРГ 7 - инвалиды с преимущественными нарушениями функций системы крови и иммунной системы, в том числе вследствие злокачественных новообразований, а также отдельных инфекционных заболеваний;

з) ЦРГ 8 - инвалиды с преимущественными нарушениями мочевыделительной функции;

и) ЦРГ 9 - инвалиды с преимущественными нарушениями функций кожи и связанных с ней систем;

к) ЦРГ 10 - инвалиды со сложными и (или) множественными нарушениями функций организма, обусловленными хромосомными и генными болезнями;

л) ЦРГ 11 - инвалиды с врожденными или приобретенными деформациями (аномалиями развития), последствиями травм лица;

м) ЦРГ 12 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, в том числе:

ЦРГ 12.1 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) одной верхней конечности;

ЦРГ 12.2 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) обеих верхних конечностей;

ЦРГ 12.3 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) одной нижней конечности;

ЦРГ 12.4 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) обеих нижних конечностей;

ЦРГ 12.5 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями травм, термических и химических ожогов, отморожений конечностей с формированием анкилозов, контрактур и стягивающих рубцов;

ЦРГ 12.6 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями спинальной травмы и связанных с ней повреждений спинного мозга;

ЦРГ 12.7 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями поражения периферической нервной системы;

ЦРГ 12.8 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями поражения мозгового отдела черепа и головного мозга;

ЦРГ 12.9 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями поражения лицевого отдела черепа, в том числе с одновременным нарушением функций жевания, глотания, голосообразования,

зрения или слуха;

ЦРГ 12.10 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями поражения органа зрения;

ЦРГ 12.11 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями поражения органа слуха;

ЦРГ 12.12 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями поражения внутренних органов, в том числе с аномальными отверстиями пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов;

ЦРГ 12.13 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями множественных ранений или комбинированной травмы с одновременными нарушениями различных функций организма человека;

н) ЦРГ 13 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, в том числе:

ЦРГ 13.1 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) одной верхней конечности;

ЦРГ 13.2 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) обеих верхних конечностей;

ЦРГ 13.3 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) одной нижней конечности;

ЦРГ 13.4 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия обеих нижних конечностей;

ЦРГ 13.5 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие травм, термических и химических ожогов, отморожений конечностей с формированием анкилозов, контрактур и стягивающих рубцов;

ЦРГ 13.6 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие спинальной травмы и связанных с ней повреждений спинного мозга;

ЦРГ 13.7 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие поражения периферической нервной системы;

ЦРГ 13.8 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие поражения мозгового отдела черепа и головного мозга;

ЦРГ 13.9 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие поражения лицевого отдела черепа, в том числе с одновременным нарушением функций жевания, глотания, голосообразования, зрения или слуха;

ЦРГ 13.10 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие поражения органа зрения;

ЦРГ 13.11 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие поражения органа слуха;

ЦРГ 13.12 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие поражения внутренних органов, в том числе с аномальными отверстиями пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов;

ЦРГ 13.13 - инвалиды, получившие травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие комбинированной травмы или множественных ранений с одновременными нарушениями различных функций организма человека.

16. Перечень ЦРГ, определяемых при установлении категории "ребенок-инвалид", включает:

а) ЦРГ 1 - ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями психических функций, в том числе:

ЦРГ 1.1 - ребенок-инвалид вследствие нарушений интеллектуального развития и расстройств развития учебных навыков;

ЦРГ 1.2 - ребенок-инвалид вследствие расстройств аутистического спектра;

ЦРГ 1.3 - ребенок-инвалид вследствие экзогенно-органических расстройств, а также эпизодических и пароксизмальных расстройств;

ЦРГ 1.4 - ребенок-инвалид вследствие эндогенных, аффективных, невротических и соматоформных расстройств;

б) ЦРГ 2 - ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями языковых и речевых функций;

в) ЦРГ 3 - ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями сенсорных функций, в том числе:

ЦРГ 3.1 - ребенок-инвалид вследствие слепоты или слабовидения;

ЦРГ 3.2 - ребенок-инвалид вследствие глухоты или слабослышания;

ЦРГ 3.3 - ребенок-инвалид вследствие сочетанных нарушений функций зрения и слуха;

г) ЦРГ 4 - ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, в том числе:

ЦРГ 4.1 - ребенок-инвалид вследствие церебрального паралича и других заболеваний, аномалий (пороков развития) центральной и периферической нервной системы, последствий травм периферической нервной системы, головного мозга и острых нарушений мозгового кровообращения;

ЦРГ 4.2 - ребенок-инвалид вследствие заболеваний костно-мышечной системы, а также последствий травм и аномалий (пороков развития), деформаций опорно-двигательного аппарата;

ЦРГ 4.3 - ребенок-инвалид вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной верхней конечности;

ЦРГ 4.4 - ребенок-инвалид вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обеих верхних конечностей;

ЦРГ 4.5 - ребенок-инвалид вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной нижней конечности;

ЦРГ 4.6 - ребенок-инвалид вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обеих нижних конечностей;

ЦРГ 4.7 - ребенок-инвалид вследствие шейной или спинальной травмы и связанных с ней повреждений спинного мозга;

д) ЦРГ 5 - ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями функций сердечно-сосудистой и (или) дыхательной системы (систем);

е) ЦРГ 6 - ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями функций пищеварительной и (или) эндокринной системы (систем) и метаболизма;

ж) ЦРГ 7 - ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями функций системы крови и иммунной системы, в том числе вследствие злокачественных новообразований, а также отдельных инфекционных заболеваний;

з) ЦРГ 8 - ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями мочевыделительной функции;

и) ЦРГ 9 - ребенок-инвалид с преимущественными нарушениями функций кожи и связанных с ней систем;

к) ЦРГ 10 - ребенок-инвалид со сложными и (или) множественными нарушениями функций организма, обусловленными хромосомными и генными болезнями;

л) ЦРГ 11 - ребенок-инвалид с врожденными или приобретенными деформациями (аномалиями развития), последствиями травм лица;

м) ЦРГ 12 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, в том числе:

ЦРГ 12.1 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) одной верхней конечности;

ЦРГ 12.2 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) обеих верхних конечностей;

ЦРГ 12.3 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) одной нижней конечности;

ЦРГ 12.4 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) обеих нижних конечностей;

ЦРГ 12.5 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие травм, термических и химических ожогов, отморожений конечностей с формированием анкилозов, контрактур и стягивающих рубцов;

ЦРГ 12.6 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие спинальной травмы и связанных с ней повреждений спинного мозга;

ЦРГ 12.7 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с

боевыми действиями, вследствие поражения периферической нервной системы;

ЦРГ 12.8 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие поражения мозгового отдела черепа и головного мозга;

ЦРГ 12.9 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие поражения лицевого отдела черепа, в том числе с одновременным нарушением функций жевания, глотания, голосообразования, зрения или слуха;

ЦРГ 12.10 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие поражения органа зрения;

ЦРГ 12.11 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие поражения органа слуха;

ЦРГ 12.12 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие поражения внутренних органов, в том числе с аномальными отверстиями пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов;

ЦРГ 12.13 - ребенок-инвалид, получивший травму, ранение, контузию, увечье в связи с боевыми действиями, вследствие комбинированной травмы или множественных ранений с одновременными нарушениями различных функций организма человека.

В электронном документе нумерация разделов соответствует официальному источнику.

VI. Критерии для определения ЦРГ инвалидам, детям-инвалидам

17. Критерии для определения ЦРГ применяются после установления гражданину группы инвалидности (категории "ребенок-инвалид") в соответствии с критериями для установления групп инвалидности и категории "ребенок-инвалид", предусмотренными пунктами 11 - 14 настоящих классификаций и критериев.

18. Критерием для определения ЦРГ 1 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения психических функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие психических расстройств и расстройств поведения, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

ЦРГ 1 инвалида определяется в случае невозможности определения ЦРГ 1.1 инвалида - ЦРГ 1.4 инвалида по критериям, предусмотренным соответственно подпунктами 18.1 - 18.4 настоящего пункта.

18.1. Критерием для определения ЦРГ 1.1 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения психических функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие умственной отсталости, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

18.2. Критерием для определения ЦРГ 1.2 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие

нарушения психических функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие общих расстройств психологического развития, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

18.3. Критерием для определения ЦРГ 1.3 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения психических функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие органических, включая симптоматические, психических расстройств, хронических цереброваскулярных болезней и (или) эпизодических и пароксизмальных расстройств, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

18.4. Критерием для определения ЦРГ 1.4 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения психических функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие шизофрении, шизотипических и бредовых расстройств или расстройств настроения (аффективных расстройств) или невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

19. Критерием для определения ЦРГ 2 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения языковых и речевых функций II либо III степени выраженности (в диапазоне от 40 до 80 процентов) вследствие афазии (дисфазии), афонии (дисфонии), дизартрии различного генеза, приводящие к ограничению 2 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

20. Критерием для определения ЦРГ 3 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, их комбинации) II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие заболеваний, последствий травм, дефектов развития глаза и его придаточного аппарата или (и) уха и сосцевидного отростка, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

ЦРГ 3 инвалида определяется в случае невозможности определения ЦРГ 3.1 инвалида - ЦРГ 3.3 инвалида по критериям, предусмотренным соответственно подпунктами 20.1 - 20.3 настоящего пункта.

20.1. Критерием для определения ЦРГ 3.1 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие заболеваний, последствий травм, дефектов развития глаза и его придаточного аппарата, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

20.2. Критерием для определения ЦРГ 3.2 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие

нарушения сенсорных функций (слуха) II степени выраженности (в диапазоне от 40 до 60 процентов) вследствие заболеваний, последствий травм, дефектов развития уха и сосцевидного отростка (слабослышание, глухота), в том числе в сочетании с нарушениями языковых и речевых функций любой степени выраженности (в диапазоне от 10 до 100 процентов) (слабослышание или глухота в сочетании с нарушениями активной устной речи, глухонемота без нарушений психических функций), приводящие к ограничению 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, а также глухонемота в сочетании с нарушениями психических функций любой степени выраженности (в диапазоне от 10 до 100 процентов), приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

20.3. Критерием для определения ЦРГ 3.3 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие заболеваний, последствий травм, дефектов развития глаза и его придаточного аппарата в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) II степени выраженности (в диапазоне от 40 до 60 процентов) вследствие заболеваний, последствий травм, дефектов развития уха и сосцевидного отростка (слабовидение со слабослышанием, слепоглухота), в том числе в сочетании с нарушениями языковых и речевых функций любой степени выраженности (в диапазоне от 10 до 100 процентов) (слабовидение со слабослышанием или слепоглухота в сочетании с нарушениями активной устной речи, слепоглухонемота), приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

21. Критерием для определения ЦРГ 4 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие заболеваний, врожденных аномалий (пороков развития), последствий травм центральной и периферической нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, последствий острых цереброваскулярных болезней, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

ЦРГ 4 инвалида определяется в случае невозможности определения ЦРГ 4.1 инвалида - ЦРГ 4.7 инвалида по критериям, предусмотренным соответственно подпунктами 21.1 - 21.7 настоящего пункта.

21.1. Критерием для определения ЦРГ 4.1 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие церебрального паралича и других заболеваний, аномалий (пороков развития), последствий травм центральной и периферической нервной системы, последствий острых цереброваскулярных болезней, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

21.2. Критерием для определения ЦРГ 4.2 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие заболеваний костно-мышечной системы, а также последствий травм и аномалий (пороков развития), деформаций опорно-двигательного аппарата (кроме врожденного или приобретенного отсутствия конечностей), приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

21.3. Критерием для определения ЦРГ 4.3 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III степени выраженности (в диапазоне от 40 до 80 процентов) вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной верхней конечности (пальцев руки, кисти, предплечья, плеча) на любом уровне, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

21.4. Критерием для определения ЦРГ 4.4 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обеих верхних конечностей (пальцев рук, кистей, предплечий, плеч) на любом уровне в любой комбинации, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

21.5. Критерием для определения ЦРГ 4.5 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III степени выраженности (в диапазоне от 40 до 80 процентов) вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной нижней конечности (стопы, голени, бедра) на любом уровне, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

21.6. Критерием для определения ЦРГ 4.6 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обеих нижних конечностей (стоп, голеней, бедер) на любом уровне в любой комбинации, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

21.7. Критерием для определения ЦРГ 4.7 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие травм шеи, позвоночника, спинного мозга, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их

различных сочетаниях.

22. Критерием для определения ЦРГ 5 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения функций сердечно-сосудистой и (или) дыхательной системы (систем) II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, трансплантаций сердца, легкого, легочно-сердечного комплекса, наличия внутрисердечных имплантантов, аномальных отверстий дыхательного тракта, врожденных аномалий (пороков развития) системы кровообращения и органов дыхания, туберкулеза легких, муковисцидоза (кистозного фиброза), приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

23. Критерием для определения ЦРГ 6 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения функций пищеварительной и (или) эндокринной системы (систем) и метаболизма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие болезней органов пищеварения, трансплантации печени, кишечника, аномальных отверстий пищеварительного тракта, врожденных аномалий (пороков развития) органов пищеварения, болезней эндокринной системы, расстройств питания, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

24. Критерием для определения ЦРГ 7 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения функций системы крови и иммунной системы II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие злокачественных новообразований различных локализаций, в том числе злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, новообразований in situ, болезней крови и кроветворных органов, отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, ВИЧ-инфекции, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

25. Критерием для определения ЦРГ 8 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения мочевыделительной функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие болезней мочеполовой системы, трансплантации почки, наличия аномальных отверстий мочевыделительного тракта, врожденных аномалий (пороков развития) мочевыделительной системы, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

26. Критерием для определения ЦРГ 9 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения функций кожи и связанных с ней систем II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие болезней кожи и ее придатков, врожденных аномалий (пороков развития) кожи и ее придатков, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

27. Критерием для определения ЦРГ 10 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие

нарушения одной или нескольких функций организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие хромосомных и генных болезней, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

28. Критерием для определения ЦРГ 11 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения функций организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные физическим внешним уродством вследствие врожденных или приобретенных деформаций (аномалий развития), последствий травм лица, в том числе с одновременным нарушением жевания, глотания, дыхания, голосообразования, зрения и слуха, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29. Критерием для определения ЦРГ 12 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения различных функций организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

ЦРГ 12 инвалида определяется в случае невозможности определения ЦРГ 12.1 инвалида - ЦРГ 12.13 инвалида по критериям, предусмотренным соответственно подпунктами 29.1 - 29.13 настоящего пункта.

ЦРГ 12 инвалида, ЦРГ 12.1 инвалида - ЦРГ 12.13 инвалида определяются при наличии документов, подтверждающих факт получения инвалидом ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания в связи с участием в боевых действиях.

29.1. Критерием для определения ЦРГ 12.1 являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III степени выраженности (в диапазоне от 40 до 80 процентов), обусловленные утратой верхней конечности на любом уровне в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29.2. Критерием для определения ЦРГ 12.2 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные утратой обеих верхних конечностей на любом уровне в любых комбинациях в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29.3. Критерием для определения ЦРГ 12.3 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением

(статодинамических) функций II, III степени выраженности (в диапазоне от 40 до 80 процентов), обусловленные утратой нижней конечности на любом уровне в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29.4. Критерием для определения ЦРГ 12.4 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные утратой обеих нижних конечностей на любом уровне в любых комбинациях в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29.5. Критерием для определения ЦРГ 12.5 инвалида, являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные поражением верхней или (и) нижней конечности (конечностей) (кроме ампутаций) в любых комбинациях в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29.6. Критерием для определения ЦРГ 12.6 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные поражением спинного мозга с умеренной, выраженной, значительно выраженной неврологической симптоматикой в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29.7. Критерием для определения ЦРГ 12.7 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные поражением отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, других отделов периферической нервной системы в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29.8. Критерием для определения ЦРГ 12.8 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) или (и) нарушения психических функций II, III либо IV степени выраженности (в

диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные поражением головного мозга в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29.9. Критерием для определения ЦРГ 12.9 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения различных функций организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные физическим внешним уродством в связи с поражением лицевого отдела черепа, в том числе с одновременным нарушением жевания, глотания, дыхания, голосообразования, зрения или слуха, в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29.10. Критерием для определения ЦРГ 12.10 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные поражением органа зрения в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29.11. Критерием для определения ЦРГ 12.11 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (слуха) II степени выраженности (в диапазоне от 40 до 60 процентов), обусловленные поражением органа слуха в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29.12. Критерием для определения ЦРГ 12.12 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные поражением внутренних органов, кожи в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

29.13. Критерием для определения ЦРГ 12.13 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных функций (зрения, слуха) нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем, последствий травм лица II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные комбинированными и сочетанными поражениями органов и

систем организма человека в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

30. Критерием для определения ЦРГ 13 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения различных функций организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с участием в боевых действиях, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

ЦРГ 13 инвалида определяется в случае невозможности определения ЦРГ 13.1 инвалида - ЦРГ 13.13 инвалида по критериям, предусмотренным соответственно подпунктами 30.1 - 30.13 настоящего пункта.

ЦРГ 13 инвалида, ЦРГ 13.1 инвалида - ЦРГ 13.13 инвалида определяются при наличии документов, подтверждающих факт получения инвалидом травмы, ранения, контузии, увечья в связи с боевыми действиями.

30.1. Критерием для определения ЦРГ 13.1 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III степени выраженности (в диапазоне от 40 до 80 процентов), связанные с утратой верхней конечности на любом уровне в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

30.2. Критерием для определения ЦРГ 13.2 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), связанные с утратой обеих верхних конечностей на любом уровне в любых комбинациях в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

30.3. Критерием для определения ЦРГ 13.3 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III степени выраженности (в диапазоне от 40 до 80 процентов), связанные с утратой нижней конечности на любом уровне в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

30.4. Критерием для определения ЦРГ 13.4 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100

процентов), связанные с утратой обеих нижних конечностей на любом уровне в любых комбинациях в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

30.5. Критерием для определения ЦРГ 13.5 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие поражения верхней или (и) нижней конечности (конечностей) в любых комбинациях, приведших к нарушению функций конечности (конечностей) (кроме ампутаций) в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

30.6. Критерием для определения ЦРГ 13.6 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие поражения спинного мозга с умеренной, выраженной, значительно выраженной неврологической симптоматикой в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

30.7. Критерием для определения ЦРГ 13.7 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие поражений отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатий и других поражений периферической нервной системы в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями,

30.8. Критерием для определения ЦРГ 13.8 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) или (и) нарушения психических функций организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие поражений головного мозга в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

30.9. Критерием для определения ЦРГ 13.9 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения функций организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные физическим внешним уродством в связи с повреждением лица, в том числе с одновременным нарушением жевания, глотания, дыхания, голосообразования, зрения или слуха, в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их

различных сочетаниях.

30.10. Критерием для определения ЦРГ 13.10 являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие поражения органа зрения в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

30.11. Критерием для определения ЦРГ 13.11 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (слуха) II степени выраженности (в диапазоне от 40 до 60 процентов) вследствие поражения органа слуха в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

30.12. Критерием для определения ЦРГ 13.12 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие поражения внутренних органов, кожи в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

30.13. Критерием для определения ЦРГ 13.13 инвалида являются имеющиеся у инвалида стойкие нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных функций (зрения, слуха) нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем, последствия травм лица II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие комбинированных и сочетанных поражений органов и систем в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях.

31. Критерием для определения ЦРГ 1 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения психических функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие психических расстройств и расстройств поведения, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

ЦРГ 1 ребенок-инвалид определяется в случае невозможности определения ЦРГ 1.1 ребенок-инвалид - ЦРГ 1.4 ребенок-инвалид по критериям, предусмотренным соответственно

подпунктами 31.1 - 31.4 настоящего пункта.

31.1. Критерием для определения ЦРГ 1.1 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида нарушения психических функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие умственной отсталости или специфических расстройств (задержек) психологического развития, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

31.2. Критерием для определения ЦРГ 1.2 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения психических функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие общих расстройств психологического развития, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

31.3. Критерием для определения ЦРГ 1.3 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения психических функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие органических, включая симптоматические, психических расстройств, хронических цереброваскулярных болезней и (или) эпизодических и пароксизмальных расстройств, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

31.4. Критерием для определения ЦРГ 1.4 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения психических функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие шизофрении, шизотипических и бредовых расстройств или расстройств настроения (аффективных расстройств) или невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

32. Критерием для определения ЦРГ 2 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения языковых и речевых функций II либо III степени выраженности (в диапазоне от 40 до 80 процентов) вследствие специфических расстройств развития речи и языка, а также приобретенных афазии (дисфазии), афонии (дисфонии), дизартрии различного генеза, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

33. Критерием для определения ЦРГ 3 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, их комбинации) II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие заболеваний, последствий травм, дефектов развития глаза и его придаточного аппарата или (и) уха и сосцевидного отростка, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

ЦРГ 3 ребенок-инвалид определяется в случае невозможности определения ЦРГ 3.1 ребенок-инвалид - ЦРГ 3.3 ребенок-инвалид по критериям, предусмотренным соответственно подпунктами 33.1 - 33.3 настоящего пункта.

33.1. Критерием для определения ЦРГ 3.1 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие заболеваний, последствий травм, дефектов развития глаза и его придаточного аппарата, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

33.2. Критерием для определения ЦРГ 3.2 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (слуха) II степени выраженности (в диапазоне от 40 до 60 процентов) вследствие заболеваний, последствий травм, дефектов развития уха и сосцевидного отростка (слабослышание, глухота), в том числе в сочетании с нарушениями языковых и речевых функций любой степени выраженности (в диапазоне от 10 до 100 процентов) (слабослышание или глухота в сочетании с нарушениями активной устной речи, глухонемота без нарушений психических функций), а также глухонемота в сочетании с нарушениями психических функций любой степени выраженности (в диапазоне от 10 до 100 процентов), приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

33.3. Критерием для определения ЦРГ 3.3 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие заболеваний, последствий травм, дефектов развития глаза и его придаточного аппарата в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) II степени выраженности (в диапазоне от 40 до 60 процентов) вследствие заболеваний, последствий травм, дефектов развития уха и сосцевидного отростка (слабовидение со слабослышанием, слепоглухота), в том числе в сочетании с нарушениями языковых и речевых функций любой степени выраженности (в диапазоне от 10 до 100 процентов) (слабовидение со слабослышанием или слепоглухота в сочетании с нарушениями активной устной речи, слепоглухонемота), приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

34. Критерием для определения ЦРГ 4 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие заболеваний, врожденных аномалий (пороков развития), последствий травм центральной и периферической нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, последствий острых цереброваскулярных болезней, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

ЦРГ 4 ребенок-инвалид определяется в случае невозможности определения ЦРГ 4.1 ребенок-инвалид - ЦРГ 4.7 ребенок-инвалид по критериям, предусмотренным соответственно подпунктами 34.1 - 34.7 настоящего пункта.

34.1. Критерием для определения ЦРГ 4.1 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие церебрального паралича и других заболеваний, аномалий (пороков развития), последствий травм центральной и периферической нервной системы, последствий острых цереброваскулярных болезней, приводящие к ограничению любой категории

жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

34.2. Критерием для определения ЦРГ 4.2 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие артропатий, системных поражений соединительной ткани, дорсопатий, болезней мягких тканей (мышц, синовиальных оболочек, сухожилий), остеопатий и хондропатий, других нарушений костно-мышечной системы и соединительной ткани, последствий травм туловища, конечностей, последствий термических и химических ожогов и отморожений туловища и конечностей (кроме последствий травм позвоночника, ампутаций конечностей), травм, захватывающих несколько областей тела, врожденных аномалий и деформаций костно-мышечной системы (кроме врожденного отсутствия конечностей), приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

34.3. Критерием для определения ЦРГ 4.3 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III степени выраженности (в диапазоне от 40 до 80 процентов) вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной верхней конечности (пальцев руки, кисти, предплечья, плеча) на любом уровне, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

34.4. Критерием для определения ЦРГ 4.4 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обоих верхних конечностей (пальцев рук, кистей, предплечий, плеч) на любом уровне в любой комбинации, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

34.5. Критерием для определения ЦРГ 4.5 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III степени выраженности (в диапазоне от 40 до 80 процентов) вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной нижней конечности (стопы, голени, бедра) на любом уровне, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

34.6. Критерием для определения ЦРГ 4.6 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обоих нижних конечностей (стоп, голеней, бедер) на любом уровне в любой комбинации, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

34.7. Критерием для определения ЦРГ 4.7 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением

(статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие травм шеи, позвоночника, спинного мозга, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

35. Критерием для определения ЦРГ 5 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения функций сердечно-сосудистой и (или) дыхательной системы (систем) II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, трансплантаций сердца, легкого, легочно-сердечного комплекса, наличия внутрисердечных имплантантов, аномальных отверстий дыхательного тракта, врожденных аномалий (пороков развития) системы кровообращения и органов дыхания, туберкулеза легких, муковисцидоза (кистозного фиброза), приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

36. Критерием для определения ЦРГ 6 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения функций пищеварительной системы и (или) эндокринной системы и метаболизма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие болезней органов пищеварения, трансплантации печени, кишечника, аномальных отверстий пищеварительного тракта, врожденных аномалий (пороков развития) органов пищеварения, болезней эндокринной системы, расстройств питания, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

37. Критерием для определения ЦРГ 7 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения функций системы крови и иммунной системы II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие злокачественных новообразований различных локализаций, в том числе злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, новообразований in situ, болезней крови и кроветворных органов, отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, ВИЧ-инфекции, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

38. Критерием для определения ЦРГ 8 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения мочевыделительной функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие болезней мочеполовой системы, трансплантации почки, наличия аномальных отверстий мочевыделительного тракта, врожденных аномалий (пороков развития) мочевыделительной системы, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

39. Критерием для определения ЦРГ 9 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения функций кожи и связанных с ней систем II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие болезней кожи и ее придатков, врожденных аномалий (пороков развития) кожи и ее придатков, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

40. Критерием для определения ЦРГ 10 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения одной или нескольких функций организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие хромосомных и генных болезней, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

41. Критерием для определения ЦРГ 11 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения функций организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные физическим внешним уродством вследствие врожденных или приобретенных деформаций (аномалий развития), последствий травм лица, в том числе с одновременным нарушением жевания, глотания, дыхания, голосообразования, зрения и слуха, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

42. Критерием для определения ЦРГ 12 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

ЦРГ 12 ребенок-инвалид определяется в случае невозможности определения ЦРГ 12.1 ребенок-инвалид - ЦРГ 12.13 ребенок-инвалид по критериям, предусмотренным соответственно подпунктами 42.1 - 42.13 настоящего пункта.

ЦРГ 12 ребенок-инвалид, ЦРГ 12.1 ребенок-инвалид - ЦРГ 13.13 ребенок-инвалид определяются при наличии документов, подтверждающих факт получения ребенком-инвалидом травмы, ранения, контузии, увечья в связи с боевыми действиями.

42.1. Критерием для определения ЦРГ 12.1 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III степени выраженности (в диапазоне от 40 до 80 процентов), вследствие утраты верхней конечности на любом уровне в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

42.2. Критерием для определения ЦРГ 12.2 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), вследствие утраты обеих верхних конечностей на любом уровне в любых комбинациях в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

42.3. Критерием для определения ЦРГ 12.3 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III степени выраженности (в диапазоне от 40 до 80 процентов), вследствие утраты нижней конечности на любом уровне в результате травмы,

ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

42.4. Критерием для определения ЦРГ 12.4 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), вследствие утраты обеих нижних конечностей на любом уровне в любых комбинациях в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

42.5. Критерием для определения ЦРГ 12.5 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), вследствие поражения верхней или (и) нижней конечности (конечностей) в любых комбинациях (кроме ампутаций) в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

42.6. Критерием для определения ЦРГ 12.6 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие поражения спинного мозга с умеренной, выраженной, значительно выраженной неврологической симптоматикой в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

42.7. Критерием для определения ЦРГ 12.7 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие поражений отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатий и других поражений периферической нервной системы в результате ранения (травмы, контузии, увечья) или заболевания, полученного в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

42.8. Критерием для определения ЦРГ 12.8 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) или (и) нарушения психических функций организма II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие поражений головного мозга в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

42.9. Критерием для определения ЦРГ 12.9 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения функций организма II, III либо IV степени

выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленные физическим внешним уродством в связи поражением лицевого отдела черепа, в том числе с одновременным нарушением жевания, глотания, дыхания, голосообразования, зрения или слуха, в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

42.10. Критерием для определения ЦРГ 12.10 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие поражения органа зрения в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

42.11. Критерием для определения ЦРГ 12.11 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения сенсорных функций (слуха) II степени выраженности (в диапазоне от 40 до 60 процентов) вследствие поражения органа слуха в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

42.12. Критерием для определения ЦРГ 12.12 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие поражения внутренних органов, кожи в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности

42.13. Критерием для определения ЦРГ 12.13 ребенок-инвалид являются имеющиеся у ребенка-инвалида стойкие нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных функций (зрения, слуха) нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем, повреждения лица II, III либо IV степени выраженности (в диапазоне от 40 до 100 процентов) вследствие комбинированных и сочетанных поражений органов и систем в результате травмы, ранения, контузии, увечья, полученных в связи с боевыми действиями, приводящие к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности.

43. При сочетании имеющихся у инвалида (ребенка-инвалида) стойких нарушений различных функций организма и ограничений жизнедеятельности, отнесенных к критериям для определения различных ЦРГ, инвалиду (ребенку-инвалиду) определяются несколько ЦРГ.

44. Определение ЦРГ инвалидам осуществляется с учетом результатов количественной оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма гражданина в возрасте 18 лет и старше (в процентах, применительно к клинико-функциональной характеристике стойких нарушений функций организма человека), предусмотренной

приложением N 1 к настоящим классификациям и критериям.

Определение ЦРГ детям-инвалидам осуществляется с учетом результатов количественной оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет (в процентах, применительно к клинико-функциональной характеристике стойких нарушений функций организма человека), предусмотренной приложением N 2 к настоящим классификациям и критериям.

Если приложениями N 1 и 2 к настоящим классификациям и критериям не предусмотрено соотнесение результатов количественной оценки степени выраженности стойких расстройств функций организма человека, имеющихся у инвалида (ребенка-инвалида), с той или иной ЦРГ, то ЦРГ (несколько ЦРГ) инвалиду (ребенку-инвалиду) определяется (определяются) федеральным учреждением медико-социальной экспертизы исходя из имеющихся у инвалида (ребенка-инвалида) стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, ограничений его жизнедеятельности и целей комплексной реабилитации и абилитации, а также с учетом клинико-функциональной характеристики конкретного заболевания, последствий травмы или дефекта, обусловивших стойкие нарушения функций организма человека и ограничения жизнедеятельности.

Приложение N 1

к классификациям и критериям,

используемым при осуществлении

медико-социальной экспертизы

граждан федеральными учреждениями

медико-социальной экспертизы,

утвержденным приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от 26 июля 2024 г. N 374н

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ (В ПРОЦЕНТАХ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА)

болезней Б-10 <1>)	Блоки болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствий	Рубрика МКБ-10 (код)	Виды стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами. Рубрика МКФ <2>	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами	Количестве оценка (%
2	3	4	5	6	7	8
ые ионные и арные (класс I)			A00 - B99	Количественная оценка степени нарушений функции организм других органов и систем организма) при туберкулезе различно от клинической формы заболевания, рентгенологической стади процесса, наличия (отсутствия) выделения микобактерии тубер заболевания (осложненного и неосложненного), характера и ви числе от проводимой химиотерапии), а также от эффективност лечения и формирования резистентности к нему (наличие мно широкой лекарственной устойчивости)		
		Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	A15			
		Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	A16			
				Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Незначительные нарушения функции дыхательной системы при эффективном окончании основного курса лечения, в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление) без признаков бактериовыделения (микобактерии туберкулеза) (далее - МБТ-), без остаточных. Отсутствие дыхательной недостаточности (далее - ДН) или наличие ДН I степени	10 - 30
				Нарушения функций	Умеренные нарушения	40 - 60

				дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	функции дыхательной системы при отсутствии положительной клинико-рентгенологической динамики на фоне химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (микобактерии туберкулеза) (далее - МБТ+) в периоде потери активности; и (или) при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза органов дыхания (локальный пневмофиброз, фиброзно-очаговые изменения) с ДН II степени, преходящей или постоянной легочной гипертензией (хроническая сердечная недостаточность (далее - ХСН) 0 стадии или ХСН I стадии). Наличие МБТ+ 6 и более месяцев	
				Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Выраженные нарушения функции дыхательной системы при неэффективности химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери активности; и (или) при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза (пневмосклероз, цирроз, бронхоэктазы). Наличие ДН II степени, III степени и ХСН IIA стадии	70 - 80
				Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы пищеварительной системы;	Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие наличия тяжелых полиорганных осложнений (амилоидоз,	90 - 100

				МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450, B 530 - 539	декоменсированное хроническое легочное сердце, полисерозиты, кахексия и так далее). Наличие ДН III степени и ХСН ПБ стадии или III стадии	
		Туберкулез нервной системы Туберкулез других органов Милиарный туберкулез	A17 A18 A19			
				Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Незначительные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление; МБТ-); при эффективном окончании основного курса лечения. Отсутствие ДН или наличие ДН I степени	10 - 30
				Нарушения психических, сенсорных,	Умеренные нарушения функций организма вследствие проявлений	40 - 60

				нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и (или) осложнений. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 стадии или ХСН 1 стадии)	
				Нарушения психических, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B	Выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и (или) осложнений. Проявления множественной или широкой лекарственной устойчивости к микобактериям туберкулеза при наличии ДН II степени, III степени, ХСН IIA стадии	70 - 80

				799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849		
				Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, систем, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации с полиорганными осложнениями (амилоидоз, полисерозиты, декомпенсированное хроническое легочное сердце, кахексия и прочее); Наличие ДН III степени и ХСН ПБ стадии или III стадии	90 - 100
		Последствия туберкулеза	В90			
				Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы,	Незначительные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. При отсутствии ДН либо наличии ДН I степени	10 - 30

				пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849		
				Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Умеренные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 стадии или ХСН 1 стадии)	40 - 60
				Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и	Выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза	70 - 80

				связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	различной локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН II степени, III степени, ХСН IIА стадии	
				Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 59,	Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН III степени, ХСН ПБ стадии или III стадии	90 - 100

				B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849		
	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)		B20 - B24			
				Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ. ВИЧ-инфекция: стадия 3 (субклиническая стадия); стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза ремиссии (спонтанная, после антиретровирусной терапии (далее - АРТ), на фоне АРТ), количество CD4+ 350 и более клеток/мкл. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма	10 - 30
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B	ВИЧ-инфекция: стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на фоне АРТ. Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 200 до 350 клеток/мкл; стадия 4Б (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 200 до 350 клеток/мкл; стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ более 200 клеток/мкл	40 - 60

				110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199		
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	ВИЧ-инфекция: стадия 4Б (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на фоне АРТ. Выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 100 до 200 клеток/мкл; стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). Выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 100 до 200 клеток/мкл	70 - 80
				Нарушение функций системы крови и иммунной системы; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма; пищеварительной системы;	ВИЧ-инфекция: стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на фоне АРТ. Значительно выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ менее 100 клеток/мкл; стадия 5 (терминальная). Значительно выраженные нарушения функций организма	90 - 100

				мочевыделительной функции; нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199		
разования)			C00 - D48	Количественная оценка степени выраженности стойких наруше организма при злокачественных новообразованиях при первич освидетельствовании зависит от клинико-морфологических фа локализации и размера опухоли, анатомической формы роста (экзофитная, смешанная), темпа роста опухоли и распространен наличия и характера поражения лимфатических узлов (N), нали отдаленных метастазов (M), гистологического строения, степен злокачественности опухоли (G), стадии опухолевого процесса (классификация по системе cTNMG до лечения, классификация результатам хирургического вмешательства, cyTNM - по резул химиолучевого, химиотерапевтического, гормонального лечен также вид и объем лечения: радикальное, комбинированное, ко паллиативное (хирургическое, лучевая терапия, химиотерапевт гормональное лечения); наличия осложнений, проводимого леч противопоказаний к специальному лечению. При повторном освидетельствовании количественная оценка п степени нарушенных функций организма после проведенного л ремиссии или возникновения рецидивов, метастазов, осложнен роста опухоли после радикального лечения, а также с учетом п течение пяти лет		
	Злокачественные новообразования уточненных локализаций, которые обозначены как первичные или предположительно первичные, кроме новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей		C00 - C75			
		Злокачественные новообразования губы	C00			

				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 430 - 439, B 310 - 399	Рак нижней губы I стадии (T1N 0M0) после радикального лечения (органосохранного хирургического метода лечения), без местных и (или) общих осложнений	10 - 30
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539, B 310 - 399	Рак нижней губы I, II стадии (T1,2N 0M0) после радикального лечения, (хирургические методы лечения на первичном очаге и на лимфатическом коллекторе шеи, при проведении лучевой терапии в случае отказа пациента от хирургических методов лечения) без местных и (или) общих осложнений	40 - 60
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 310 - 399	Рак нижней губы I, II, III стадии (T1,2,3N 0,1M0) после проведенного радикального лечения. Локальный рецидив или остаточная опухоль; наличие местных и (или) общих осложнений	70 - 80
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной	Рак нижней губы IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабельное состояние	90 - 100

				системы, психических функций, языковых и речевых функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 399		
		Злокачественное новообразование основания языка	C01			
		Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка	C02			
		Злокачественное новообразование десны	C03			
		Злокачественное новообразование дна полости рта	C04			
		Злокачественное новообразование неба	C05			
		Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта	C06			
		Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы	C07			
		Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез	C08			
		Злокачественное новообразование миндалины	C09			
		Злокачественное новообразование ротоглотки	C10			

		Злокачественное новообразование носоглотки Злокачественное новообразование грушевидного синуса Злокачественное новообразование нижней части глотки Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций губы, полости рта и глотки	C11 C12 C13 C14			
				Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 440 - 450, B 430 - 439, B 510 - 539, B 310 - 399	Рак полости рта и глотки I стадии (T1N 0M0) после радикального лечения (операция на первичном очаге)	10 - 30
				Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы; МКФ: B 440 - 450, B 430 - 439, B 310 - 399, B 510 - 539	Рак полости рта и глотки I, II стадии (T1,2N 0,1M0) после радикального лечения (комбинированное или комплексное лечение) без местных и (или) общих осложнений	40 - 60
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, языковых и речевых функций,	Рак полости рта и ротоглотки (при локализации корень языка, миндалины, мягкое небо, задняя стенка глотки) II, III стадии (T1,2,3N 0,1M0) после радикального или	70 - 80

				функций пищеварительной системы; МКФ: B 440 - 450, B 430 - 439, B 310 - 399, B 510 - 539	паллиативной медицинской помощи; с наличием местных и (или) общих осложнений. При наличии неблагоприятных патологических характеристик, в особенности при локализации в области языка или дна полости рта (глубина инвазии опухоли >= 3 - 4 мм, прорастание опухолью капсулы лимфатического узла, положительные края, множественные регионарные метастазы, периневральная или лимфатическая или сосудистая инвазия). Неустранимая трахеостома	
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; языковых и речевых функций, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 399	Рак полости рта и глотки IV стадии (T1,2,3,4N 1,2,3M1) после радикального, паллиативного лечения, генерализации опухолевого процесса; наличием отдаленных метастазов, местных и (или) общих осложнений. Инкурабельное состояние	90 - 100

		Злокачественное новообразование пищевода	C15			
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539, B 540 - 559	Рак пищевода I стадии (T1N 0M0) после радикального лечения (при выполнении эндоскопической резекции в пределах слизистой оболочки или подслизистого слоя) без местных и (или) общих осложнений	10 - 30
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539, B 540 - 559	Рак пищевода I, II стадии (T1,2N 0,1M0) после радикального лечения без местных и (или) общих осложнений. Устранимая гастростома, временное наличие эзофагогастрального зонда	40 - 60
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	Рак пищевода I, II, III стадии (T1,2,3,4N 1,2M0) после радикального лечения (в том числе при комбинированном лечении) при наличии местных и (или) общих осложнений. Гастростома, наличие эзофагогастрального зонда	70 - 80
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной систем, психических функций;	Рак пищевода IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабельное состояние	90 - 100

				МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189 B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 198, B 199		
		Злокачественное новообразование желудка	C16			
				Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак желудка I, II стадии (T1,2N 0M0) после радикального лечения (при выполнении эндоскопической резекции), без местных и (или) общих осложнений	10 - 30
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539	Рак желудка I, II стадии (T1,2N 0M0) после радикального лечения (при хирургическом методе лечения рака желудка) без местных и (или) общих осложнений. Гастрэктомия	40 - 60
				Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	Рак желудка I, II, III стадии (T1,2,3,4N 0,1,2,3M0) после радикального, комбинированного или комплексного лечения, наличие местных и (или) общих осложнений и последствий лечения	70 - 80
				Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой,	Рак желудка IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M0,1), инкурабельное состояние	90 - 100

				дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 198, B 199		

	Злокачественное новообразование тонкого кишечника Злокачественное новообразование ободочной кишки Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения	C17 C18 C19		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак кишечника I стадии (T1N после радикального лечения (органосохранных и функционально-щадящих спос лечения (эндоскопическая рез слизистой оболочки)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539	Рак кишечника I, II стадии (T1 1M0) после радикального лече без местных и (или) общих осложнений. Сигмостома (устранимая), еюностома (устранимая)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; пищеварительной системы;	Рак кишечника II, III стадии (T 1,2,3M0) после комбинирован или комплексного, радикальн лечения, наличие местных и (общих осложнений. Еюностом сигмостома

			МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	
			Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539 B 198, B 199	Рак кишечника IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабе состояние
	Злокачественное новообразование прямой кишки	C20		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539	Рак прямой кишки I, II стадии (T1,2N 0M0) после радикальн лечения (в том числе при выполнении хирургического м лечения методом трансанальн полнослойного эндоскопическ удаления опухоли)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539	Рак прямой кишки I, II стадии (T1,2N 1M0) после радикальн лечения без местных и (или) о осложнений. Сигмостома, еюностома (устранимая)
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы,	Рак прямой кишки I, II, III ста (T1,2,3,4N 0,1,2,3M0) после комбинированного или

			сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	комплексного радикального ле наличие местных и (или) общи осложнений. Сигмостома, еюностома, ректовагинальный
			Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Рак прямой кишки IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M0,1), инкурабельное состояние
	Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков	C22		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B	Рак печени и внутрипеченочны желчных протоков I, II стадии (T1,2N 0,1M0) после радикаль лечения (резекции печени) без местных и общих осложнений учетом объективной оценки

			510 - 539	функциональной состоятельно остающейся части печени)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 410 - 429, B 430 - 439, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	Рак печени и внутрипеченочны желчных протоков II, III стади (T1,2,3N 1,2,3M0) после радикального лечения при нал местных и (или) общих ослож
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 198, B 199	Рак печени и внутрипеченочны желчных протоков IV стадии (T1,2,3,4N 1,2,3M0,1), инкурабельное состояние
	Злокачественное новообразование желчного пузыря Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей	C23 C24		
			Нарушения функций системы крови и	Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей II, III

			иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 510 - 539	(T1,2N 0,1M0) после радикаль лечения без местных и (или) о осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей I, II, II стадии (T1,2,3,4N 0,1,2M0,1) п комбинированного или комплексного, радикального лечения, наличие общих и (ил местных осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 198, B 199	Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей IV ста (T1,2,3,4N 1,2,3M1); инкурабельное состояние
	Злокачественное новообразование поджелудочной железы	C25		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы;	Рак поджелудочной железы I, стадии (Tis1,2,3N 0,1,2,3M0) п радикального лечения с общим

			нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539	(или) местными осложнениям
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 198, B 199	Рак поджелудочной железы IV стадии (T1,2,3,4N 1,2,3M1); инкурабельное состояние
	Злокачественное новообразование гортани	C32		
			Нарушения функций	Рак гортани I, II стадии (T1N

			дыхательной системы, системы крови и иммунной системы; языковых и речевых функций МКФ: B 440 - 450, B 430 - 439, B 310 - 399	0M0G1) после радикального удаления опухоли (хордэктом
			Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 440 - 450, B 430 - 439, B 310 - 399	Рак гортани I, II стадии (T1,2N после радикального удаления опухоли (резекция гортани) и лучевой терапии по радикальн программе без местных и (или общих осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, языковых и речевых функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 310 - 399	Рак гортани II, III стадии (T1,2 1M0) после радикального лече (ларингоэктомия), наличие ме и (или) общих осложнений. Постоянная трахеостома
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B	Рак гортани IV стадии (T1,2,3, 1,2,3M1) после радикального лечения с рецидивом или генерализации опухолевого процесса, наличием отдаленны метастазов, с наличием местн (или) общих осложнений. Инкурабельное состояние

			410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 198, B 199	
	Злокачественное новообразование бронхов и легкого Карцинома in situ бронха и легкого	C34 D02.2		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак бронхов и легкого I стади (T1,2aN 0M0) после радикальн хирургического метода лечени (сегментэктомия, лобэктомии, билобэктомии с медиастиналь лимфаденэктомией), без местн (или) общих осложнений
			Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 450, B 410 - 429, B 430 - 439	Рак бронхов и легкого I, II ста (T1,2,3N 0,1M0) после комбинированного лечения (сегментэктомия, лобэктомия, билобэктомия с медиастиналь лимфаденэктомией в сочетани лучевой или противоопухолев лекарственной терапией) без местных и (или) общих ослож Пульмонэктомия (при переосвидетельствовании без признаков снижения кардиореспираторных резерво Рак легкого I стадии после радикальной лучевой терапии. Рак легкого I стадии при прове таргетной терапии
			Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 450, B 410 - 429, B 430 - 439	Рак бронхов и легкого III стад (T1,2,3,4N 0,1,2,3M0) после комбинированного лечения бе местных и (или) общих ослож Рак бронхов и легкого I - III ст (T1,2,3,4N 0,1,2,3M0) после комбинированного лечения с местными и (или) общими осложнениями. Рак легкого II стадии после проведения комбинированного лечения (п отказе пациента или по медицинским показаниям от хирургических методов лечен При проведении лечения

				мелкоклеточного рака легких независимо от стадии заболева Пульмонэктомия при снижени кардиореспираторных резерво
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 89, B 198, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 199	Рак легкого IV стадии (T1,2,3, 1,2,3M1), инкурабельное состо
	Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей	C40 - C41		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы,	Рак кости II, III стадии (T1,2,3 1,2,3M0) после радикального лечения без местных и (или) о осложнений. Сомнительный прогноз после операции по поводу саркомы I остеогенной саркомы. При длительном комбинированном комплексном лечении. При рецидивах и метастазах опухоли. При наличии местных и (или) осложнений с вовлечением со органов

			мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 198, B 199	
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 198, B 199	Прогрессирование заболевани после проведенного радикальн лечения. Тяжелое состояние больного при рецидиве опухол отдаленных метастазах. Инкурабельное состояние. Осложнения после комбинированного или комплексного лечения
	Злокачественная меланома кожи	C43		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 810 - 849	Меланома кожи I стадии (T1a, 0M0) после радикального удал без местных и (или) общих осложнений
			Нарушения функции	Меланома кожи I, II стадии (T

			системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 810 - 849	0,1M0) после радикального уд без местных и (или) общих осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 810 - 849	Меланома кожи II, III стадии (T1,2,3,4N 0,1,2,3M0) после радикального лечения с местн (или) общими осложнениями и локальная лучевая терапия в самостоятельном плане. Налич местного рецидива на фоне проводимого лечения
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 810 - 849, B 198, B 199	Меланома IV стадии (T1,2,3,4, 1,2,3M1), инкурабельное состо Прогрессирование опухолевог процесса
	Злокачественная меланома других и неуточненных частей лица	C43.3		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций	Меланома глаза: T1,2N 0M0 по радикального лечения с местн (или) общими осложнениями. Меланома глаза T1,2,3,4N 0,1M

			(зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 210 - 229, B 810 - 849	после радикального лечения п повторном освидетельствован местных и (или) общих ослож
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 210 - 229 (зрения), B 810 - 849	Меланома глаза: T1,2,3,4N 0,1 после радикального лечения с местными и (или) общими осложнениями
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 210 - 229 (зрения), B 810 - 849	Меланома глаза: (T1,2,3,4N 0,1 инкурабельное состояние. Прогрессирование опухолевог процесса
	Злокачественные новообразования кожи	C44		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 810 - 849	Рак кожи I стадии (T1N 0M0) п радикального лечения без мес (или) общих осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B	Рак кожи II стадии (T2,3N 0M0 после радикального лечения комплексного лечения без мес (или) общих осложнений

			810 - 849	
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 810 - 849	Рак кожи III стадии (T1,2,3,4N 1,2,3M0) после радикального и паллиативного лечения; рецид требующий специального лече Наличие местных и (или) общ осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 810 - 849	Рак кожи IV стадии (T1,2,3,4N 2,3M1), инкурабельное состоя
	Злокачественные новообразования других типов соединительной и мягких тканей Новообразование неопределенного или неизвестного характера соединительной и других мягких тканей	C49 D48.1		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой,	Саркома мягких тканей II III с (T12N 1M0) после радикально лечения без местных и (или) о осложнений. Сомнительный п после операции по поводу внескелетной саркомы Юинга саркомы мягких тканей, десмо фибромы. При длительном комбинированном и (или) комплексном лечении. При

			дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции; психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 410 - 429, B 430 - 439, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 710 - 789, B 810 - 849	рецидивах и метастазах опухо При наличии общих осложнен вовлечением соседних органо структур
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Прогрессирующие заболевани после проведенного лечения. Тяжелое состояние больного п рецидиве опухоли, отдаленны метастазах. Инкурабельное состояние
	Злокачественное новообразование ткани молочной железы	C50		

	Карцинома in situ молочной железы	D05		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак молочной железы I стадии 0M0) после радикального лече (органосохраняющий хирурги метод лечения (секторальная резекция) без местных и (или) общих осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 810 - 849	Рак молочной железы I, II стад (T1,2N 1M0) после радикально лечения (мастэктомия) без мес и (или) общих осложнений. Рак молочной железы I, II стад (T1,2N 0,1M0) после двусторо мастэктомии
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 810 - 849	Рак молочной железы I, II стад (T1,2N 1,M0) после радикальн лечения (мастэктомия), двусторонней мастэктомии, пр наличии медицинских противопоказаний к проведен радикального лечения. Рак мо железы I, II, III стадии (T1,2,3 0,1M0) после двусторонней мастэктомии. Рак молочной ж II, III стадии (T2,3,4N 0,1M0) радикального лечения, (мастэктомия), наличие местн (или) общих осложнений. Проведение адъювантной противоопухолевой лекарстве терапии в дополнение к хирургическому методу лечен лучевой терапии
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и	Рак молочной железы IV (T1,2 1,2,3M1), инкурабельное сост

			связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 710 - 789, B 810 - 849	
	Злокачественное новообразование вульвы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций Злокачественные новообразования влагалища	C51.8 C52		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак наружных женских полов органов, влагалища I, II стади (T1,2N 0M0) после радикальн лечения (при органосохраняю функционально-щадящих спос лечения)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 540 - 559	Рак наружных женских полов органов, влагалища I, II стади (T1,2N 0,1M0) после радикаль комбинированного лечения бе местных и (или) общих ослож
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы,	Рак наружных женских полов органов, влагалища II, III стад (T1,2,3N 1,2,3M0) после

			сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	радикального лечения; наличи местных и (или) общих ослож (неустранимые урогенитальны ректовагинальный свищи). Ра наружных женских половых органов, влагалища после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 640 - 679, B 710 - 789	Рак наружных женских полов органов, влагалища IV стадии (T1,2,3,4N 1,2,3M1), инкурабе состояние
	Злокачественное новообразование шейки матки Злокачественное новообразование тела матки	C53 C54		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак шейки или тела матки I, II стадии (T1,2N 0M0) после радикального лечения при органосохраняющих и функционально-щадящих спос лечения (конизация шейки ма

				последующим выскабливание оставшейся части цервикальн канала, полости матки)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 540 - 559	Рак шейки или тела матки I, II стадии (T1,2aN 0,1M0) после радикального лечения компле лечения без местных и (или) о осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак шейки или тела матки II, I стадии (T1,2a,b,3N 1,2,3M0) по комбинированного или комплексного радикального ле Наличие местных и (или) общ осложнений (урогенитальный, ректовагинальный свищи)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B	Рак шейки или тела матки IV с (T1,2,3,4N 1,2,3M1), инкурабе состояние

			610 - 639, B 640 - 679, B 710 - 789	
	Злокачественные новообразования яичника	C56		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 540 - 559	Рак яичника I, II стадии (T1a-b 0,1M0) после радикального ле без местных и (или) общих осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак яичника II, III стадии (T2,3 1,2,3M0) после комбинирован или комплексного радикально лечения. Низкодифференцированная оп рецидив, необходимость повто операций. Наличие местных и (или) общ осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 -	Рак яичника IV стадии (T1,2,3, 1,2,3M1), инкурабельное состо

			559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 640 - 679, B 710 - 789	
	Злокачественное новообразование полового члена	C60		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 610 - 639	Рак полового члена I стадии (T 0,M0) после радикального леч без местных и (или) общих осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 610 - 639	Рак полового члена I, II стади (T1,2N 0,1M0) после радикаль лечения без местных и (или) о осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак полового члена II, III стад (T1a-b,2,3,4N 1,2M0) после радикального лечения, наличи местных и (или) общих ослож
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций;	Рак полового члена IV стадии (T1,2,3,4N 1,2,3M1), инкурабе состояние

			МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	
	Злокачественное новообразование предстательной железы	C61		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 610 - 639, B 540 - 559	Рак предстательной железы I - стадии (T1,2N 0,1M0) при динамическом наблюдении с гормональным лечением; посл радикального лечения без мест (или) общих осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак предстательной железы II стадии (T1,2,3N 1M0) после радикального лечения при нал местных и (или) общих ослож Рак предстательной железы по паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
			Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем	Рак предстательной железы IV стадии (T1,2,3,4N 1M1), инкурабельное состояние

			и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189 B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 640 - 679, B 710 - 789	
	Злокачественное новообразование яичка	C62		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак яичка I стадии (T1N 0M0, SX) после радикального лечен местных и (или) общих ослож
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак яичка IIA стадии (T1-4N 1 SO, SX) после радикального удаления без местных и (или) осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак яичка IIA - IIIC стадии (T1,2,3,4N 1,2,3M0S1-3) после радикального удаления при на местных и (или) общих ослож

			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 640 - 679	Рак яичка IIA - IIIC стадии (T1,2,3,4N 1,2,3M1a-b), инкурабельное состояние
	Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки Злокачественное новообразование почечных лоханок	C64 C65		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак почки (T1N 0M0). Рак почечной лоханки (T1N 0M после радикального лечения, п органосохраняющих и функционально-щадящих спос лечения (после лапароскопиче лечения) без нарушения функ второй почки
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 610 - 639	Рак почки (T1-4N 0-1M0). Рак почечной лоханки (T1-2N после радикального лечения, п нарушении функции контрлатеральной ("здоровой" почки без местных и (или) общ осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой,	Рак почки (T1-4N 0-1M0) и ра почечной лоханки (T3-4N 0-1M после радикального лечения п наличии местных и (или) общ осложнений; функционирующ контралатеральная почка, пораженная процессом, котор может привести к ухудшению функции в будущем, при умер выраженных нарушениях фун

			дыхательной систем, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 610 - 639	второй почки
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189,6 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 610 - 639, B 710 - 789	Рак почки и почечной лоханки (T1-4N 0-1M1). Рак почечной лоханки (T3-4N 0-3M1), инкурабельное состояние. Нефростома
	Злокачественное новообразование мочевого пузыря	C67		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак мочевого пузыря I стадии 0M0) после радикального удал опухоли. Трансуретральная резекция мочевого пузыря и ранней однократной инстилляции противоопухолевого лекарстве препарата
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B	Рак мочевого пузыря I - II стад (T1,2a,bN 0M0) после радикал резекции мочевого пузыря без местных и (или) общих ослож

			610 - 639	
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189	Рак мочевого пузыря I - IV ста (T1,2,3,4N 2,3M0) после радикального лечения с налич местных и (или) общих ослож Внутрипузырная противоопух лекарственная терапия продолжительностью в течени года или адъювантная внутрипузырная иммунотерап вакциной БЦЖ (в полной дозе поддерживающей терапией 1 г При первичном освидетельствовании устраним цистостома и уретерокутанеос
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 710 - 789	Рак мочевого пузыря IV стади (T1,2,3,4N 1,2,3M1), инкурабе состояние. Рак мочевого пузы после не радикального метода лечения. Цистэктомия. Неустранимая цистостома. Неустранимая уретерокутанео
	Злокачественное новообразование головного мозга Злокачественное новообразование мозжечка Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и	C71 C71.6 C72		

	других отделов центральной нервной системы			
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, языковых и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 230 - 249, B 310 - 399, B 430 - 439, B 710 - 789	Опухоли головного и спинного мозга 2 степени злокачественн после радикального лечения б местных и (или) общих ослож
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) языковых и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 230 - 249, B 310 - 399, B 430 - 439, B 710 - 789	Опухоли головного и спинного мозга 3 степени злокачественн после радикального лечения с наличием местных и (или) общ осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной,	Опухоли головного и спинного мозга 4 степени злокачественн после радикального или паллиативного лечения, инкурабельное состояние

			эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, языковых и речевых, сенсорных функций, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 230 - 249, B 310 - 399, B 410 - 429, B 430 - 439, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 710 - 789	
	Злокачественное новообразование щитовидной железы	C73		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Рак щитовидной железы I стад (T1N 0M0) (высокодифференцированный после радикального лечения б местных и (или) общих ослож
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, языковых и речевых функций; МКФ: B 310 - 399, B 430 - 439, B 540 - 559	Рак щитовидной железы I, II с (T1,2N 0M0) после радикальн лечения (гемитиреоидэктомия резекцией перешейка, субтота резекция щитовидной железы тиреоидэктомия и (или) удале центральной клетчатки на сто опухоли) без местных и (или) осложнений
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, языковых и речевых функций; МКФ: B 310 - 399, B 430 - 439, B 540 - 559	Рак щитовидной железы (T2,3 1,2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и общих осложнений. Рак щитовидной железы после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса
			Нарушения функций системы крови и	Рак щитовидной железы (T1,2 1,2,3M1), инкурабельное сост

			иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 710 - 789	
		C74.1 (добавочный код E27.5)	Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 410 - 429, B 450-469, B 430 - 439, B 510 - 559, B 610 - 639, B 730 - 749	Злокачественная феохромоцит IV стадии (T1,2,3,4N 1,2,3M1) радикального, комплексного и комбинированного лечения с наличием местных и (или) общ осложнений. Злокачественная феохромоцитома после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса. Инкурабельное сост

Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций		C76 - C80		
				Метастазы без выявленного первичного очага после радикального лечения
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, языковых, и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 310 - 399, B 201 - 229, B 230 - 249, B 199	Метастазы без выявленного первичного очага
Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей		C81 - C96		
	Лимфома Ходжкина (Hodgkin)	C81		
			Нарушение функции системы крови и	Лимфома Ходжкина I, II стади после курса лечения при дости

			иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	полной клинико-гематологиче ремиссии
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы; дыхательной, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 430 - 439, B 440 - 449, B 410 - 429	Лимфома Ходжкина I, II стади после курса лечения при дости неполной клинико-гематологи ремиссии с умеренными нарушениями функций органи
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы; функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; мочевыделительной функции; МКФ: B 410 - 429, B 430 - 439, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	Лимфома Ходжкина III, IV ста фоне терапии с выраженными нарушениями функций органи Лимфома Ходжкина II стадии наличии осложнений терапии выраженными нарушениями функций организма
			Нарушения психических функций, функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639	Лимфома Ходжкина IV стадии резистентная к лечению Трансформация в другое лимфопролиферативное или миелопролиферативное заболе Значительно выраженные нарушения функций организм
	Фолликулярная лимфома Нефолликулярная лимфома Другие и неуточненные	C82 C83 C85		

	типы неходжкинской лимфомы Другие уточненные типы Т/NK-клеточной лимфомы Макроглобулинемия Вальденстрема (Waldenstrom)	 C86 C88.0		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	При первичном освидетельствовании неходжк лимфома любой стадии
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	При первичном освидетельствовании прогресс неходжкинских лимфом на фо терапии со значительно выраженными нарушениями функций крови и иммунной системы, других функций орга
ание				
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,	Неходжкинские лимфомы I, II стадии, при отсутствии прогрессирования заболевания при достижении длительной ремиссии с умеренными нарушениями функций органи

			пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	Неходжкинские лимфомы I, II IV стадии с прогрессировани фоне терапии. Выраженные нарушения функ организма
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций;	Прогрессирующие неходжкин лимфомы со значительно выраженными нарушениями функций организма

			МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189	
	Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования	C90		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	При первичном освидетельствовании латентна индолентная, вялотекущая фор фоне проводимого лечения
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	При первичном освидетельствовании множест миелома любой стадии
ание				
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 710 - 789	Множественная миелома I, II, стадии с наличием умеренных нарушений функций организм
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы,	Множественная миелома I, II, стадии с наличием выраженны нарушений функций организм

			нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	Миеломная болезнь любой ста резистентная к терапии с умеренными или выраженным нарушениями функций
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B710 - 789	Множественная миелома I, II и стадии, резистентная к лечени наличие значительно выражен нарушений функций организм Прогрессирование основного заболевания; наличие осложне

	В-клеточный хронический лимфоцитарный лейкоз Волосатоклеточный лейкоз Т-клеточная лимфома/лейкоз взрослых (HTLV-1-ассоциированный) Пролимфоцитарная лейкемия Т-клеточного типа Другой уточненный лимфоидный лейкоз Зрелая В-клеточная лейкемия типа Беркитта Лимфоидный лейкоз неуточненный	C91.1 C91.4 C91.5 C91.6 C91.7 C91.8 C91.9		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	При первичном освидетельствовании хрониче лимфолейкоз 0 - I стадии по R стадия A по Binet), требующая динамического наблюдения пр отсутствии необходимости в терапии
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 710 - 789	При первичном освидетельствовании хрониче лимфолейкоз II стадии по Rai стадия A по Binet) осложнения проводимой терапии в виде умеренных нарушений функци организма

			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 710 - 789	При первичном освидетельствовании хрониче лимфолейкоз III и IV стадии п (или стадия B и C по Binet) по проведенной индукционной те при достижении ремиссии с возникновением рецидива; резистентная форма заболеван
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 430 - 439, B 410 - 429, B	При первичном освидетельствовании осложне значительно выраженными нарушениями функций органи (значительно выраженные нарушения костно-мозгового кроветворения); терминальная стадия заболева

			440 - 450, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639, B 710 - 789	
ание				
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Достижение полной клинико-гематологической ре продолжительностью не менее года. Отсутствие или незначительны нарушения функций организм
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	При достижении полной или частичной ремиссии с умерены нарушениями функций органи Хронический лимфолейкоз II стадии по Rai (стадия A или B Binet), медленно прогрессирую течения; умеренные нарушени функции организма
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейр омышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой,	Отсутствие клинической реми высоким риском возможной трансформации в прогрессиру и бластную фазу Хронический лимфолейкоз прогрессирующе течения; резистентность к тера Осложнения терапии и (или) поражение органов-мишеней с выраженными нарушениями функций организма

			дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Хронический лимфолейкоз IV стадии, резистентный к терапи Хронический лимфолейкоз со значительно выраженными нарушениям функций организ Опухолевая прогрессия, трансформация в другие лимфопролиферативные или миелопролиферативные забол
	Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ), BCR/ABL-положительный Моноцитарный лейкоз Другой лейкоз уточненного клеточного типа	C92.1 C93 C94		

	Лейкоз неуточненного клеточного типа Другой миелоидный лейкоз	C95 C92.7		
				При первичном освидетельствовании хроническ миелолейкоз любой стадии на период лечения
ание				
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Хронический миелолейкоз при достижении полной клинико-гематологической, цитогенетической и молекуляр ремиссии; отсутствие или незначительные нарушения фу организма
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	Хронический миелолейкоз при достижении клинико-гематологической ремиссии; умеренные нарушен функций организма
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 410 - 429, B 430 - 439, B 440 - 450, B 510 - 539, B 540 - 559, B 610 - 639	Хронический миелолейкоз при отсутствии клинико-гематологической ремиссии; выраженные наруш функций организма
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы,	Хронический миелолейкоз в с акселерации или бластного кр Хронический миелолейкоз со

			нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 410 - 429, B 430 - 439, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 710 - 789, B 198, B 199	значительно выраженными нарушениями функций органи
	Острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) Острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ) Острый миеломоноцитарный лейкоз Острая миелоидная лейкемия с аномалиями 11q23 Другой миелоидный лейкоз Острая миелоидная лейкемия с мультилинеарной дисплазией Миелоидный лейкоз неуточненный	C92.0 C91.0 C92.4 C92.5 C92.6 C92.7 C92.8 C92.9		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с	Острый лейкоз в развернутой стадии. Терминальная стадия острого лейкоза с полиорганно недостаточностью, резистентн терапии, значительно выражен нарушениями функций органи

			движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Острый лейкоз после проведен индукционной терапии при достижении полной клинико-гематологической ре при наличии осложнений лече (или) выраженных нарушения функций организма
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы; функций сердечно-сосудистой, дыхательной,	Острый лейкоз при достижени полной клинико-гематологиче ремиссии с наличием осложне терапии и (или) умеренными нарушениями функций органи

			эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	
	Миелодиспластические синдромы	D46		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Латентная, вялотекущая, индолентная формы миелодиспластических синдро (далее - МДС) без признаков прогрессирования с незначительными нарушениям функций организма
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	МДС с умеренными нарушени функции крови и иммунной си на фоне терапии
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B	МДС с выраженными нарушен функции крови и иммунной си на фоне терапии

			510 - 539, B 610 - 639	
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	МДС высокого риска; терминальная стадия заболева значительно выраженными нарушениями функции крови и иммунной системы, трансформ в острый лейкоз
	Злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) множественных локализаций	C97		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной	Синхронный (возникший одновременно) и метахромный (возникший последовательно ч месяцев после радикального л первичной опухоли) рак после радикального лечения

			системы, мочевыделительной функции, языковых, и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 310 - 399, B 201 - 229, B 230 - 249, B 199	
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, языковых, и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 310 - 399, B 201 - 229, B 230 - 249, B 199	Синхронный и метахромный р прогрессирование основного заболевания
	Доброкачественные новообразования Доброкачественное	D00 - D48 D32		

	новообразование мозговых оболочек Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы Доброкачественное новообразование гипофиза	D33 D35.2		
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310-340, B 398, B 399, B 210-299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 849	Доброкачественные опухоли различной локализации при: небольших размерах или отсут роста (медленном росте), опух без влияния на функцию смеж структур и (или) органов; гормонально неактивные опух опухоли после проведенного радикального оперативного ле при отсутствии признаков рец или продолженного роста опу
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с	Доброкачественные опухоли различной локализации при: больших размерах опухоли с воздействием на положение и функцию смежных структур, гормонально активные опухол приводящие к умеренным нарушениям функций организ

			движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210-299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 849	после проведенного оперативн лечения (радикального или нерадикального) при наличии умеренных нарушений функци организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B	Доброкачественные опухоли различной локализации (преимущественно головного спинного мозга) при: быстром опухоли с выраженным воздействием на положение и функцию смежных органов и невозможности радикального удаления; гормонально активные опухол приводящие к выраженным нарушениям функций организ после проведенного оперативн лечения (радикального или нерадикального) при наличии продолженного роста опухоли при наличии выраженных нарушений функций организм

			398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 849	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310-340, B 398, B 399, B 210-299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 849	Доброкачественные опухоли головного и спинного мозга пр невозможности радикального хирургического лечения или п проведенного хирургического лечения со значительно выраженными нарушениями функций организма
	Доброкачественное новообразование надпочечника	D35.0		
			Нарушения функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, нейромышечных, скелетных и	Доброкачественная феохромо или альдостерома после радикального лечения без пер надпочечниковой недостаточн

			связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 450-469, B 510 - 559, B 730 - 749	
			Нарушение функции сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, мочевыделительных и двигательных функций, МКФ: B 410 - 429, B 450 - 469, B 510 - 559, B 730 - 749, B 750 - 789, B 610 - 639	Доброкачественная феохромо или альдостерома после радикального лечения с развит первичной надпочечниковой недостаточности
			Количественная оценка степени выраженности стой кроветворных органов и иммунной системы организ заболеваниями, последствиями травм или дефектам заболевания (по данным клинико-лабораторного об кризов; наличия и вида кровоизлияний во внутренни крупных суставов (некритические или жизнеугрожа мишеней, вида, объема и эффективности проводимо регулярного применения стимуляторов гемопоэза, п трансплантации костного мозга), резистентности к п осложнений (в том числе от проводимой терапии), о других органов и систем организма; прогноза заболе	
Другие болезни крови и кроветворных органов		D70 - D77		
	Гипоспленизм. Врожденные аномалии селезенки	D73.0 Q89.0		
			Нарушение функций	Незначительные нарушения

			системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	функций организма при отсут селезенки
	Агранулоцитоз Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител Комбинированные иммунодефициты Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами Обычный вариабельный иммунодефицит Другие иммунодефициты Дефект в системе комплемента	D70 D80 D81 D82 D83 D84 D84.1		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	При отсутствии осложнений п проведенного эффективного л и достижения стойкой длитель и более месяцев) ремиссии
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639	Рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекци осложнений с умеренными нарушениями функций органи фоне базисной терапии
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В	Непрерывно рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений с выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии

			610 - 639	
Гемолитические анемии	Серповидно-клеточные нарушения	D55 - D59 D57		
Апластические и другие анемии		D60 - D64		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450	Легкая форма анемии при отсутствии нарушений (клинико-гематологическая ремиссия) либо с незначитель нарушениями функций органи фоне базисной терапии
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450	Среднетяжелая форма анемии умеренными нарушениями фу организма на фоне базисной т
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450	Тяжелая или сверхтяжелая фо анемии с выраженными нарушениями функций органи фоне базисной терапии
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450	Анемии, резистентные к терап Тяжелая или сверхтяжелая фо анемии со значительно выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии
	Наличие других трансплантированных органов или тканей	Z94.8		
ание				
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной	После аллогенной трансплант костного мозга на срок 2 года

			систем; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	
ание (через 2 года после трансплантации костного мозга)				
			Нарушения функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	При наличии осложнений с умеренными нарушениями фу организма
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B	При наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма

			410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	При наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций органи
Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния		D65 - D69		
	Наследственный дефицит фактора VIII Наследственный дефицит фактора IX Болезнь Виллебранда Наследственный дефицит фактора XI Наследственный дефицит других факторов свертывания Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами Приобретенный дефицит фактора свертывания	D66 D67 D68.0 D68.1 D68.2 D68.3 D68.4		
			Нарушение функции	Легкая форма заболевания при

			системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	отсутствии кровотечений либо редкими (не более 1 раза в год кровотечениями, требующими обращения в медицинскую организацию; не требующих заместительной терапии и (или) не приводящи развитию анемии; отсутствие кровоизлияний в су и (или) мышцы или внутренни органы; нерегулярное использование концентратов факторов сверты крови и (или) препаратов кров профилактической целью (при оперативных вмешательствах травмах); для гемофилии A и B - активно факторов свертывания VIII ил более 5% (учитывается миним степень активности факторов свертывания VIII или IX, когд определенная у данного пацие
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	Легкая и среднетяжелая форма заболевания с редкими (не бол раз в год) кровотечениями, требующих заместительной те и (или) с развитием анемии; кровоизлияния в суставы и (ил мышцы или внутренние орган более 1 раза в год; для гемофилии A и B - активно факторов свертывания VIII ил 2 до 5% (учитывается минима степень активности факторов свертывания VIII или IX, когд определенная у данного пацие

			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	Среднетяжелая и тяжелая фор заболеваний с повторными (бо раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и (или) госпитализаци кровоизлияния в суставы и (ил мышцы или внутренние орган более 2 - 3 раз в год; наличие хронического синови (или) артропатии одного круп сустава; для гемофилии A и B - активно факторов свертывания VIII ил - 2% (учитывается минимальна степень активности факторов свертывания VIII или IX, когд определенная у данного пацие регулярное использование концентратов факторов сверты крови и (или) препаратов кров профилактической и гемостатической целью
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B	Тяжелые формы заболеваний с частыми повторными (6 и боле в год) кровотечениями, со склонностью к частым (более год) тяжелым кровотечениям (числе спонтанным); кровоизлияния в суставы и (ил мышцы более 3 раз в год и (ил кровоизлияния во внутренние органы более 2 раз в год, и (ил любой эпизод внутричерепног кровоизлияния и (или) повтор эпизоды почечных кровотечен признаки хронического синови (или) артропатии более чем од крупного сустава; для гемофилии A и B - активно факторов свертывания VIII ил менее 1% (учитывается минимальная степень активно факторов свертывания VIII ил когда-либо определенная у да пациента);

			540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189	наличие ингибиторной гемофи титром ингибитора > 0,6 БЕ
	Качественные дефекты тромбоцитов Другие первичные тромбоцитопении	D69.1 D69.4		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439	Легкая форма заболевания (отсутствие кровотечений или редкие (не более 3 раз в год) кровотечения, не требующие медикаментозной и гемостати терапии и (или) не приводящи анемии); использование концентратов факторов свертывания крови и препаратов крови не требуется
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199	Среднетяжелая форма заболев частотой кровотечений (3 - 10 год), либо до 3-х кровотечени требующих гемостатической терапии и (или) госпитализаци хроническая постгеморрагичес анемия средней степени, не требующая заместительной те препаратами крови; использование концентратов факторов свертывания крови и препаратов крови при операти вмешательствах или травмах с целью профилактики (купиров геморрагических эпизодов
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных,	Тяжелая форма заболевания с частыми (более 10 раз в год) л 3 обильных кровотечений, приводящих к развитию остро

			скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	постгеморрагической анемии; кровотечения из слизистой об полости рта, макрогематурия, кровоизлияния в суставы или мышцы до 3 раз в год, во внут органы 2 раза в год и (или) кровотечение из желудочно-кишечного тракта - ЖКТ) не приведшее к развит острой или хронической постгеморрагической анемии. Использование концентратов факторов свертывания крови и препаратов крови с профилактической или гемостатической целью при оперативных вмешательствах травмах и (или) по другим показаниям
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 -	Тяжелая форма заболевания с частыми (более 3 раз в год) тяжелыми кровотечениями, приводящими к развитию остр постгеморрагической анемии, иными жизнеугрожающими кровотечениями

			189, B 198, B 199	
	Первичная тромбофилия дефицит Другая тромбофилия	D68.5 D68.6		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамне требующая первичной фармакологической антитромботической профила только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжел инфекционный процесс, крупн хирургические вмешательства прочее)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной	Среднетяжелая форма заболев однократным случаем спровоцированного тромбоза (идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию посттромбофлебитической бол (далее - ПТФБ), требующая ку вторичной фармакологической профилактики

			функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Тяжелая форма заболевания с повторными не более 2-х спровоцированных или 1 не спровоцированного тромбоза (идиопатический вариант) и (и требующей вторичной профилактики, или тромбоз ли локализации, приведший к ПТ Дефицит протеина C/S/антитромбина менее 50%, более 12%
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой,	Тяжелая и крайне тяжелая фор заболевания с более чем 2 случ спровоцированного тромбоза (идиопатический тромбоз) и (и более чем 1 случаем идиопатического тромбоза, и (и более случаями тромбоза со центральной нервной системы внутренних органов, тромбоэм легочной артерии вне зависим от наличия или отсутствия вид

			дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	причины для тромбоза; значительно выраженные нару функций организма. Дефицит протеина C/S/антитромбина менее 12%
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамне требующая первичной фармакологической антитромботической профила только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжел инфекционный процесс, крупн хирургические вмешательства прочее)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и	Среднетяжелая форма заболев однократным случаем спровоцированного тромбоза (идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию ПТФ

			связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	требующая курса вторичной фармакологической профилак
	Первичная тромбофилия дефицит Антитромбина носительство FV Leiden (аномалия фактора V-мутация Лейдена); носительство FII G20210A; недостаточность антитромбина, протеинов С и S; мутация гена протромбина Другая тромбофилия; синдром антикардиолипина, антифосфолипидный синдром, наличие волчаночного антикоагулянта	D68.5 D68.6		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения	Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамне требующая первичной фармакологической антитромботической профила только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжел инфекционный процесс, крупн

			функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	хирургические вмешательства прочее)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Среднетяжелая форма заболев однократным случаем спровоцированного тромбоза (идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию ПТФ требующая курса вторичной фармакологической профилак
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы,	Тяжелая форма заболевания с повторными случаем спровоцированного тромбоза (

			нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	более двух спровоцированных случаев или однократным случ не спровоцированного тромбо (идиопатический вариант) и (и требующий вторичной профилактики тромбоз, или тр любой локализации, приведши ПТФБ. Дефицит протеина C/S/антитромбина менее 50%, более 12%
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B	Тяжелая и крайне тяжелая фор заболевания с более чем 2 слу спровоцированного тромбоза (идиопатический тромбоз) и (и более чем однократным случа идиопатического тромбоза, и (двумя и более случаями тромб сосудов центральной нервной системы, внутренних органов, тромбоэмболии легочной арте вне зависимости от наличия и отсутствия видимой причины тромбоза; значительно выраженные нару функций организма. Дефицит протеина C/S/антитромбина менее 12%

			110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	
		E00 - E90	Количественная оценка степени выраженности стой граждан при болезнях эндокринной системы, расстр обмена веществ зависит от характера и степени выра симптоматики заболевания, результатов клинически исследования, а также возможности компенсации на современных методов лечения и реабилитации.	
Болезни щитовидной железы	Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	E00 - E07 E89	Количественная оценка степени выраженности стой обусловленных патологией щитовидной железы, про данная патология хорошо поддается лечению соврем препаратами и, как правило, не приводит к стойкому умеренным нарушениям функций организма могут и щитовидной железы, оценка выраженности которых достижения компенсации основного заболевания.	
	Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом Врожденный гипотиреоз без зоба	E03.0 E03.1		
			Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429	незначительные нарушения фу организма на фоне адекватной заместительной терапии
			Нарушения	Умеренные нарушения функц

			психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429	организма на фоне адекватной заместительной терапии
			Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429	Выраженные нарушения функ организма на фоне адекватной заместительной терапии
	Тиреотоксикоз (гипертиреоз)	E05		
			Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 229, B	Осложнения, приводящие к незначительным нарушениям функций организма

			410 - 429, B 540 - 559	
			Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 229, B 410 - 429, B 540 - 559	Осложнения, приводящие к умеренным нарушениям функ организм
			Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 229, B 410 - 429, B 540 - 559	Осложнения, приводящие к выраженным нарушениям психических, сенсорных функ функций сердечно-сосудистой системы
Сахарный диабет		E10 - E14		
	Сахарный диабет 1 типа Сахарный диабет 2 типа Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания. Другие уточненные формы сахарного диабета. Сахарный диабет неуточненный	E10 E11 E12 E13 E14	Количественная оценка степени выраженности стой обусловленных сахарным диабетом, основывается н нарушенных функций при верифицированных ослож органов-мишеней, таких как диабетическая нефропа неврологические осложнения (диабетическая невроп кровообращения (диабетическая ангиопатия, трофич диабетическая остеоартропатия (стопа или сустав Ш	
			Нарушения сенсорных функций (зрения), нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; сердечно-сосудистой	Сахарный диабет без поражен органов-мишеней (отсутствие осложнений) или при наличии осложнений с незначительным нарушением функций организ диабетическая нефропатия - хроническая болезнь почек (да ХБП) 1, 2 и 3а стадии; диабетическая ретинопатия с остротой зрения лучше видящ или единственного глаза корре > 0,3, сужено до 40°; незначительная или умеренная

			системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 210 - 229, B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	дистальная сенсорная и сенсомоторная полиневропати диабетическая ангиопатия с незначительными нарушениям функций организма
			Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	Осложнения сахарного диабет умеренными нарушениями фу органов-мишеней: диабетическая нефропатия - Х стадии, диабетическая ретино острой зрения лучше видящ или единственного глаза с коррекцией > 0,1 до 0,3; поле з в пределах 20 - 40°; выраженная сенсомоторная невропатия с наличием пареза (или) с нарушением равновеси (или) с формированием высок риска развития рецидива язвы стопы; диабетическая ангиопатия с умеренными нарушениями фу организма
			Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B	Осложнения сахарного диабет выраженными нарушениями функций органов-мишеней: диабетическая нефропатия - Х стадии (подготовка к диализу) ХБП 5 стадии при эффективно диализа и отсутствии его осложнений; диабетическая ретинопатия с острой зрения лучше видящ или единственного глаза с коррекцией 0,1 - 0,05; поле зрения от 10 до 20° диабетическая ангиопатия с выраженными нарушениями функций организма

			140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	
			Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	Осложнения сахарного диабет значительно выраженными нарушениями функций органов-мишеней, такие как: диабетическая нефропатия - Х стадии, осложнения заместите почечной терапии; Диабетическая пролиферативн ретинопатия с остротой зрения лучше видящего глаза коррек 0,04 и ниже вплоть до слепоты поле зрения < 10°, диабетичес ангиопатия со значительно выраженными нарушениями функций организма
	Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения	E10.5		
			Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429	Диабетическая ангиопатия обе нижних конечностей с хроничес артериальной недостаточност (далее - ХАН) 0 стадии или I с
			Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, функции сердечно-сосудистой	Диабетическая ангиопатия обе нижних конечностей с ХАН II стадии

			системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429	
			Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429	ХАН III стадии с язвенным дефектом после заживления и ампутации на уровне стопы с деформацией и формирование зоны высокого риска рецидива стопы одной конечности
	Инсулинзависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями	E10.6		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559	Диабетическая нейроостеоартропатия одной и обеих стоп с незначительными нарушениями статодинамичес функций
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559	Диабетическая нейроостеоартропатия одной и обеих стоп с умеренными нарушениями статодинамичес функций
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций	Выраженная деформация обеи или одной стопы в сочетании с ампутацией другой стопы с выраженными нарушениями статодинамических функций

			эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559	
	Приобретенное отсутствие стопы и голеностопного сустава Приобретенное отсутствие ноги на уровне или ниже колена Приобретенное отсутствие ноги выше колена Приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей (на любом уровне, за исключением только пальцев)	Z89.4 Z89.5 Z89.6 Z89.7		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559	Ампутационная культя стопы, голени, бедра при отсутствии нарушений на другой конечно
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559	Ампутационная культя бедра и голени или стопы одной конеч в сочетании с ХАН II, III стади диабетической нейроостеартропатией на друг конечности
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Ампутационные культи голен бедра обеих конечностей при невозможности их протезиров

			функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559	
Нарушения других эндокринных желез		E20 - E35		
	Гипопаратиреоз Гипопаратироидизм, возникший после медицинских процедур	E20 E89.2	Количественная оценка стойких нарушений функци зависит от частоты и вида тетании (судорожных сок дыхательных мышц и мышц ЖКТ), а также от степе фосфорно-кальциевого обмена при измерении показ (содержание кальция - общего и ионизированного, ф крови; уровень кальция и фосфора в моче)	
			Нарушения психических функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 540 - 559, B 610 - 639	Незначительные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной те при наличии редких тетаний преимущественно скелетных м отсутствие или наличие незначительных изменений показателей фосфорно-кальци обмена (при измерении в усло стационара)
			Нарушения психических функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B	Умеренные нарушения функци организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии частых тетаний разли мышечных групп (скелетных, дыхательных, мышц ЖКТ и (и наличия умеренных изменений показателей фосфорно-кальци обмена (при измерении в усло стационара)

			140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 540 - 559, B 610 - 639	
	Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной (околощитовидной) железы	E21	Количественная оценка стойких нарушений функци зависит от нарушений функций опорно-двигательно остеодистрофия, деформации костей, патологически мочевыделительной функции (проявления нефролит пищеварительной системы	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	Нормокальцемическая и мягка форма гиперпаратиреоза без клинических проявлений либо незначительными нарушениям функций организма
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	Манифестная форма гиперпаратиреоза с умеренны нарушениями функций органи фоне базисной терапии
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с	Манифестная форма гиперпаратиреоза с выраженн нарушениями функций органи фоне базисной терапии

			движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639	
	Гиперфункция гипофиза	E22		
	Акромегалия и гипофизарный гигантизм	E22.0		
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429	Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) легкого течения с незначительными нарушениям функций организма
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма,	Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) среднетяжелого те с умеренными нарушениями функций организма

			функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429	
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 210 - 229, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) среднетяжелого те с выраженными нарушениями функций организма
	Гипофункция и другие нарушения гипофиза	E23		
	Гипопитуитаризм	E23.0		
			Нарушения психических функций, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и	Гипогонадотропный гипогона соматотропный гормон (далее недостаточности без карликов пангипопитуитаризм, состоян медикаментозной компенсаци субкомпенсации

			метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 210 - 279, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	
			Нарушения психических функций, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 210 - 279, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	СТГ-недостаточность с карликовостью; пангипопитуитаризм с умерен выраженными нарушениями функций организма
	Несахарный диабет. Нефрогенный несахарный диабет	E23.2 N 25.1		
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функции эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой,	Несахарный диабет (централь или нефрогенный), компенсированный или субкомпенсированный на фон проводимой терапии

			пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 849	
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функции эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 849	Умеренные нарушения функци организма при декомпенсации несахарного диабета (централь или нефрогенного) на фоне резистентности к терапии
	Синдром и болезнь Иценко-Кушинга	E24	Количественная оценка степени выраженности стой обусловленных синдромом и болезнью Иценко-Куш (активная, неактивная), степени тяжести формы забо тяжелая форма), наличия осложнений (миопатии, ка ХСН, стероидный диабет, остеопороз, аменорея, атр костей, нейроофтальмологические нарушения, гипер почка, почечная недостаточность, органические пор системы, психические нарушения), а также наличия гипофиза, надпочечников и резистентности к провод	
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Гиперкортицизм с отсутствием незначительными нарушениям функций организма на фоне проводимой терапии

			функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	Гиперкортицизм средней тяже синдрома без осложнений, с умеренными нарушениями фу организма на фоне проводимо терапии
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 710 -	Тяжелая форма гиперкортициз прогрессирующим течением н проводимой терапии; с осложнениями, в том числе с хирургического и (или) лучево лечения опухолей, продуциру адренокортикотропный гормо рецидив заболевания, приводя выраженным нарушениям фун организма

			789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	Тяжелая форма гиперкортициз прогрессирующим течением н терапии; с осложнениями, в том числе с оперативного и (или) лучевого лечения опухолей надпочечни или гипофиза; рецидив заболевания, приводя значительно выраженным нарушениям функций организ
	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	E25.0		
			Нарушение функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Недостаточность функции надпочечников без нарушений функций или с незначительны нарушениями функций органи фоне постоянной заместитель терапии
			Нарушение функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Недостаточность функции надпочечников с умеренными нарушениями функций органи фоне постоянной заместитель терапии
			Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 540 - 559, B 710 - 789	Недостаточность функции надпочечников с выраженным нарушениями функций органи

	Гиперальдостеронизм	E26		
			Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429	Гиперальдостеронизм с незначительными нарушениям функций организма на фоне проводимой терапии (в том чи хирургической)
			Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429, B 710 - 789	Гиперальдостеронизм с умере нарушениями функции органи при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, рецидивы, продолж рост опухоли, резистентность медикаментозной терапии)
			Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429, B 710 - 789	Гиперальдостеронизм с выраженными нарушениями функции организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, рецидивы, продолж рост опухоли, резистентность медикаментозной терапии)
	Другие нарушения надпочечников Полигландулярная дисфункция	E27 E31	Количественная оценка стойких нарушений функци дисфункции и первичной надпочечниковой недостат прогредиентного характера течения заболевания, от (количества и вида органов и (или) систем организм процесс), вида и степени нарушенных функций орга остроты зрения вплоть до слепоты), статодинамичес патологические переломы, остеопороз, контрактуры пищеварительной системы (синдром мальабсорбции сердечно-сосудистой системы (ХСН различной стад метаболизма (гипогликемический синдром, сахарны системы (ХБП различной стадии), функции кожи и с	

			наличия осложнений со стороны каждого "компонен проводимой терапии	
	Первичная недостаточность коры надпочечников Аутоиммунная полигландулярная недостаточность Полигландулярная гиперфункция	E27.1 E31.0 E31.1		
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 210 - 279, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Отсутствие клинико-функциональных проявлений заболевания на фо проводимой терапии (в том чи хирургического лечения) или незначительные нарушения фу организма
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой	Умеренные нарушения функци организма при неэффективнос лечения (в том числе хирургического)

			системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 210 - 279, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 210 - 279, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Выраженные нарушения функ организма при неэффективнос лечения и (или) наличия ослож со стороны органа и (или) сист вовлеченной в синдром
Ожирение и другие виды избыточности питания		E65 - 68		
	Ожирение, обусловленное	E66.0		

	избыточным поступлением энергетических ресурсов Другие уточненные формы избыточности питания	E67.8		
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 140 - 189, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559	Ожирение без осложнений либ сочетании с незначительными нарушениями функций органи
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 140 - 189, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559	Ожирение с индексом массы т (далее - ИМТ) более 40,0 в сочетании с умеренными нарушениями функций органи
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и	Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании с выраженными нарушениями функций органи

			связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 140 - 189, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559	
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 140 - 189, B 710 - 789, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559	Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании со значительно выраженными нарушениями функций организма
Нарушения обмена веществ		E70 - E90		
	Классическая фенилкетонурия Другие виды гиперфенилаланинемии	E70.0 E70.1	Количественная оценка степени выраженности стой обусловленных фенилкетонурией, основывается на сформированных в детском возрасте стойких наруш учитывает форму, течение заболевания, возможност допустимого уровня фенилаланина и прогноз	
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189	При наличии незначительных нарушений функций организм незначительное когнитивное снижение; незначительное сни интеллекта (коэффициент

				интеллекта (Intelligence Quotie (далее - IQ) IQ = 65 - 69 балло
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189	При наличии умеренных нару функций организма: умеренно когнитивное снижение; умере снижение интеллекта (IQ = 50 баллов)
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 310 - 340	При наличии выраженных нарушений функций организм выраженное когнитивное сниж выраженное снижение интелл (IQ = 35 - 49 баллов)
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189	При наличии значительно выраженных нарушений функ организма: значительно выраж снижение интеллекта (IQ < 35 баллов)
	Нарушение обмена ароматических аминокислот Нарушение обмена аминокислот с разветвленной цепью и обмена жирных кислот Другие нарушения обмена аминокислот Другие нарушения обмена углеводов Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов Нарушения обмена глюкозаминогликанов Нарушение обмена гликопротеинов Нарушение обмена липопротеидов и другие липидемии Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Нарушения обмена порфирина и билирубина Нарушение минерального обмена	E70 E71 E72 E74 E75 E76 E77 E78 E79 E80 E83	Количественная оценка степени выраженности стой при редких орфанных заболеваниях, обусловленных аминокислот с разветвленной цепью, жирных кисло основывается на оценке показателей нервно-психич развития, а также учитывает форму и тип течения за кризовое), клинический полиморфизм симптоматик нарушенных функций организма патогенетическим заболевания		
			Нарушения психических, языковых и речевых,	Прогредиентное течение заболевания, частично компенсируемое патогенетиче

			сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 279, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	терапией, при наличии незначительных нарушений функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 279, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	Кризовое или прогредиентное течение заболевания, не компенсируемое патогенетиче терапией, при наличии умерен нарушений функций организм
			Нарушения психических, языковых и речевых,	Кризовое или прогредиентное течение заболевания, не компенсируемое патогенетиче

			сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 279, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	терапией, при наличии выраже нарушений функций организм
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 117 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 279, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	Кризовое или прогредиентное течение заболевания, не компенсируемое патогенетиче терапией, при наличии значит выраженных нарушений функ организма
	Кистозный фиброз с легочными проявлениями Кистозный фиброз с кишечными проявлениями	E84.0 E84.1	Количественная оценка стойких нарушений функци муковисцидозом, основывается на оценке фазы и ак течения заболевания, вида генетических мутаций, ст стороны пищеварительной, дыхательной, сердечно-	

	Кистозный фиброз неуточненный	E84.9	других систем организма, вида микробного патогена наличия осложнений	
			Нарушения функций дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559	Формы заболевания без клини симптоматики или легкое тече заболевания с незначительным нарушениями функции дыхате и пищеварительной систем
			Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Среднетяжелая форма заболев умеренными нарушениями фу организма, первичный или интермитирующий высев: P. aeruginosa, B. cepacia complex, MRSA, Stenotrophomonas malt Achromobacter spp., нетуберкулезными микобактер грибами рода Aspergillus и дру микробных патогенов, синдро потери соли, хроническая панкреатическая недостаточно острый и рецидивирующий панкреатит, синдром дистальн интестинальной обструкции, кровохарканье, цирроз печени портальной гипертензии, нарушенная толерантность к глюкозе и диабет без потребно инсулине, хронический панкре белково-энергетическая недостаточность
			Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 110 -	Тяжелая форма заболевания с выраженными нарушениями функций организма; наличие тяжелых хронических инфекционных осложнений, вызванных: P. aeruginosa, B. ce complex, MRSA, Stenotrophom maltophilia, Achromobacter spp нетуберкулезными микобактер грибами рода Aspergillus и дру микробными патогенами, повт синдром потери соли или синд дистальной интестинальной обструкции, легочное кровоте цирроз печени с портальной гипертензией, муковисцидоз-ассоциированн

			139, В 140 - 189	диабет с потребностью в инсу остеопороз, белково-энергетич недостаточность 2 - 3 степени носители гастростомы, панкреатическая недостаточно высокой потребностью в панкреатических ферментах (> 000 Ед/кг или 4 000 Ед/грамм ж частые обострения хроническо панкреатита, пневмоторакс
			Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 110 - 139, В 140 - 189	Хроническая дыхательная недостаточность с кислородозависимостью, объе форсированного выдоха за пер секунду (далее - ОФВ1) < 30% должного, пациенты находящи листе ожидания трансплантац легких или печени
		F00 - F99	Количественная оценка стойких нарушений психиче обусловленных психическими расстройствами и рас основывается преимущественно на оценке типологи психопатологической симптоматики, объективизиру экспериментально-психологически. Учитываются та заболевания, его стадия и прогноз, характер и тяжес особенности патопластического фона, включая прем эффективность компенсаторных механизмов и состо жизнедеятельности (производственной, бытовой, со	
Расстройства психологического развития		F80 - F89		
	Общие расстройства психологического развития Детский аутизм Атипичный аутизм Синдром Ретта. Синдром Аспергера	F84 F84.0 F84.1 F84.2 F84.5	Количественная оценка стойких нарушений психиче расстройствах аутистического спектра различного г преимущественно на анализе степени дефицита соц (аутистическая отрешенность, отвержение, замещен до полного отсутствия социальной активности), выр клинической симптоматики и нарушений поведения защиты - моторные и речевые стереотипии, поведен увлечения, патологические фантазии, "феномен тож	

			неизменности, постоянства; агрессивность, включая характер и выраженность специфических речевых н недостаточности, когнитивного снижения, психопат (кататонических, пароксизмальных и подобных), а т механизмов и адаптации в основных сферах жизнед бытовой, социально-средовой)	
			Нарушение психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Взрослый самостоятельно устанавливает контакт, но испытывает трудности в организации общения, особенн новых социальных контактах (нервозность, робость, тормозимость). Нет активного избегания взгляда. "Поведенче сценарий": сохранение постоя среды за счет формирования штампов - образцов правильно социального поведения; защитные образования (стерео ритуалы) минимальны, носят адекватный, компенсаторный характер, появляются только в ситуации тревоги. Речевые навыки сформирован речи возможны единичные эхолалии, стереотипии, речевы "штампы". Коммуникативная функция речи сохранена. Интеллект не снижен либо сни незначительно (IQ = 65 - 69 ба В целом социально адаптирова нуждается в индивидуальном подходе, при необходимости в социальном сопровождении
			Нарушение психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Взрослый самостоятельно устанавливает лишь минимальн контакт с окружающими, треб постоянное побуждение. Во вр контакта повышенный уровен нервозности и боязни. Наличи кратковременного фиксирован визуального контакта. "Поведенческий сценарий": допускаются минимальные нарушения стереотипа общени формируются сложные виды аффективной защиты (патологические увлечения, компенсаторные фантазии,

				лишенные социальной направленности). Коммуникативная функция ре нарушена. Имеются умеренны специфические нарушения реч (речь "штампованная", "стереотипная"). Интеллект не снижен либо сни от незначительной до умеренн степени (IQ = 50 - 69 баллов). Испытывает существенные трудности адаптации в основн сферах жизнедеятельности, нуждается в периодическом социальном сопровождении
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Взрослый самостоятельно не устанавливает контакт с окружающими, возможно лиш кратковременное привлечение внимания после побуждения. Избегание визуального контак "Поведенческий сценарий": не допускаются нарушения стере окружающей среды, формиру множественные стереотипии, поведенческие ритуалы; харак выраженные фобии. Коммуникативная функция ре нарушена. Имеются выраженн специфические нарушения реч Интеллект выраженное сниже (IQ = 35 - 49 баллов). Возможно нарушение функци тазовых органов. Частичная дезадаптация в осно сферах жизнедеятельности, нуждается в постоянном социа сопровождении
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 -	Отсутствие визуального и вербального контакта, привлеч внимание невозможно. "Поведенческий сценарий": пр малейшем изменении постоян окружающей среды - неуправл двигательное возбуждение либ полное отрешение от окружаю многочисленные страхи, стереотипии, проявления

			539, В 610 - 639	кататонического синдрома. Ме аффективной защиты (ритуаль развиты. Интеллект: значительно выраж снижение (IQ < 34 баллов). Нарушение или отсутствие ко функции тазовых органов. Полная дезадаптация в основн сферах жизнедеятельности с нуждаемостью в постоянном постороннем уходе и надзоре
Умственная отсталость		F70 - F79	Количественная оценка стойких нарушений психиче умственной отсталости основывается на оценке степ недостаточности, объективизируемой клинически и (тест WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale, предн от 16 лет и старше); на наличии, клиническом вариа поведенческих нарушений (конфликтность, агрессив делинквентная направленность, аддиктивность, неус негативизм, истерические, отказные реакции и реакц аутизация и прочее); сопутствующей психопатологи симптоматики (пароксизмальные нарушения, паралл слуха и другие); на клиническом и социальном прог в основных сферах жизнедеятельности (производств социально-средовой). При наличии в структуре умственной отсталости сис различной степени количественно оцениваются и на функций. При невозможности или затруднении оцен недостаточности методикой Векслера в связи с особ симптоматики (тяжелые поведенческие расстройств восприятия - зрения и (или) слуха) оценка производи результатам динамического наблюдения (заключени психоневрологического диспансера)	
	Умственная отсталость легкой степени	F70		
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Легкая умственная отсталость - 69 баллов) при отсутствии ли сочетании с незначительными расстройствами поведения, соматоневрологическими нарушениями, существенно не влияющими на адаптацию в основных сферах жизнедеятел
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399	Легкая умственная отсталость - 64 балла) при отсутствии сопутствующей симптоматики легкая умственная отсталость - 69 баллов) в сочетании с умеренными стойкими

				расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективным прочими), соматоневрологичес нарушениями, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятел
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Легкая умственная отсталость - 69 баллов) в сочетании с выраженными стойкими расстройствами поведения с возможностью лишь частично коррекции; психическими нарушениями (когнитивными, аффективным прочими), соматоневрологичес нарушениями, приводящими к дезадаптации в основных сфер жизнедеятельности. Нарушени контроля функции тазовых ор
	Умственная отсталость умеренная	F71		
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Умеренная умственная отстало (IQ 35 - 49 баллов) при отсутст сопутствующей симптоматики в сочетании с незначительным стойкими расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и прочими), соматоневрологическими нарушениями, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятел
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Умеренная умственная отстало (IQ 35 - 49 баллов) при отсутст сопутствующей симптоматики умеренная умственная отстало (IQ 35 - 49 баллов) в сочетани умеренными стойкими расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективным прочими), соматоневрологичес нарушениями, приводящими к частичной дезадаптации в осн сферах жизнедеятельности. Нарушение контроля функции

				тазовых органов
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Умеренная умственная отстало (IQ 35 - 49 баллов) в сочетани выраженными и значительно выраженными стойкими расстройствами поведения пр невозможности их коррекции; психопатологическими нарушениями (затяжными психотическими состояниями, некорригируемыми аффективн двигательными нарушениями, расстройствами сферы влечен иными нарушениями), грубым соматоневрологическими нарушениями, снижением или отсутствием контроля функци тазовых органов, приводящим полной дезадаптации в основн сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного и надзора
	Умственная отсталость тяжелая	F72		
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Тяжелая умственная отсталост 20 - 34 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основн сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного и надзора. Отсутствие контроля функции тазовых органов
	Умственная отсталость глубокая	F73		
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Глубокая умственная отсталос < 20 баллов), приводящая к по дезадаптации в основных сфер жизнедеятельности с необходимостью постоянного и надзора. Отсутствие контрол функции тазовых органов

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства		F20 - F29	Количественная оценка стойких нарушений психиче шизофрении основывается преимущественно на ана темпа течения и стадии развития заболевания, типол психопатологической симптоматики, этапа, полноть выраженности эндогенных изменений личности, об экспериментально-психологически. Учитываются та прогноз; преморбидные особенности, уровень критики и ком личности, состояние адаптации в основных сферах ж (производственной, бытовой, социально-средовой)	
	Шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип течения: Кататоническая шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения Недифференцированная шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения Постшизофреническая депрессия, (шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения) Другой тип шизофрении, эпизодический ремиттирующий тип течения Шизофрения неуточненная эпизодический ремиттирующий тип течения Шизоаффективные расстройства	F20.x3 F20.23 F20.33 F20.43 F20.83 F20.93 F25		
			Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Приступ (приступы) общей продолжительностью до 4 мес год; устойчивая ремиссия с незначительной стойкой резидуальной психопатологич симптоматикой, существенно влияющей на адаптацию в осн

				сферах жизнедеятельности
			Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Приступ (приступы) общей продолжительностью от 4 до 1 месяцев в год; неполная и (или) нестойкая ремиссия с умеренной психопатологической симптоматикой, резистентной терапии, существенно затрудняющей адаптацию в основных сферах жизнедеятел
			Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Затяжные или частые приступ общей продолжительностью 1 более месяцев в год; неполная и нестойкая ремисси выраженной психопатологиче симптоматикой, резистентной терапии и приводящей к части дезадаптации в основных сфер жизнедеятельности
	Шизофрения: эпизодический тип течения с нарастающим дефектом: Параноидная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом Гебефреническая шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения Кататоническая шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения Недифференцированная шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения Постшизофреническая депрессия (шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения) Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения	F20.x1 F20.01 F20.11 F20.21 F20.31 F20.41 F20.51		

	с нарастающим дефектом Другой тип шизофрении, эпизодический ремиттирующий тип течения Шизофрения неуточненная, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом	F20.81 F20.91		
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Не более одного приступа в го продолжительностью до 4 мес стойкая ремиссия с незначительными стойкими дефицитарными расстройства эндогенными изменениями личности, существенно не влияющими на адаптацию в основных сферах жизнедеятел
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Приступ (приступы) общей продолжительностью от 4 до 6 месяцев в год; неполная и (или нестойкая ремиссия с умеренн стабильными или нарастающи дефицитарными расстройства эндогенными изменениями личности, резидуальной психопатологической симптоматикой, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятел
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Приступ (приступы) общей продолжительностью от 6 до 1 месяцев в год; неполная и нест ремиссия с выраженными стабильными или нарастающи дефицитарными расстройства эндогенными изменениями личности, резидуальной психопатологической симптоматикой, резистентной терапии, приводящими к часть дезадаптации в основных сфер жизнедеятельности
			Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной	Приступ (приступы) общей продолжительностью 10 и бол месяцев в год; значительно выраженные стойкие дефицит расстройства, эндогенные изм личности с отсутствием крити

			функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639	состоянию, возможным сниже или отсутствием контроля фун тазовых органов, приводящие полной дезадаптации в основн сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного и надзора
	Шизофрения, непрерывный тип течения: параноидная гебефреническая кататоническая, Недифференцированная, остаточная простая другой тип неуточненная	F20 F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.5 F20.6 F20.8 F20.9		
			Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Незначительные стойкие прогрессирующие дефицитарн расстройства, эндогенные изм личности, продуктивная психопатологическая симптом существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Умеренные стойкие прогрессирующие дефицитарн расстройства, эндогенные изм личности, продуктивная психопатологическая симптом существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Выраженные стойкие прогрессирующие дефицитарн расстройства, эндогенные изм личности, продуктивная психопатологическая симптом резистентная к терапии, приво к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятел
			Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Значительно выраженные стой дефицитарные расстройства (шизофреническое слабоумие) эндогенные изменения личнос продуктивная психопатологич симптоматика, резистентная к терапии, с отсутствием критик

			МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	состоянию, возможным снижен или отсутствием контроля фун тазовых органов, приводящие полной дезадаптации в основн сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного и надзора
	Шизотипическое расстройство	F21		
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Незначительные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личнос психопатологическая симптом непсихотического регистра, существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Умеренные стойкие дефицита расстройства, эндогенные изм личности, психопатологическа симптоматика непсихотическо регистра, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятел
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Выраженные стойкие дефицит расстройства; эндогенные изм личности, психопатологическа симптоматика непсихотическо регистра, приводящие к частич дезадаптации в основных сфер жизнедеятельности
			Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	Значительно выраженные стой дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личнос резистентные к терапии с отсутствием критики к состоя возможным снижением или отсутствием контроля функци тазовых органов, приводящие полной дезадаптации в основн сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного и надзора
Расстройства настроения (аффективные расстройства)		F30 - F39		
			Нарушение психических	Незначительные аффективные расстройства, общей

			функций; МКФ: B 110 - 199	продолжительностью не более месяцев в год, купирующиеся фармакотерапией, со стойкой ремиссией, существенно не влияющие на адаптацию в осн сферах жизнедеятельности
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Умеренные аффективные расстройства, стойкие затяжны частые, общей продолжительн от 6 до 10 месяцев в год, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Выраженные аффективные расстройства, стойкие затяжны частые, общей продолжительн 10 и более месяцев в год, приводящие к частичной дезадаптации в основных сфер жизнедеятельности
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Значительно выраженные аффективные расстройства, ст затяжные или частые, общей продолжительностью 10 и бол месяцев в год, приводящие к п дезадаптации в основных сфер жизнедеятельности с необходимостью постоянного и надзора
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства		F40 - F48		
	Фобические тревожные расстройства Другие тревожные расстройства Обсессивно-компульсивное расстройство Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации Диссоциативные (конверсионные) расстройства Соматоформные расстройства Другие невротические расстройства	F40 F41 F42 F43 F44 F45 F48		

			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Невротические реакции или состояния с незначительной симптоматикой невротическог круга (неврастенической, фобической, тревожно-депрессивной, обсессивно-компульсивной, истероконверсионной и прочи существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Невротические состояния с умеренными стойкими расстройствами невротическог круга (неврастеническими, фобическими, тревожно-депрессивными, обсессивно-компульсивными, истероконверсионными и проч с тенденцией к ипохондризаци существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Невротические состояния с выраженными стойкими и резистентными к терапии расстройствами невротическог круга (неврастеническими, фобическими, тревожно-депрессивными, обсессивно-компульсивными, истероконверсионными и проч с возможным переходом в патологическое развитие личн приводящие к частичной дезадаптации в основных сфер жизнедеятельности
			Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	Патологическое развитие личн со значительно выраженной, стойкой и резистентной к тера истероконверсионной симптоматикой (амавроз, псевдопаралич по типу геми- и параплегии, астазия-абазия, псевдодеменция, нарушение функции тазовых органов), с отсутствием критики к состоян приводящие к полной дезадап

				в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного и надзора
Органические, включая симптоматические, психические расстройства		F00 - F09		
	Деменция при болезни Альцгеймера (G30.-+) Сосудистая деменция Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках Деменция неуточненная Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное	F00 F01 F02 F03 F04 F06 F07 F09		
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Стойкие незначительные и умеренные астенические, незначительные когнитивные, аффективные, неврозоподобны расстройства, органические изменения личности, редкие пароксизмальные расстройств снижение интеллекта до уровн незначительной интеллектуал недостаточности (IQ = 65 - 69 баллов), существенно не влия

				на адаптацию в основных сфер жизнедеятельности
			Нарушение психических функций; МКФ: B 110 - 199	Стойкие выраженные астенич умеренные когнитивные, аффективные, неврозоподобн галлюцинаторные, бредовые расстройства, органические изменения личности, средней частоты пароксизмальные расстройства, снижение интел до уровня умеренной интеллектуальной недостаточн (IQ = 50 - 64 баллов), существе затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятел
			Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	Стойкие значительно выражен астенические, выраженные когнитивные, аффективные, неврозоподобные, галлюцинаторные, бредовые расстройства, органические изменения личности, частые пароксизмальные расстройств снижение интеллекта до уровн выраженной интеллектуальной недостаточности (IQ = 35 - 49 баллов), снижение контроля функции тазовых органов, приводящие к частичной дезадаптации в основных сфер жизнедеятельности
			Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	Стойкое значительно выражен снижение когнитивных проце интеллекта (IQ < 34) в сочетан другой психопатологической симптоматикой или без нее, отсутствие контроля функции тазовых органов, приводящие полной дезадаптации в основн сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного и надзора
Эпизодические и пароксизмальные расстройства		G40 - G47		
			Нарушение психических функций;	Легкие приступы до 3 в день, тяжелые - 1 раз в 2 месяца и ре незначительная

			МКФ: В 110 - 199	психопатологическая симптом без заметных изменений личн отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта (IQ = 65 - 69 балло существенно не сказывающие адаптации в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199	Легкие приступы (3 - 4 в день) сочетании с умеренными изменениями личности, умере патопсихологической симптоматикой; тяжелые прис 1 - 2 раза в месяц; выраженны дисфории 1 раз и реже в месяц сумеречные расстройства созн или особые состояния сознани и реже в 1,5 месяца; эпилептич статус, серийные приступы 1 р месяца и (или) умеренные изм личности, умеренная патопсихологическая симптом умеренное снижение интеллек = 50 - 64 балла), затрудняющи адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639	Легкие приступы 5 и более раз день при наличии выраженной патопсихологической симптом и изменений личности, привод к дезадаптации; тяжелые прис раза в месяц, сумеречные расстройства сознания или осо состояния сознания 1 раз в мес выраженные дисфории 2 - 3 ра месяц, эпилептический статус, серийные приступы 1 раз в 2 м и (или) выраженная патопсихологическая симптом выраженные изменения лично симптоматика психотического регистра, выраженное снижени интеллекта (IQ = 35 - 49 балло нарушение контроля функции тазовых органов, приводящие дезадаптации в основных сфер жизнедеятельности (IQ = 35 - 4
			Нарушения	Тяжелые припадки 4 и более р

			психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 510 - 539, B 610 - 639	месяц, 2 и более сумеречных расстройства сознания или осс состояний сознания, 4 и более эпизодов выраженной дисфор более эпистатусов в месяц в сочетании со значительно выраженной патопсихологиче психопатологической симптоматикой (в том числе психотического регистра), значительно выраженное сниж интеллекта (IQ < 34); отсутств контроля функции тазовых ор приводящие к полной дезадап в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного и надзора
		G00 - G99		
Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин		T90 - T98		
	Последствия травм головы Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы Последствия цереброваскулярных болезней	T90 G09 I69		
			Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B	Незначительные нарушения статодинамических функций: гемипарез, легкий парез, пара легкий атактический синдром другие легкие очаговые наруш незначительные нарушения психических, языковых и рече функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций

			199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789	Умеренные нарушения статодинамических функций: тетрапарез, умеренный гемипа умеренный парапарез; умерен атактический синдром и други умеренные очаговые нарушен умеренные нарушения психич языковых и речевых функций (дизартрия, афазия), сенсорны функций
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Выраженные нарушения статодинамических функций: умеренный тетрапарез, выраж гемипарез, выраженный парап выраженный парез; выраженн атактический синдром и други выраженные очаговые наруше выраженные нарушения психических, языковых и рече функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций; нарушен контроля функции тазовых ор
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Значительно выраженные нарушения статодинамическо функции: значительно выраже парапарез (либо параплегия), значительно выраженный гем (либо плегия); Выраженный или значительно выраженный тетрапарез (тетраплегия); значительно

			функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	выраженная статическая и динамическая атаксия (самостоятельное передвижен невозможно); значительно выраженные нарушения психических, языковых и рече сенсорных функций; отсутств контроля функции тазовых ор Вегетативное состояние
	Наследственная атаксия	G11		
	Врожденная непрогрессирующая атаксия Ранняя мозжечковая атаксия Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК Другая наследственная атаксия	G11.0 G11.1 G11.3 G11.8		
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429	Незначительные нарушения координации и равновесия, це моторики; незначительные ле сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые толь выполнении специальных тес нарушающие адаптацию и функционирование человека. Незначительные нарушения функций организма
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Умеренные нарушения коорди и равновесия, целевой мотори умеренные сенситивно-мозже нарушения, выявляемые при выполнении обычных движен нарушающие опору и передви Умеренные нарушения функц организма

			функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429	
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429	Выраженные нарушения координации и равновесия, це моторики; выраженные сенситивно-мозжечковые нару (значительно затрудняется передвижение, выполнение об движений). Выраженные нарушения функ организма
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429	Значительно выраженные нарушения координации и равновесия, целевой моторики значительно выраженные сенситивно-атактические нарушения. Значительно выраженные нарушения функций организм
	Наследственная спастическая параплегия	G11.4		
			Нарушения психических, сенсорных,	Легкий парез нижних конечно (снижение мышечной силы до баллов) без ограничения объем

			нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799	активных движений, нарушен опоры и передвижения, без деформаций стоп и формирова контрактур. Незначительные нарушения функций организма
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799	Умеренный парез нижних конечностей (снижение мыше силы до 3 баллов) с умеренны нарушением способности к передвижению, формировани деформации стоп, контрактур суставах. Умеренные нарушения функц организма
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799	Выраженный парез нижних конечностей (снижение мыше силы до 2 баллов) с выраженн нарушением способности к передвижению, с формирован деформации стоп, контрактур суставах. Выраженные нарушения функ организма
	Спинальные мышечная атрофия и родственные синдромы	G12		
			Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Периферический легкий тетра умеренный парапарез и (или) умеренный парез проксимальн отдела обеих нижних конечно (снижение мышечной силы до баллов).

			(статодинамических) функций, функций дыхательной системы, пищеварительной системы; МКФ: B 310 - 340, B 398, B 710 - 789, B 798, B 799, B 440 - 450, B 510 - 539	Умеренные бульбарные расстройства. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с умеренными нарушениями функций дыхате системы
			Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 340, B 398, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	Генерализация атрофического процесса: выраженный нижни парапарез, умеренный верхний парапарез. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с выраженными нарушениями функций дыхате и сердечно-сосудистой систем Выраженные бульбарные расстройства. Нарушение функции тазовых органов
			Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 340, B 398, B 710 - 789, B 798, B 799, B 410 -	Генерализация атрофического процесса: значительно выраже периферический тетрапарез. Тяжелые деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз), наруш функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, достигающих значительно выраженной степени. Значительно выраженные бульбарные и псевдобульбарн нарушения. Отсутствие контроля функции тазовых органов

			429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	
Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения		G20 - G26		
	Болезнь Паркинсона Вторичный паркинсонизм Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках.	G20 G21 G22		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Незначительные, легкие мотор немоторные симптомы паркинсонизма. 1 и 2 стадии болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингла - 100%
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Умеренные моторные и (или) немоторные симптомы паркинсонизма. 3 стадия болезни по шкале Хе Шкала Шваба-Ингланда 70 - 8
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Выраженные моторные и (или немоторные симптомы паркинсонизма. Умеренные продолжительные флуктуации болезненные дискинезии, част или не контролируемые оптимальной консервативной терапией. 4 стадия болезни по шкале Хе Шкала Шваба-Ингланда 50 - 6 На период подбора режима программирования при глубок стимуляции глубоких структур головного мозга; наличие осложнений после оперативно вмешательства, приводящих к выраженным нарушениям
			Нарушения нейромышечных,	Значительно выраженные мото и (или) немоторные симптомы

			скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	паркинсонизма. 5 стадия болезни по шкале Хе Шкала Шваба-Ингланда 0 - 40
	Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев Дистония Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения. Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках	G23 G24 G25 G26		
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 798, В 799	Легкие фокальные и генерализованные гиперкинез изменяющие физиологическое положение тела, общая целенаправленность движений действий сохранена. Наличие незначительных нару психических функций
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189,8 710 - 789, В 798, В 799	Умеренные фокальные и генерализованные гиперкинез изменяющие физиологическое положение тела и нарушающи последовательность и целенаправленность движений действий. Наличие незначительных или умеренных нарушений психич функций
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В	Выраженные фокальные и генерализованные гиперкинез нарушением равновесия, последовательности и целенаправленности движений действий. Наличие умеренных или выраженных нарушений психических функций

			140 - 189, B 710 - 789	
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 798, B 799	Значительно выраженные генерализованные гиперкинез контролируемые медикаменто лечением, с фиксированным патологическим положением т Наличие выраженных или значительно выраженных нарушений психических функ
Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы		G35 - G37		
	Рассеянный склероз Другая форма острой диссеминированной демиелинизации. Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы	G35 G36 G37		
			Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 340, B 398 - 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Отсутствие признаков активно заболевания в соответствии с критериями, в том числе по да МРТ. Отсутствие или незначительны нарушения функций организм (включая легкие атактические нарушения) в том числе на фо терапии препаратами, изменяю течение рассеянного склероза - ПИТРС)
			Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с	Умеренные парезы верхних и нижних конечностей, умеренн бульбарные нарушения; умере атактические нарушения, част атрофия зрительных нервов с умеренными нарушениями

			движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 340, B 398 - 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	сенсорных функций; умеренны нарушения функций тазовых органов, в том числе на фоне терапии ПИТРС
			Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 340, B 398 - 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Выраженные парезы верхних нижних конечностей, выражен бульбарные нарушения; выраженные атактические нарушения, нарушение контро функции тазовых органов, в то числе на фоне терапии ПИТРС
			Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 340, B	Значительно выраженные паре или параличи верхних и (или) нижних конечностей; значител выраженные бульбарные нару атактические нарушения, отсу контроля функции тазовых ор в том числе на фоне терапии П

			398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	
	Наследственная и идиопатическая невропатия	G60		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: B 250 - 299, B 710 - 789	Легкий парез нижних конечно без нарушения опоры и передвижения (снижение мыш силы до 4 баллов)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: B 250 - 299, B 710 - 789	Умеренный парез нижних конечностей (снижение мышеч силы до 3 баллов); изменение походки ("степаж"); незначите деформация стоп
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов	Выраженный парез нижних конечностей (снижение мышеч силы до 2 баллов), деформаци нарушающая опору и передви нарушение координации движ

			чувствительности); МКФ: B 250 - 299, B 710 - 789	
Болезни нервно-мышечного синапса и мышц		G70 - G73		
	Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса	G70		
			Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 440 - 450	Локальные формы заболевани (глазная), генерализованная и бульбарная формы с незначительными нарушениям функций организма: полная компенсация при лечении антихолинэстеразными препар (далее - АХЭП) или АХЭП в сочетании с глюкокортикоида незначительная мышечная сла и патологическая утомляемост проявляющаяся только при многократных повторных движениях или длительном статическом напряжении отде групп мышц туловища, конечн окулярных и кранио-бульбарн мышц. Положительный результат тимэктомии, позволяющий контролировать заболевание, р симптомов
			Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 440 - 450	Умеренно выраженная мышеч слабость и патологическая утомляемость мышц туловища (или) проксимальных сегмент конечностей, кранио-бульбарн мышц на фоне базисной терап колебаниями и нарастанием симптомов в течение суток, усиливающаяся при физическо нагрузке, с учетом удовлетворительного эффекта тимэктомии, приводящие к умеренным нарушениям функ организма

			Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 440 - 450	Выраженная мышечная слабос патологическая утомляемость туловища и (или) проксимальн сегментов конечностей, кранио-бульбарных мышц на ф недостаточно эффективной ба терапии, тимомтимэктомии и лучевой терапии (при злокачественной тимоме), приводящие к выраженным нарушениям функций организ
			Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 440 - 450	Значительно выраженная мыш слабость и патологическая утомляемость мышц туловища конечностей, дыхательных и (кранио-бульбарных мышц (генерализованная форма), бы прогрессирующее течение при неэффективной терапии, приводящие к значительно выраженному нарушению фун организма, что требует постоя применения интубации трахеи ИВЛ или без нее, использован зондового питания и необходи в постоянной посторонней пом уходе
	Первичные поражения мышц	G71		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 710 - 789, B 410 - 429	Снижение мышечной силы до баллов, активные движения в суставах верхних и (или) нижн конечностей сохранены в полн объеме. Незначительные нарушения функций организма
			Нарушения	Снижение мышечной силы до

			нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 710 - 789, B 410 - 429	баллов, умеренное ограничени амплитуды активных движени суставах верхних и (или) нижн конечностей, гипотрофия мыш тазового пояса и плечевого по Умеренные нарушения функц организма
			Нарушения психических, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 710 - 789, B 410 - 429	Снижение мышечной силы до баллов, выраженное ограничен амплитуды активных движени верхних и (или) нижних конечностей; выраженная гипотрофия мышц тазового по плечевого пояса. Выраженные нарушения функ организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 310 - 340, B 710 - 789, B 410 - 429	Снижение мышечной силы до балла с невозможностью самостоятельного передвижен Значительно выраженные нарушения функций организм
Церебральный паралич и другие паралитические синдромы		G80 - G83		
	Церебральный паралич	G80		
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных,	Незначительные нарушения статодинамических функций: спастический парапарез, легки гемипарез (мышечная сила 4 б с сохранением активных движ

			скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799	суставах верхних и нижних конечностей в полном объеме, имеет место тугоподвижность легкая контрактура суставов, л деформация стопы (стоп) и (ил кисти (кистей) вследствие повышенного тонуса; незначительная гипотрофия м укорочение конечности (конечностей). Незначительная туловищная (статическая) атаксия, легкая мышечная гипотония с незначительным переразгибан суставах, некоординированной походкой; незначительные нарушения ме и целевой моторики. Незначительный псевдобульба синдром, не затрудняющий фо и глотание; отсутствие нарушений, либо незначительные нарушения языковых и речевых функций (дизартрия). Незначительные нарушения психических функций (незначительное когнитивное снижение, IQ = 65 - 69 баллов)
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799	Умеренные нарушения статодинамических функций: тетрапарез, умеренный спасти парапарез, умеренный гемипар (мышечная сила 3 балла) с умеренными контрактурами суставов, умеренной деформа стопы (стоп) и (или) кисти (ки умеренной гипотрофией мыш укорочением конечности. Умеренный спастико-гиперкинетический синдром: умеренные ассиметр спастико-гиперкинетические г активные движения в суставах умеренно ограничены (в боль степени вследствие гиперкине Умеренная туловищная (статическая) атаксия, умерен мышечная гипотония с

				переразгибанием в суставах, некоординированной походко медленном темпе, затруднены сложные виды движений; умеренные нарушения мелкой целевой моторики. Умеренный псевдобульбарный синдром (дизартрия, дисграфи дислексия, дисфония, дисфаги нарушением фонации и глотан умеренными языковыми и реч нарушениями (дизартрия). Сочетание двигательных нару с умеренным когнитивным снижением и (или) умеренным снижением интеллекта (IQ = 5 баллов)
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Выраженные нарушения статодинамических функций: умеренный тетрапарез, выраж спастический парапарез, выраженный гемипарез (мыше сила 2 балла) с выраженными контрактурами суставов, с выраженной деформацией сто (стоп) и (или) кисти (кистей); с фиксированным порочным положением стоп и (или) кист затрудняющим опору и передвижение, схват и удержа предметов. Выраженный спастико-гиперкинетический синдром: выраженные ассиметричные спастико-гиперкинетические н значительно ограничивающие активные движения в суставах Выраженная мышечная гипото туловищная (статическая) ата препятствующая вертикализац самостоятельному передвижен Выраженный псевдобульбарн синдром с нарушение фонации глотания, выраженными языко и речевыми нарушениями (дизартрия). Сочетание двигательных нару с выраженным когнитивным

				снижением и (или) снижением интеллекта до уровня умеренн умственной отсталости (IQ = 3 баллов). Нарушение контроля функции тазовых органов
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 210 - 299, B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Значительно выраженные нарушения статодинамических функций: выраженный или значительно выраженный тетрапарез, нижний спастичес парапарез, значительно выраж гемипарез или гемиплегия (мышечная сила 1 балл), нижн параплегия (мышечная сила 0 баллов) с множественными комбинированными контракту суставов конечностей; фиксированным порочным положением стоп и (или) кист нарушение координации движ равновесия, значительно затрудняющих вертикализаци опору и передвижение. Либо отсутствие произвольных дви в конечностях, туловище, фиксированное патологическо положение тела (в положении с незначительными нецеленаправленными движен (поворот набок с помощью). Значительно выраженный спастико-гиперкинетический синдром: выраженный или значительно выраженный спастический тетрапарез, значительно выраженные асимметричные спастико-гиперкинетические п значительно выраженные комбинированные контрактур суставах конечностей; движен суставах практически отсутств большей степени вследствие гиперкинезов), значительно выраженный атетоз и (или) дв атетоз и (или) баллизм, торсио дистония с невозможностью отсутствием вертикализации,

				и передвижения. Значительно выраженная туловищная (статическая) ата значительно выраженная динамическая атаксия, значите выраженная мышечная гипото препятствующая точным движениям, схвату и удержани предметов, формированию вертикальной позы и произво движений. Значительно выраженный псевдобульбарный синдром (отсутствие функций жевания, глотания, анартрия), отсутстви устной речи. Значительно выраженное когнитивное снижение и (или) снижение интеллекта до уров тяжелой или глубокой умствен отсталости (IQ < 34 баллов). Отсутствие контроля функции тазовых органов
	Гемиплегия Параплегия и тетраплегия Другие параплегические синдромы	G81 G82 G83		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789	Верхние конечности: легкий (4 балла) парапарез, легкий диста или умеренный (3 балла) проксимальный парапарез, умеренный или выраженный монопарез, в том числе дистал или проксимального отдела ве конечности; Нижние конечности: легкий парапарез, легкий проксимальн или умеренный дистальный парапарез, умеренный или выраженный монопарез, в том дистального или проксимальн отдела нижней конечности, приводящие к незначительном нарушению статодинамическо функции
			Нарушения нейромышечных, скелетных и	Верхние конечности: умеренн парапарез, умеренный дистальн выраженный (2 балла)

			связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	проксимальный парапарез, значительно выраженный (1 б монопарез, дистальная моноп Нижние конечности: умеренн парапарез, выраженный диста умеренный проксимальный парапарез, значительно выраж монопарез, моноплегия, незначительный тетрарапарез; умеренный гемипарез (снижен мышечной силы до 3 баллов); тетрапарез, приводящие к умеренному нарушению статодинамической функций
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	Верхние конечности: выражен парапарез, выраженный диста значительно выраженный проксимальный парапарез; ни конечности: выраженный пара значительно выраженный дистальный, выраженный проксимальный парапарез; выраженный гемипарез (сниж мышечной силы до 2 баллов); умеренный тетрапарез, приво к выраженному нарушению статодинамической функции
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	Значительно выраженный гемипарез, значительно выраж трипарез, выраженный тетрапа значительно выраженный пара рук, значительно выраженный проксимальный парапарез ног параплегия рук, ног, гемиплег триплегия, тетраплегия (сниже мышечной силы до 1 балла) со значительно выраженными нарушениями статодинамичес функции
		H00 - H59		
			Острота зрения	
			Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Острота зрения (лучше видящ или единственного глаза в усл максимальной переносимой коррекции) > 0,3

			Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Острота зрения (лучше видящ или единственного глаза в усл максимальной переносимой коррекции) коррекцией) более 0,3 (включительно)
			Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Острота зрения (лучше видящ глазом с коррекцией) 0,1 - 0,05
			Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Острота зрения (лучше видящ глазом с коррекцией) 0,04 - 0.
				Острота зрения (лучше видящ или единственного глаза с оптимальной коррекцией) 0 - 0
			Концентрическое сужение полей зрения (по 8 основ фиксации); контрольно со смещенным центром фик градусов, кампиметрия	
			Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Концентрическое сужение пол зрения лучше видящего или единственного глаза от 60° до (включительно) без абсолютн скотом в остаточных полях зр
			Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Концентрическое сужение пол зрения лучше видящего или единственного глаза менее 40° 20° (включительно)
			Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Концентрическое сужение пол зрения лучше видящего или единственного глаза менее 20° 10° (включительно)
			Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Концентрическое сужение пол зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°
			Скотомы в центральном поле зрения (град.)	
			Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Относительные парацентральн несливные скотомы
			Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229	Единичные, сливные абсолют центральные скотомы до 5 гра и сливные абсолютные парацентральные скотомы или кольцевидные скотомы при концентрическом сужении пол зрения лучше видящего или единственного глаза от 55 до 4 градусов (включительно)

			Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Центральные абсолютные ско более 5 до 10 лучше видящего единственного глаза
			Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: B 210 - 229	Центральные абсолютные ско более 10 лучше видящего или единственного глаза
		H60 - H95		
	Болезни уха и сосцевидного отростка	H60 - H95		
			Нарушения сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: B 230 - 349 (слух), B 310 - 340	Врожденная или приобретенна детстве глухота или тугоухост степени с речевыми нарушени
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 230 - 349 (слух)	Тугоухость I - IV степени, односторонняя. Тугоухость I - степени, двусторонняя
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 230 - 349 (слух)	Тугоухость III и IV степени, двусторонняя. Глухота двусто
			Нарушения психических, сенсорных функций; МКФ: B 230 - 349 (слух), B 110 - 139, B 140 - 189	Глухонемота, сопровождающа психическими нарушениями (незначительными, умеренны выраженными)
				Глухонемота, сопровождающа значительно выраженными нарушениями психических фу
			Профессионально обусловленная потеря слуха (глух	
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 230 - 349 (слух)	Тугоухость I - III степени, двусторонняя
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 230 - 349 (слух)	Тугоухость IV степени, двусторонняя, глухота двусто
Комбинированное нарушение зрения и слуха				

			Слепоглухота	
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрение), В 230 - 349 (слух)	Двусторонняя тугоухость III с в сочетании с высокой степен слабовидения (острота зрения видящим глазом с максимальн переносимой коррекцией 0,1 -
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрение), В 230 - 349 (слух)	Высокая степень слабовидени (острота зрения (лучше видящ глазом с максимально перенос коррекцией в пределах 0,1 - 0, сочетании с глухотой
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: В210 - 229 (зрение), В 230 - 349 (слух)	Полная (тотальная) или практическая слепоглухота
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: В210 - 229 (зрение), В 230 - 349 (слух)	Полная (тотальная) или практическая слепота в сочета тугоухостью III - IV степени
		I00 - I99		
Хронические ревматические болезни сердца Другие болезни сердца		I05 - I09 I30 - I52		
	Ревматические болезни митрального клапана Неревматические болезни аортального клапана Ревматические болезни трехстворчатого клапана Поражение нескольких клапанов Другие ревматические болезни сердца Неревматические поражения митрального клапана	I05 I06 I07 I08 I09 I34		

	Неревматические поражения аортального клапана Неревматические поражения трехстворчатого клапана Поражение клапана легочной артерии	I35 I36 I37		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Ревматические и неревматичес болезни клапана или клапанов сердца, клапана легочного ств ревматический миокардит, эндокардит и перикардит без признаков воспалительного процесса, с незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (стенокардия I функционально класса (далее - ФК), II ФК), ле нарушения сердечного ритма, снижение сердечного выброса ХСН 0 стадии или I стадии
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Ревматические и неревматичес болезни клапана или клапанов сердца; клапана легочного ств ревматический миокардит, эндокардит и перикардит акти течения, с умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (стенокардия III ФК, легочная гипертензия 2-й степени, умер нарушения сердечного ритма, снижение сердечного выброса ХСН IIA стадии
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Ревматические и неревматичес болезни клапана или клапанов сердца; клапана легочного ств ревматический миокардит, эндокардит и перикардит акти течения, с выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (легочная гипертензия 3-й сте стенокардия III ФК, тяжелые нарушения сердечного ритма, снижение ФВ левого желудоч менее 30%) с ХСН IIБ стадии

			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Ревматические и неревматичес болезни клапана или клапанов сердца; клапана легочного ств ревматический миокардит, эндокардит и перикардит акти течения, со значительно выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (легочная гипертензи степени, стенокардия IV ФК, тяжелые нарушения сердечно ритма, снижение ФВ левого желудочка менее 30%) с ХСН стадии
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением		I10 - I15		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Артериальная гипертензия 1 - степени, гипертоническая боле стадии без нарушения функци органов-мишеней.
			Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299	Артериальная гипертензия 1 - степени, гипертоническая боле стадии с умеренными наруше функций органов-мишеней
			Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299	Артериальная гипертензия 1 - степени, гипертоническая боле стадии с выраженными нарушениями функций органов-мишеней
			Нарушения функций сердечно-сосудистой	Артериальная гипертензия 1 - степени, гипертоническая боле

			системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 210 - 299	стадии со значительно выраженными нарушениями функций органов-мишеней
Ишемическая болезнь сердца		I20 - I25		
	Стенокардия (грудная жаба)	I20		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия или безболевая ишемия миокарда I ФК (75 - 100 Вт); ХСН 0 стади I стадии
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Умеренные нарушения функци сердечно-сосудистой системы стенокардия или безболевая ин миокарда, ФК III (50 Вт) при наличии ХСН I стадии, IIA ста
			Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639	Выраженные нарушения функ сердечно-сосудистой системы стенокардия или безболевая ин миокарда ФК III (50 Вт) при на ХСН IIБ стадии
			Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639	Значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы стенокардия и безболевая ише ФК IV (25 Вт) при наличии ХС стадии или III стадии
	Хроническая ишемическая болезнь сердца Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада и блокада левой ножки пучка Гиса Сердечная недостаточность Кардиомиопатия Пароксизмальная тахикардия	I25 I44 I50 I42 I47		

	Фибрилляция и трепетание предсердий Другие нарушения сердечного ритма Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов Последствия травмы внутригрудных органов Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения	I48 I49 I97 Z95 T91.4 Q20 - Q28		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН I стадии
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Умеренные нарушения функци сердечно-сосудистой системы IIA стадии
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Выраженные нарушения функ сердечно-сосудистой системы IIБ стадии
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы III стадии
	Наличие трансплантированного сердца Наличие трансплантированных сердца и легкого	Z94.1 Z94.3		
ание				
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 139, B	Состояние после трансплантац сердца или одновременно серд легкого в течение первых 2 ле

			140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439	
твование (после 2-х летнего наблюдения)				
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439	По истечении 2-летнего срока наличии осложнений с умерен нарушениями функций органи
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439	По истечении 2-летнего срока наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439	По истечении 2-летнего срока наличии осложнений со значит выраженными нарушениями функций организма
	Первичная легочная гипертензия Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности Легочно-сердечная недостаточность неуточненная	I27.0 I27.8 I27.9		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем;	Незначительные нарушения функций организма на фоне эффективной специфической

			МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	терапии: легочная гипертензия
			Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	Умеренные нарушения функци организма на фоне специфичес терапии: легочная гипертензия
			Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	Выраженные нарушения функ организма на фоне специфичес терапии: легочная гипертензия III
			Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	Значительно выраженные нарушения функций организм фоне специфической терапии: легочная гипертензия ФК IV
Болезни артерий, артериол и капилляров		I70 - I79		
	Атеросклероз Другие болезни периферических сосудов	I70 I73		
			Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	I, IIA степень ишемии при нал сегментарных окклюзий или стенозов (более 65%) артерий конечностей, без клинических проявлений. Лодыжечно-плечевой индекс (- ЛПИ) - 0,75 и более. После хирургической реваскуляризации при полном восстановлении кровообращен (компенсации кровообращени
			Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	IIБ степень ишемии при налич сегментарных окклюзий или стенозов артерий (свыше 65%) менее 0,75 - 0,25 После хирургической реваскуляризации с сохраняю дистальным блоком, с субкомпенсацией кровообращ
			Нарушения функций сердечно-сосудистой,	III или IV степень ишемии, ЛП менее 0,25. После хирургическ

			дыхательной систем; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 710 - 789	реваскуляризации с сохраняю дистальным блоком, с ограниченными трофическими нарушениями (язва, некроз), декомпенсацией кровообраще Ампутационные культи бедра голени одной конечности и IIБ степенью ишемии другой конечности; при наличии медицинских противопоказани протезирования; ишемия куль бедра; при сопутствующих заболеваниях с выраженными нарушениями функций органи (ХСН IIБ стадии, III стадии, Д стадии)
			Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	III или IV степень ишемии, вк двусторонние трофические нарушения, ЛПИ менее 0,25 п наличии противопоказаний дл оперативных вмешательств. Ампутационные культи обоих пороки или болезни культей; н невозможности пользования протезами из-за сопутствующ заболеваний; ишемии культей
	Аневризма и расслоение аорты Другая аневризма и расслоение	I71 I72		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Незначительное локальное расширение сосуда ("малые аневризмы"); после имплантац стент-графтов с полной компенсацией кровообращени Отсутствие или незначительны нарушения функций организм
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B	Наличие "большой" (более 5 с аневризмы аорты и (или) круп артерий таза с клиническими проявлениями при наличии медицинских противопоказани хирургическому лечению. После резекции "больших" аневризм, протезирования аор крупных артерий таза или имплантации стент-графтов с

			710 - 789	субкомпенсацией кровообращ
			Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	Крупные аневризмы брюшной и (или) крупных артерий таза н наличии медицинских противопоказаний к хирургиче лечению; После резекции "больших" аневризм, протезирования аор крупных артерий таза или имплантации стент-графтов с послеоперационными осложне и декомпенсацией кровообращ
Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках		I80 - I88		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Хронические заболевания вен, соответствующие 2 - 3 классу клинических проявлений международной классификаци хронических болезней вен
			Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	Хронические заболевания вен язвенным дефектом со значительными трофическими нарушениями на одной конечн или язвенный дефект без значительной продукции отделяемого секрета на обеих конечностях, соответствующи классу клинических проявлени международной классификаци хронических болезней вен Двустороннее поражение со значительными трофическими нарушениями, без язвенных дефектов, соответствующих 4 классу клинических проявлени международной классификаци хронических болезней вен с умеренными нарушениями статодинамических функций
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с	Хронические заболевания вен язвенными дефектами со значительной продукцией отделяемого секрета и трофическими нарушениями н обеих нижних конечностях,

			движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789	соответствующих 4 - 6 классу клинических проявлений международной классификаци хронических болезней вен с выраженными нарушениями статодинамических функций
	Лимфоотек, не классифицированный в других рубриках	I89.0		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789, B 798, B 799	Лимфедема с хронической лег недостаточностью I степени с увеличением объема конечнос (больше чем на 3 см) с незначительными нарушениям функций организма
			Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789, B 798, B 799	Лимфедема с хронической лег недостаточностью II степени (увеличением объема на 4 - 6 с обеих нижних конечностей ил степени (увеличение объема н 10 см) одной конечности со значительными трофическими нарушениями, с умеренными нарушениями функций органи
			Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 789, B 798, B 799	Лимфедема с хронической легочно-венозной недостаточн III, IV степени обеих нижних конечностей со значительным трофическими нарушениями, значительной продукцией отделяемого секрета, с выраженными осложнениями нарушениями функций органи
		J00 - J99		

	Хронические болезни нижних дыхательных путей Болезни легкого, вызванные внешними агентами Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей Другие болезни органов дыхания Приобретенное отсутствие легкого (или его части) Саркоидоз Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания	J40 - J47 J60 - J70 J80 - J84 J85 - J86 J95 - J99 Z90.2 D86 Q30 - Q34		
			Нарушение функции дыхательной системы; МКФ: B 440 - 449	Легкая или среднетяжелая фор течения заболевания, последст оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на базисной терапии (Международ система классификации сужен дыхательных путей при хрони обструктивной болезни легких (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; GOL GOLD 1: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 >= 80%) без хроническо дыхательной недостаточности 0) либо с признаками ДН I сте
			Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 -	Среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на базисной терапии (GOLD 2: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70% >= ОФВ1 < 80%), ДН II степен преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН

			139, B 140 - 189, B 198, B 199	стадии или ХСН 1 стадии)
			Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Среднетяжелая и тяжелая фор течения заболевания, последст оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на базисной терапии (GOLD 3: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, 30% >= < 50%) с ДН II степени, III сте ХСН IIA стадии
			Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Тяжелая форма течения заболе последствия оперативных вмешательств с бронхиальной обструкцией (GOLD 4: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 < наличие осложнений, ДН III степени, ХСН IIБ стадии, III с
	Астма	J45		
			Нарушение функции дыхательной системы; МКФ: B 410 - 429	Незначительные нарушения функции дыхательной системы легкое или среднетяжелое тече заболевания (на фоне базисной терапии низкими или средним дозами ингаляционных кортикостероидов), ДН 0 степ или ДН I степени
			Нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449	Среднетяжелое течение заболе (на фоне базисной терапии сре дозами ингаляционных кортикостероидов), ДН II степ преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН стации или ХСН 1 стадии)
			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, нарушение психических функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 -	Тяжелое течение заболевания фоне базисной терапии высок дозами ингаляционных кортикостероидов) с ДН II сте III степени, ХСН IIA стадии

			139, B 140 - 189, B 198, B 199	
			Нарушение функции дыхательной, сердечно-сосудистой систем, нарушение психических функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Тяжелое течение заболевания фоне базисной терапии с ДН I степени, ХСН IIБ и III стадии
	Наличие трансплантированного легкого	Z94.2		
			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 450, B 410 - 429, B 430 - 439	При первичном освидетельствовании после трансплантации легкого в тече первых 2 лет
				При повторном освидетельствовании по истеч 2-летнего срока после трансплантации легких при на осложнений с умеренными нарушениями функций органи
				По истечении 2-летнего срока трансплантации легких при на осложнений с выраженными нарушениями функций органи
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	По истечении 2-летнего срока трансплантации легких при на осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
	Респираторные нарушения после медицинских	J95		

	процедур, не классифицированные в других рубриках			
			Нарушения функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 440 - 449, B 310 - 340, B 398, B 399	Наличие функционирующей постоянной трахеостомы, сохр либо малоразборчивая речь. ДН 0 степени или ДН I степен
			Нарушения функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 440 - 449, B 310 - 340, B 398, B 399	Наличие функционирующей постоянной трахеостомы с выраженными нарушениями языковых и речевых функций, вплоть до потери экспрессивн речи, наличием ДН II степени ДН III степени и других ослож
		K00 - K93		
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения		K00 - K14 Q38 - 45		
	Челюстно-лицевые аномалии (включая аномалии прикуса) Расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть)	K07 Q35 - Q37		
			Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 510 - 539, B 310 - 340, B 398, B 399	Последствия комплексного ле челюстно-лицевых аномалий, врожденной расщелины губы, мягкого и твердого неба в вид незначительных нарушений языковых речевых функций и функций пищеварительной си
			Нарушения функций	Утрата части нижней или верх

			пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 510 - 539, B 310 - 340, B 398, B 399	челюсти, контрактура челюсти нарушением структуры носа, придаточной пазухи (пазух); последствия перенесенных оперативных вмешательств по поводу врожденной расщелин губы, мягкого и твердого неба умеренными нарушениями нарушений языковых речевых функций и функций пищеварительной системы
Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки Другие болезни органов пищеварения Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения		K20 - K31 K90 - 93 Q38 - 45		
	Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного тракта Наличие другого уточненного функционального имплантата Непроходимость пищевода	Q39 Z90.4 Z96.8 K22.2		
			Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Незначительное нарушение фу пищеварительной системы пос реконструктивных операций н пищеводе
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Умеренное нарушение функци организма после реконструкти операций на пищеводе
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной	Выраженное нарушение функ пищеварительной системы пос реконструктивных операций н

			системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	пищеводе
	Другие врожденные аномалии (пороки развития) верхней части пищеварительного тракта Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз толстого кишечника Приобретенное отсутствие части желудка Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного тракта Синдромы оперированного желудка Состояние, связанное с наложением кишечного анастомоза	Q40 Q41 Q42 Z90.3 Z90.4 K91.1 Z98.0		
			Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Наличие легкого синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром синдром приводящей петли, короткой кишки и другие синд без потери массы тела, незначительные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы 100 - 2 мкг\г, незначительные наруше уровень компенсации (гликированный гемоглобин Н 6,5%; гликемия натощак 4 - 8 ммоль\л)
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B	Наличие средней тяжести синд оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром синдром приводящей петли, короткой кишки и другие синд с мальдигестией и мальабсорб умеренными нарушениями метаболизма, наличие экзокри

			540 - 559, В 430 - 439	недостаточности по фекальной эластазе (от 100 до 200 мкг/г) н фоне заместительной терапии, умеренные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы 60 - 10 мкг\г; умеренные нарушения эндокринной недостаточности (HbAlc < 7,5 - 9% гликемия бо ммоль\л) с учетом нутритивно статуса.
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	Наличие тяжелого синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром синдром приводящей петли, короткой кишки и другие синд с выраженной мальдигестией, мальабсорбцией и нарушениям метаболизма, наличие экзокри недостаточности по фекальной эластазе (менее 100 мкг/г) на ф заместительной терапии; выраженные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - мене мкг\г; выраженные нарушения HbAlc более 9%; гликемия бол ммоль\л) с учетом нутритивно статуса
Неинфекционный энтерит и колит		K50 - K52		
	Болезнь Крона (регионарный энтерит) Язвенный колит Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	K50 K51 K52		
			Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539	Хроническое течение заболева (рецидив воспалительного про до 2 раз в год), клинико-лабораторная и (или) эндоскопическая ремиссия (1 м более) с отсутствием клиничес симптомов заболевания, лабораторных и эндоскопичес признаков воспалительной активности, либо с минимальн активностью процесса, в том ч на фоне постоянного приема

				противовоспалительной терап отсутствие или незначительно выраженные внекишечные проявления
			Нарушения функций пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 430 - 439	Рецидивирующее течение (обострения 2 - 3 раза в год); хроническое непрерывное тече заболевания (левосторонний к терминальный илеит, в том чи сочетании с поражением толст кишки) клинико-лабораторная (или) эндоскопическая умерен активность заболевания на фо проведения базисной терапии, умеренными нарушениями фу пищеварительной системы; наличием кишечных осложнен (стриктуры, межкишечные и прямокишечные свищи, ректовагинальные свищи), внекишечных проявлений умеренной тяжести, состояние хирургического лечения с формированием стомы или тонкокишечного резервуара
			Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы; системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 710 - 789, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 540 - 559	Рецидивирующее течение (обострения 4 - 5 раз год); хроническое непрерывное тече заболевания с поражением все кишечника (панколит, распространенный илеит) клинико-лабораторная и(или) эндоскопическая выраженная активность процесса на фоне проведения базисной терапии; свищевая, стенозирующая фор заболевания, а также наличие инфильтрата, ведущие к выраженным нарушениям фун пищеварительной системы; наличием стойких локальных внекишечных проявлений сред тяжести, необходимость прове постоянной цитостатической и биологической терапии, терап селективными иммунодепрессантами

			Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 710 - 789, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 540 - 559	Терминальная стадия заболева тотальным поражением кишеч значительно выраженными нарушениями пищеварения (мальабсорбция и малдигестия тяжелой степени, кахексия), др органов и систем организма пр неэффективности базисной тер малигнизации, последствиях массивной резекции кишечник
Другие болезни кишечника		K55 - K63		
	Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью Брюшинные спайки	K56.5 K66.0		
			Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Спаечная болезнь с редкими (раза в год) приступами кишеч непроходимости, купирующим консервативно (в амбулаторны условиях)
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Спаечная болезнь с приступам кишечной непроходимости 5 и раз в год, купирующимися консервативными методами те в условиях стационара или требующие оперативного вмешательства
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма,	Непрерывно рецидивирующее прогрессирующее течение спа болезни, требующее стационар лечения, не поддающиеся консервативной терапии и

			системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	требующие оперативного вмешательства
Болезни печени Вирусный гепатит Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения		K70 - K77 K15 - K19 Q38 - Q45		
Вирусный гепатит		B15 - B19		
			Нарушения функций пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 430 - 439	Хронический гепатит с лабораторными показателями цитолиза, холестаза, мезенхимального воспаления и печеночной недостаточности 1 степени; с отсутствием или незначительными клинически проявлениями. Отсутствие фиброза либо незначительные признаки фиб (F0 или F1 по по Международ шкале гистологической оценк фиброза печени при вирусном гепатите (Meta-analysis of Histological Data in Viral Hepat METAVIR) (далее - METAVIR
			Нарушения функций пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 430 - 439	Прогрессирование хроническо гепатита с лабораторными показателями цитолиза, холест мезенхимального воспаления и печеночной недостаточности 3 степени; с умеренными клиническими проявлениями н фоне базисной терапии. Умеренные или выраженные признаки фиброза (F2 или F3 н шкале METAVIR)
	Алкогольный фиброз и склероз печени Алкогольный цирроз печени Токсическое поражение печени с печеночным некрозом Фиброз и цирроз печени Врожденные аномалии (пороки развития) желчного	K70.2 K70.3 K71.1 K74 Q44		

	пузыря, желчных протоков и печени			
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 139, B 140 - 189	Цирроз печени (A0, F4 по шка METAVIR) компенсированны неактивный (класс по Международной оценочной методике, предназначенной дл определения тяжести циррозо печени и выживаемости пацие предложенной C. Child в 1972 (далее - Чайлд-Пью) A по Чайлд-Пью). Отсутствие или незначительны нарушения функций организм
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 139, B 140 - 189	Цирроз печени (A1 - 2, F4 по ш METAVIR) компенсированны (класс A по Чайлд-Пью) с умеренными нарушениями фу организма
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 139, B 140 - 189	Цирроз печени (A1 - 3, F4 по ш METAVIR) субкомпенсирован (класс B по Чайлд-Пью) с выраженными нарушениями функций организма
			Нарушения функций	Цирроз печени (A1 - 3, F4 по ш

			пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 139, В 140 - 189	METAVIR) декомпенсированн (класс С по Чайлд-Пью) со значительно выраженными нарушениями функций органи
	Наличие трансплантированной печени	Z94.4		
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189	При первичном освидетельствовании после трансплантации печени в тече первых 2 лет
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических	При повторном освидетельствовании по истеч 2-летнего срока после трансплантации печени при на осложнений с умеренными нарушениями функций органи

			функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	По истечении 2-летнего срока трансплантации печени при на осложнений с выраженными нарушениями функций органи
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189	По истечении 2-летнего срока трансплантации печени при на осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной		K80 - K87		

железы				
	Хронический панкреатит алкогольной этиологии. Другие хронические панкреатиты	K86.0 K86.1		
			Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Отсутствие или незначительны нарушения функции пищеварительной системы
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Умеренные нарушения экзо- и эндокринной функции поджелудочной железы
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Выраженные нарушения экзо-эндокринной функции поджелудочной железы
		L00 - L99		
Буллезные нарушения		L10 - L14		
	Пузырчатка (пемфигус) Пемфигоид	L10 L12		
			Нарушения функции кожи и связанных с ней систем, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 810 - 849, B 430 - 439	Единичные высыпания на кож слизистых оболочках с незначительными нарушениям функций организма
			Нарушения функции кожи и связанных с ней систем, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 810 - 849, B 430 - 439	Распространенное поражение (более 2 анатомических област (или) слизистых оболочек, в то числе внутренних органов, с умеренными нарушениями фу организма, резистентность к проводимой системной терапи
Дерматит и экзема		L20 - L30		
	Аллергический контактный дерматит	L23		
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем;	Ограниченный дерматит, обос до 2 раз в год на фоне проводи лечения

			МКФ: B 810 - 849	
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Распространенный дерматит, обострения более 2 раз в год
	Атопический дерматит	L20		
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Ограниченная или распростра форма заболевания с площады поражения кожи до 50%, обос до 2 раз в год на фоне проводи лечения
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Распространенная форма с площадью поражения кожи 50 более, обострения 3 и более ра год, склонность к торпидному течению, резистентность к проводимой терапии
Папулосквамозные нарушения		L40 - L45		
	Псориаз	L40	Количественная оценка нарушений функций органи описана в пункте 13.1 настоящей количественной си	
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Псориаз с площадью поражени 50% с незначительным наруше функций организма
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Частые (более 2 раз в год) обострения или непрерывно рецидивирующее течение заболевания при площади поражения кожи более 50%, резистентность к проводимой терапии. Частые (более 2 раз в год) обострения или непрерывно рецидивирующее течение ладонно-подошвенного псориа резистентность к проводимой терапии
Болезни придатков кожи		L60 - L75		
	Алопеция тотальная	L63.0		
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Тотальное облысение, с отсут бровей и ресниц
Другие болезни кожи и подкожной клетчатки		L80 - L99		
	Локализованная склеродермия (morphea)	L94.0		

	Линейная склеродермия	L94.1		
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Поверхностные формы склеродермии без нарушений незначительными нарушениям кожи и связанных с ней систем
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Глубокая форма склеродермии вовлечении в процесс кожи и подкожной клетчатки, фасций мышц, костей с образованием рубцов (вплоть до укорочения конечности и образования контрактур), сопровождающие умеренными нарушениями фу организма (в зависимости от локализации
Врожденные аномалии (пороки развития)		Q80 - Q89		
	Буллезный эпидермолиз	Q81		
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849	Ограниченные формы
			Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной системы; МКФ: B 810 - 849, B 710 - 789, B 210 - 279, B 510 - 539	Поражения кожи (в том числе активных поверхностей - кист стоп), слизистых оболочек внутренних органов, приводящ умеренным нарушениям функ организма
			Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сенсорных	Поражения кожи, слизистых оболочек внутренних органов приводящие к выраженным нарушениям функций организ

			функций, нарушение функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 810 - 849, B 710 - 789, B 210 - 279, B 510 - 539, B 410 - 429, B 610 - 639	
		M00 - M99		
Воспалительные полиартропатии Артрозы		M05 - M14 M15 - M19		
	Серопозитивный ревматоидный артрит Синдром Фелти Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем Другие серопозитивные ревматоидные артриты Серопозитивный ревматоидный артрит неуточненный Другие ревматоидные артриты Серонегативный ревматоидный артрит Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых Другие уточненные ревматоидные артриты Юношеский артрит с системным началом	M05 M05.0 M05.3 M05.8 M05.9 M06 M06.0 M06.1 M06.8 M08.2		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных	Отсутствие или незначительно нарушение функции организм I; рентгенологическая стадия I отсутствие или I степень акти заболевания; отсутствие систе проявлений заболевания; отсу осложнений заболевания и (ил

			функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	проводимой терапии
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Умеренное нарушение функци организма: ФК II; рентгенологическая стадия II; степень активности заболеван отсутствие системных проявле заболевания; наличие осложне заболевания и (или) проводим терапии, приводящей к умерен выраженным нарушениям фун организма

			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Выраженное нарушение функ организма: ФК II - III; рентгенологическая стадия II - - III степень активности заболе наличие системных проявлени заболевания; наличие осложне заболевания и (или) проводим терапии, приводящей к выраж нарушениям функций организ
	-		Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем;	Значительно выраженные нарушения функции организм IV (обоих тазобедренных, или двух крупных суставов в функционально невыгодном состоянии); рентгенологическа стадия III - IV; вне зависимост активности заболевания на фо терапии; наличие системных проявлений заболевания; нали осложнений заболевания и (ил проводимой терапии, приводя значительно выраженным нарушениям функций организ

			МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия (L40.5+) Мутилирующий артрит (L40.5+) Псориатический спондилит (L40.5+) Другие псориатические артропатии (L40.5+)	M07.0 M07.1 M07.2 M07.3		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Отсутствие или незначительно нарушение функции организм отсутствие или незначительно нарушение функции суставов энтезисов и (или) позвоночни отсутствие или низкая активно заболевания; отсутствие осложнений заболе и (или) проводимой терапии
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с	Умеренное нарушение функци суставов и (или) энтезисов и (позвоночника; Умеренная активность заболев

			движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	наличие осложнений заболева (или) проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организ
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 -	Выраженное нарушение функ суставов и (или) энтезисов и (позвоночника; умеренная или высокая активность заболеван наличие осложнений заболева (или) проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организ

			429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Значительно выраженное нару функции суставов и (или) энте и (или) позвоночника; вне зависимости от активности заболевания на фоне терапии; множественные эрозии суста (более 5) остеонекрозов крупн суставов, при наличии осложн заболевания и (или) проводим терапии, приводящей к значит выраженным нарушениям фун организма. Отсутствие ответа терапию
	Подагра Другие кристаллические артропатии	M10 M11		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы,	Отсутствие или незначительно нарушение функции суставов; отсутствие тофусов; отсутстви осложнений заболевания и (ил проводимой терапии

			эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Умеренное нарушение функци суставов; Хроническое течение артрита; тофусная форма (подкожные тофусы); наличие осложнений заболевания и (или) проводим медикаментозной терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организ
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Выраженное нарушение функ суставов; хроническое течение артрита; тофусная форма (подкожные и внутрикостные тофусы); наличие осложнений заболева

			функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	(или) проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организ
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 -	Значительно выраженное нару функции суставов; Хроническое течение артрита; тофусная форма (множественн внутрикостные тофусы, с поражением крупных суставов наличие осложнений заболева (или) проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям фун организма

			639, B 810 - 849	
	Артрозы	M15 - M19		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Нарушение функции суставов - НФС); НФС 1; рентгенологическая ст - II; отсутствие осложнений заболевания и (или) проводим терапии
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной	Умеренное нарушение функци суставов; НФС II; рентгенологическая стадия II - наличие осложнений заболева (или) от проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организ

			функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Выраженное нарушение функ суставов; НФС III; Генерализованная форма заболевания; рентгенологическая стадия III наличие осложнений заболева (или) от проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организ
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной,	Значительно выраженное нару функции суставов; НФС-IV; генерализованная форма заболевания; рентгенологическая стадия III наличие осложнений заболева (или) от проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям фун организма

			сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
Системные поражения соединительной ткани		M30 - M36		
	Системная красная волчанка Дерматополимиозит Болезнь Бехчета Узелковый полиартериит и родственные состояния Гранулематоз Вегенера Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией. Сухой синдром (Шегрена) Диффузный (эозинофильный) фасциит Рецидивирующий панникулит Вебера-Крисчена Другие уточненные системные поражения соединительной ткани	M32 M33 M35.2 M30 M31.4 M31.5 M35.0 M35.4 M35.6 M35.8		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной,	Ремиссия или низкая активнос заболевания без нарастания активности заболевания; отсутствие повреждения орган систем организма вследствие заболевания; отсутствие осложнений заболе и (или) проводимой терапии

			дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Умеренная активность заболев прогрессирование заболевания склонность к генерализации; с вовлечением в процесс внутре органов и систем организма, приводящей к умеренным нарушениям функций организ
			Нарушения	Высокая активность заболеван

			нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	быстрое прогрессирование заболевания; склонность к генерализации; вовлечение в процесс органов и систем орга наличие осложнений заболева (или) проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организ
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B	Высокая активность заболева быстрое прогрессирование заболевания; склонность к генерализации; наличие повреждения органов и систем вследствие заболевания; налич жизнеугрожающих осложнени заболевания и (или) проводим терапии, приводящей к значит выраженным нарушениям фун организма

			798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
	Системная красная волчанка	M32		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Низкая активность заболевани отсутствие признаков повреж органов и систем организма вследствие заболевания; отсутствие осложнений заболе и (или) проводимой терапии
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы	Средняя активность заболеван наличие повреждения органов систем организма вследствие заболевания, наличие осложне заболевания и (или) проводим терапии, приводящей к умере нарушениям функций организ

			крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Высокая активность заболеван наличие повреждения органов систем вследствие заболевани наличие осложнений заболева (или) проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организ
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с	Прогрессирующее течение заболевания; Высокая активность заболеван наличие полиорганных наруш

			движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	органов и систем организма вследствие заболевания; налич осложнений заболевания и (ил проводимой терапии, приводя значительно выраженным нарушениям функций организ
	Дерматополимиозит Юношеский дерматомиозит Другие дерматомиозиты Полимиозит Дерматополимиозит неуточненный	M33 M33.0 M33.1 M33.2 M33.9		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной	Незначительная степень наруш функции пораженных органов систем организма, вызванных заболеванием, активность про степени

			функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Умеренная активность процес поражением органов и систем организма, наличие осложнен заболевания и (или) проводим терапии, приводящей к умерен нарушениям функций организ
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной,	Высокая активность процесса, поражением органов и систем организма, наличие осложнен заболевания и (или) проводим терапии, приводящей к выраж нарушениям функций организ

			сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Нарушения функции поражен органов и систем организма, независимо от активности заболевания, наличие осложне заболевания и (или) проводим терапии, приводящей к значит выраженным нарушениям фун организма
	Системный склероз Прогрессирующий системный склероз	M34 M34.0		

	Синдром CR (E) ST Системный склероз, вызванный лекарственными средствами и химическими соединениями Другие формы системного склероза Системный склероз неуточненный Другие системные поражения соединительной ткани Другие перекрестные синдромы Диффузный (эозинофильный) фасциит	M34.1 M34.2 M34.8 M34.9 M35 M35.1 M35.4		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Очень ранняя стадия заболева Отсутствие активности; незначительное поражение ко синдром Рейно без дигитальн трофических нарушений; отсутствие поражения внутре органов; отсутствие осложнений заболе и (или) проводимой терапии
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Начальная стадия заболевания низкая активность заболевани повреждением органов и систе организма, приводящим к умеренным нарушениям функ

			(статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	организма; отсутствие осложн заболевания и (или) проводим терапии
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B	Стадия развернутых клиничес проявлений заболевания; умеренная активность заболев повреждением органов и систе организма, наличие осложнени заболевания и (или) проводим терапии, приводящие к выраж нарушениям функций организ

			540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849	
				Терминальная стадия вне зависимости от активности заболевания, с повреждением органов и систем организма, наличие осложнений заболева (или) проводимой терапии, приводящие к значительно выраженным нарушениям фун организма
	Спондилопатии Анкилозирующий спондилит Другие воспалительные спондилопатии Другие уточненные спондилопатии	M45 - M48 M45 M46 M48.8		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Незначительное нарушение фу организма; незначительное нарушение фу позвоночника и (или) суставов отсутствие или низкая степень активности заболевания; ФК I; отсутствие внескелетных проявлений заболевания; отсутствие осложнений заболе и (или) проводимой терапии
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций	Умеренное нарушение функци позвоночника и (или) суставов сохраняющейся умеренной ил высокой степени активности заболевания; ФК II; наличие внескелетных проявлений заболевания с умеренными нарушениями функций органи отсутствие осложнений заболе и (или) проводимой терапии

			кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	Выраженное нарушение функ позвоночника и (или) суставов сохраняющейся умеренной ил высокой активности заболева ФК III; наличие внескелетных проявлений заболевания; нали осложнений заболевания и (ил проводимой терапии; приводя выраженным нарушением фун организма
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой	Значительно выраженные нарушения функции организм значительно выраженные нару функции позвоночника или суставов; ФК IV; наличие внескелетных проявлений заболевания; наличие осложне заболевания и (или) проводим терапии, приводящие к значит выраженным нарушением фун организма

			системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 849	
Дорсопатии		M40 - M54		
	Деформирующие дорсопатии Сколиоз Остеохондроз позвоночника. Другие деформирующие дорсопатии Другие дорсопатии	M40 - M43 M41 M42 M43 M50 - M54		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 729, B 750 - 789	Сколиоз и кифосколиоз II - III степени с незначительными ограничениями подвижности позвоночника. Отсутствие нарушений функц внутренних органов
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы;	Сколиоз и кифосколиоз III - IV степени с умеренным ограниче подвижности позвоночника, деформацией грудной клетки, наличии осложнений с умерен нарушениями функций органи Состояние после реконструкти операций с протяженной фикс не менее двух отделов позвоно

			мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 729, B 750 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы; мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	Сколиоз и кифосколиоз IV сте выраженным ограничением подвижности позвоночника, с грубой деформацией грудной клетки, при наличии выражен нарушений функций внутренн органов
	Фибромиалгия	M79.7	Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных и психических функций; МКФ: B 710 - 789, B 250 - 299, D 110 - 199	Незначительные нарушения функций организма - наличие болевого синдрома суммарно течение менее 8 месяцев за два последних года, купирующего нелекарственными методами воздействия и (или) лекарстве препаратами; психосоматическая или психопатологическая симптом не приводит к дезадаптации в основных сферах жизнедеятел
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных и психических функций; МКФ: B 710 - 789, B	Умеренные нарушения функци организма - наличие на фоне лекарственной терапии стойко выраженного, распространенн болевого синдрома на протяже суммарно более 8 месяцев за д последних года; психопатологическая, в том чи психосоматическая, симптома приводящая к дезадаптации в основных сферах жизнедеятел

			250 - 299, D 110 - 199	
Остеопатии и хондропатии Нарушения плотности и структуры кости		M80 - M94 M80 - M85		
	Остеопороз с патологическим переломом Остеопороз без патологического перелома	M80 M81		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 729, B 750 - 789, B 540 - 559	Отсутствие переломов длинны трубчатых костей. Отсутствие деформаций или и место незначительные (менее 10°) деформации оси конечнос или позвоночника, без наруше или с незначительным наруше их функций. Z-критерий соответствует остеопении или остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена незначительными отклонениям Rg-признаки остеопороза отсутствуют
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 729, B 750 - 789, B 540 - 559	Патологические переломы дли трубчатых костей 1 раз в 2 - 3 длительным сроком консолида деформацией оси конечности (10°, но менее 20°; вторичная деформация оси позвоночника (сколиоз II и III степени), Z-критерий соответствует тяж остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена умеренные изменения. Выявля начальные Rg-признаки остео
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 729, B	Патологические переломы дли трубчатых костей более 1 раза спонтанные переломы. Длител сроки консолидации. Выражен (20° и более) деформация оси конечности, возникновение ло суставов, вторичная деформац позвоночника с умеренным нарушением их функций. Z-критерий соответствует тяж остеопорозу (очень высокий р

			750 - 789, B 540 - 559	переломов). Лабораторные показатели фосфорно-кальцие обмена - умеренные, выражен значительно выраженные изме
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 729, B 750 - 789, B 540 - 559	Возникновение спонтанного перелома длинных трубчатых при незначительных двигатель физических нагрузках, включа собственного тела. Невозможн вертикализации из-за высоког риска возникновения спонтан перелома
	Остеомиелит	M86		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 430 - 439, B 810 - 849	Редкие обострения (1 раз в год реже), непродолжительные (м недель)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789; B 430 - 439; B 810 - 849	Обострения свищевой формы остеомиелита средней частоты раз в год), средней продолжительности (не менее недель)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Рецидивирующий остеомиелит обострения частые (3 - 4 раза в длительные (более 4 недель). Формирование умеренных или выраженных контрактур в сме

			(статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы, нарушение мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 849	суставах. Наличие осложнений
	Остеонекроз	M87		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - AA789	Односторонний некроз головк бедра в III - IV, рентгенологич стадии с НФС III степени в пораженном суставе (исход в деформирующий артроз)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	Односторонний и двусторонни некроз головки бедра во II рентгенологической стадии (остеонекроза и остеолизиса) в период иммобилизации
	Осложнения, связанные с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами	T84		
	Наличие других функциональных имплантатов Наличие других устройств	Z96 Z97		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Состояние после односторонн двустороннего эндопротезиро тазобедренных и коленных су без осложнений эндопротезир

			(статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	Осложнения эндопротезирова умеренными нарушениями фу организма
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789	Осложнения эндопротезирова выраженными нарушениями функции организма
Гломерулярные болезни Тубулоинтерстициальные болезни почек Почечная недостаточность Мочекаменная болезнь Другие болезни почки и мочеточника Другие болезни мочевой системы Помощь, включающая диализ Приобретенное отсутствие почки Агенезия и другие редукционные дефекты почки		N 00 - N 08 N 10 - N 16 N 17 - N 19 N 20 - N 23 N 25 - N 29 N 30 - N 39 Z49 Z90.5 Q60		

Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит		N 30.1 N 30.2		
			Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - B 639	ХБП 1 стадии, скорость клубо фильтрации (далее - СКФ) бол мл/мин/1,73 м2; ХБП 2 стадии, СКФ в предела 60 мл/мин/1,73 м
			Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439	ХБП 3А стадии, СКФ 59 - 45 мл/мин/1,73 м2
			Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой системы, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439, B 540 - 559, B 410 - 429, B 440 - 449	ХБП 3Б стадии, СКФ 44 - 30 мл/мин/1,73 м2. Нефротически нефритический синдромы при неэффективности лечения с умеренно выраженными нарушениями функций органи
			Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой системы, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439, B 540 - 559, B 410 - 429, B 440 - 449	ХБП 4 стадии, СКФ 29 - 15 мл/мин/1,73 м2, подготовка к диализу. ХБП 5 стадии (СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м2) при отсутстви осложнений диализа
			Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой системы, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439, B 540 - 559, B 410 - 429, B 440 - 449	ХБП 5 стадии, СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м2, при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
	Наличие трансплантированной	Z94.0		

	почки			
			Нарушение мочевыделительной системы, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	При первичном освидетельствовании - состоян после трансплантации почки
			Нарушения мочевыделительной функции, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	По истечении 2-летнего срока трансплантации почки
			Нарушения мочевыделительной системы, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B	По истечении 2-летнего срока трансплантации почки при нал осложнений с выраженными нарушениями функций органи

			110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	
			Нарушения мочевыделительной системы, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	По истечении 2-летнего срока трансплантации почки при нал осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
	Приобретенное отсутствие почки Агенезия и другие редукционные дефекты почки	Z90.5 Q60		
			Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439	Отсутствие нарушений или незначительные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявлен ХБП 1, 2 стадии)
			Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439	Умеренные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявлен ХБП 3 стадии)
			Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439	Выраженные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявлен ХБП 4 стадии)
			Нарушения	Значительно выраженные

			мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439	нарушения мочевыделительно функции единственной почки (проявления ХБП 5 стадии)
	Врожденные аномалии (пороки развития) половых органов Агенезия и аплазия матки. Врожденное отсутствие влагалища	Q50 - Q56 Q51.0 Q52.0		
			Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639, B 640 - 679	Агенезия и аплазия матки, врожденное отсутствие влагал без пластической операции, по достижения 14-летнего возрас
Термические и химические ожоги глаза и других внутренних органов		T26 - T28		
	Термический ожог пищевода Химический ожог пищевода	T28.1 T28.6		
			Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Последствия ожога пищевода рубцовым сужением пищевода степени после проведенного л с затруднением прохождения т твердой пищи, без потери масс тела
			Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма;	Последствия ожога пищевода рубцовым сужением пищевода степени (субкомпенсация) с необходимостью планового

			МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	бужирования. Наличие искусственного пище умеренным нарушением функ пищеварительной системы
			Нарушения функции пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 440 - 449	Последствия ожога пищевода рубцовым сужением пищевода степени и выше (декомпенсац нарушением приема пищи (зон питание, наличие гастростомы питание через нее); наличие осложнений (свищи) с выраже нарушениями функций органи
			Нарушения функции пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 440 - 449	Декомпенсация пищеварения (кахексия); неустранимые тяж последствия болезни; неэффективность многоэтапны реконструктивно-восстановите хирургических вмешательств
	Последствия термических и химических ожогов и отморожений	T95		
	Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности	T95.0 T95.1 T95.2 T95.3		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B	Последствия термических поражений III степени на ограниченных участках тулови конечностей с вовлечением одного-двух смежных суставо ("стягивающие рубцы") и формированием умеренной контрактуры в функционально выгодном положении

			440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 849	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 849	Последствия термических поражений III степени с вовлечением одного-двух смеж суставов ("стягивающие рубцы формированием выраженной контрактуры в функционально невыгодном положении. Нали осложнений с умеренными нарушениями функций органи
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B	Последствия термических поражений III степени с вовлечением 2 и более суставо ("стягивающие рубцы") и формированием резко выраже контрактур и (или) анкилозов функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с выраженными нарушениями функций организма

			810 - 849	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 849	Последствия распространенны термических поражений III сте и виде множественных порочн установок крупных суставов и ригидных деформаций скелета Наличие осложнений со значи выраженными нарушениями функций организма
Последствия травм головы		T90		
	Последствия открытого ранения головы Последствия перелома черепа и костей лица	T90.1 T90.2		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Дефект костей черепа размеро см и менее с пластикой и без н
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Дефект костей черепа размеро более 3 х 3 см при наличии пульсации твердой мозговой оболочки в области дефекта

			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Значительный дефект костей ч размером 10 х 10 см и более
	Последствия перелома позвоночника Последствия травмы спинного мозга	T91.1 T91.3		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Последствия неосложненных переломов позвоночника с незначительным или умеренны ограничением объема движени позвоночника, без неврологич симптоматики. Наличие стабильной металлоконструкции небольш протяженности (в пределах од отдела позвоночника)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 610 - 639, B 510 - 539	Последствия осложненных переломов позвоночника с нал неврологической симптоматик достигающей умеренной степе нестабильность металлоконстр любой протяженности после проведенного оперативного ле
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;	Последствия осложненных переломов позвоночника с выраженной неврологической симптоматикой

			МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Последствия осложненных переломов позвоночника с пол анатомическим прерыванием спинного мозга, со значительн выраженной неврологической симптоматикой, нарушением функции тазовых органов
	Последствия травм верхней конечности Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность	T92 Q71		
о сустава				
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение движения плечев сустава, включая плечевой поя (отведение и (или) сгибание пл 90° до 120° с соответствующи ограничением отведения и ротационных движений). Нестабильность одного плечев сустава, включая редкие выви плеча. Псевдоартроз плечевой кости стабильный. Анкилоз плечевого сустава в функционально выгодном положении (угол отведения 45 сгибании руки до 30 - 45°) при хорошо подвижном плечевом
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Нестабильность плечевого сус тяжелой степени, включая "болтающийся" сустав (тяжел дефект проксимального отдела плеча). Псевдоартроз нестабильный плечевой кости. Культя верхней конечности на уровне плеча или в локтевом с
			Нарушения	Культя плеча после вычленени

			нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	частью плечевого пояса
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 789, B 798, B 799	Двусторонние культи верхних конечностей на любом уровне (плечо, предплечье, кисть)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение движения в локт суставе незначительная степен (разгибание (сгибание) до 0 - 3 120° при неограниченной рота предплечья). Анкилоз локтевого сустава в функционально выгодном положении (сгибание 70 - 110° пронация 0 - 10°). Анкилоз проксимального лучелоктевого сустава с устан предплечья в функционально выгодном или невыгодном положении. Псевдоартроз костей предплеч стабильный (локтевой или луч кости, или обеих костей с тугоподвижностью)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Анкилоз обоих локтевых суста функционально невыгодном положении. Анкилоз проксимального лучелоктевого сустава с установкой предплеч функционально невыгодном положении "Болтающийся" локтевой суст Культя верхней конечности на уровне предплечья или кисти
			Нарушения нейромышечных, скелетных и	Анкилоз обоих локтевых суста функционально невыгодном положении

			связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Двусторонние культи верхних конечностей на любом уровне (плечо, предплечье, кисть)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение подвижности кистевого сустава, незначител или умеренная степень (разги или сгибание до 30 - 40°) одностороннее или двусторон Анкилоз одного кистевого сус функционально выгодном (разгибание 15°) или невыгодн положении
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение подвижности в о кистевых суставах выраженно степени. Анкилоз обоих кистевых суста функционально невыгодном положении
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Отсутствие дистальной фалан части основной первого пальц кисти. Отсутствие первого пальца ки том числе с первой пястной ко Отсутствие одного трехфалан пальца кисти, в том числе с соответствующей пястной кос Отсутствие двух или трех (иск первый) трехфаланговых паль кисти. Отсутствие одного или двух п (любых, включая I) на одной к
			Нарушения нейромышечных,	Отсутствие двух трехфаланго пальцев кисти с отсутствием п

			скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	пальца. Отсутствие трех трехфаланго пальцев кисти с отсутствием п пальца. Отсутствие первых пальцев об кистей. Отсутствие всех пальцев одно кисти. Полное отсутствие всех трехфаланговых пальцев одно кисти
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Отсутствие всех трехфаланго пальцев с сохраненными II - V пястными костями на обеих ки
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Отсутствие всех пальцев обеи кистей
	Последствия травм нижней конечности Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность	T93 Q72		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение движения в тазобедренных суставах: одностороннее незначительно умеренной степени или двустороннее незначительной степени
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Ограничение движения в тазобедренных суставах: выраженной степени одного и умеренной степени в обоих. Культя одной нижней конечно пригодная для типичного

			функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	протезирования
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение движения выраж степени обоих тазобедренных суставов. Культя одной нижней конечно любом уровне бедра при ампутационной культе другой нижней конечности на уровне голени. Двусторонние ампутационные культи на уровне нижней и ср трети бедер. Двусторонние ампутационные культи на уровне голеней и ст
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Анкилоз обоих тазобедренных суставов в функционально невыгодном положении со значительно выраженным нарушением статодинамическ функции. Культи обеих нижних конечно на уровне верхней трети бедер
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Ограничение движения в одно обоих коленных суставах незначительной или умеренно степени. Анкилоз коленного сустава в функционально выгодном положении (положение сгибан 10 - 15)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Анкилоз обоих коленных суст функционально невыгодном положении с умеренными нарушениями статодинамичес функций. Культя одной нижней конечно любом уровне голени при опороспособности и подвижно другой нижней конечности
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Анкилоз обоих коленных суст функционально невыгодном положении с выраженными нарушениями статодинамичес функций.

			(статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Культя одной нижней конечно любом уровне голени при част потере опороспособности и подвижности другой нижней конечности. Культи обеих нижних конечно на любом уровне голени
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, 799	Анкилоз голеностопного суста функционально выгодном (невыгодном) положении (сги или разгибание 0 - 5°) одно- и двустороннее. Анкилоз пальцев одной или об стоп в функционально выгодн положении или деформация па одной или обеих стоп. Культя стопы односторонняя: Лисфранку; в области плюсне костей по Шарпу. Отсутствие всех пальцев обеи
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Культя стопы односторонняя: Пирогову; по Шопару. Культи обеих стоп: по Лисфра Шарпу II - III
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Культя обеих стоп: по Пирого
	Последствия травм, захватывающих несколько областей тела, и травм неуточненной локализации	T94		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (кистей, предплечий, плеч). Отсутствие одной верхней конечности и отсутствие одно нижней конечности вне зависи

			функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	от стороны поражения. Культя одной верхней конечно любом уровне плеча и культя нижней конечности на любом уровне бедра вне зависимости стороны поражения. Культи обеих верхних и обеих нижних конечностей
	Последствия травм, захватывающих несколько областей тела, и травм неуточненной локализации	T94		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Стабильное тазовое кольцо, дегенеративные изменения крестцово-подвздошных суста незначительными нарушениям функций организма
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Деформации тазового кольца, осложненные повреждением т органов (уретры, мочевого пуз прямой кишки) с умеренными нарушениями функций органи
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной	Деформации тазового кольца, осложненные повреждением т органов (уретры, мочевого пуз прямой кишки) с выраженным нарушениями функций органи

			системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	

<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

<2> Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, одобренная на пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 22 мая 2001 г.

Приложение N 2
к классификациям и критериям,
используемым при осуществлении
медико-социальной экспертизы
граждан федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы,
утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 26 июля 2024 г. N 374н

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ (В ПРОЦЕНТАХ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА)

локи болезней (по МКБ-10)	Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия	Рубрика МКБ-10	Виды стойких нарушений функций	Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений

		(код)	организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами. Рубрика МКФ <2>	функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами
3	4	5	6	7
		A00 - B99	Количественная оценка степени нарушений функции орга (дыхательной, сердечно-сосудистой, других систем органи локализации зависит от клинической формы заболевания, фазы процесса, наличия (отсутствия) бактериовыделения (соответственно - МБТ+ или МБТ-), течения заболевания (с характера и вида осложнений (в том числе от проводимой проводимого лечения и формирования резистентности к не	
	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	A15 A16		
			Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функции дыхательной системы при эффективном окончании основного курса лечения, в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление) без признаков бактериовыделения (МБТ-), без остаточных изменений и осложнений. Отсутствие дыхательной недостаточности (далее - ДН) или ДН I степени
			Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функции дыхательной системы при отсутствии положительной клинико-рентгенологической динамики на фоне химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери активности; и (или) при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза органов дыхания (локальный пневмофиброз,

				фиброзно-очаговые изменения). С ДН II степени, преходящей или постоянной легочной гипертензией (хроническая сердечная недостаточность (далее - ХСН) 0 стадии или ХСН I стадии). Наличие МБТ+ 6 и более месяцев
			Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функции дыхательной системы при неэффективности химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери активности; и (или) при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза (пневмосклероз, цирроз, бронхоэктазы) и осложнений. Наличие ДН II, III степени и ХСН IIA стадии
			Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма вследствие наличия полиорганных осложнений (амилоидоз, полисерозиты, кахексия и так далее). Наличие ДН III степени и ХСН IIБ стадии или III стадии
	Туберкулез нервной системы Туберкулез других органов Милиарный туберкулез	A17 A18 A19		
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление; без признаков бактериовыделения (МБТ-); при эффективном окончании основного курса лечения. Отсутствие дыхательной недостаточности или наличие ДН I степени

			мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (при сохранении бактериовыделения (МБТ+) или без признаков бактериовыделения (МБТ-) и (или) осложнений. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 стадии или ХСН I стадии)
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (при сохранении бактериовыделения (МБТ+) или без признаков бактериовыделения (МБТ-) и (или) осложнений.

			(статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	Проявления множественной или широкой лекарственной устойчивости к микобактериям туберкулеза. Наличие ДН II, III степени, ХСН IIA стадии
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации с полиорганными осложнениями (амилоидоз, полисерозиты, кахексия и прочее); Неэффективность или резистентность к терапии. Наличие ДН III степени и ХСН IIБ стадии или III стадии

	Последствия туберкулеза	B90		
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств и прочее, без признаков бактериовыделения (МБТ-) при отсутствии дыхательной недостаточности либо наличии ДН I стадии
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств, и прочее, без признаков бактериовыделения (МБТ-). Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 стадии или ХСН 1 стадии)

			функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, распространенные буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств и прочее, без признаков бактериовыделения (МБТ-). Наличие ДН II, III степени, ХСН IIA стадии
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза (распространенные фиброзные, фиброзно-очаговые,

			(статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	буллезно-дистрофические изменения, значительной протяженности плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств и прочее, без признаков бактериовыделения (МБТ-). Наличие ДН III степени, ХСН IIБ стадии или III стадии
	Бактериальные вакцины	Y58		
	Вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой туберкулезной микобактерии (далее - БЦЖ)	Y58.0		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B 430 - 439	Ятрогенный туберкулезный остит (БЦЖ-остит): для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения лечения при наличии незначительных нарушений функций организма
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B	Ятрогенный туберкулезный остит (БЦЖ-остит): для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения лечения при наличии умеренных нарушений функций организма; 0 - 7 лет: на период длительного (более 6 месяцев) лечения, включающего специфическую противотуберкулезную терапию двумя и более препаратами

			430 - 439	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B 430 - 439	Ятрогенный туберкулезный остит (БЦЖ-остит): для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения лечения при наличии выраженных нарушений функций организма
ь, вызванная м одефицита ка (ВИЧ)		B20 - B24		
			Нарушения функции системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ-инфекция: стадия 3 (субклиническая); стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза ремиссии (спонтанная, после антиретровирусной терапии (далее - АРТ), на фоне АРТ). Отсутствие или незначительные нарушения функций организма
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ВИЧ-инфекция: стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования. Умеренные нарушения функций организма

			710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ВИЧ-инфекция: стадия 4Б (вторичных заболеваний) независимо от фазы заболевания. Выраженные нарушения функций организма
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ВИЧ-инфекция: стадия 4В (вторичных заболеваний) независимо от фазы заболевания; терминальная стадия. Значительно выраженные нарушения функций организма

			функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	
		C00 - D48	Количественная оценка степени выраженности стойких на злокачественных новообразованиях зависит от клинико-мо локализации и размера опухоли (до 2 см, от 2 до 5 см, 5 см (эндофитная, экзофитная, смешанная); темпа роста опухол (степень инвазии); гистологического варианта и степени д (высокодифференцированная, средней степени дифференц недифференцированная); наличия и распространенности п или отсутствия отдаленных метастазов (в лимфатические у опухолевого процесса (клиническая классификация по Ме злокачественных новообразований, рекомендуемой Всеми применяемой с 1953 года, в которой T (tumor) характеризу опухоли, N (nodus) характеризует наличие, отсутствие и ра регионарных лимфатических узлах, M (metastasis) характер отдаленных метастазов (далее - TNM) с дополнительным с характеризующим гистологическую степень злокачествен Международная патологоанатомическая классификация T хирургического вмешательства и (или) гистологического и нарушенных функций организма при опухолях эмбриональ лимфогранулематозе и других основывается как на класси системе стадирования, одобренной Международным обще International Society of Pediatric Oncology): INSS (1993) при система стадирования); Международной системы оценки г гепатобластомы (PRETEXT - Pretreatment Extent of Disease послеоперационного стадирования гепатобластомы (POST (2017) при гепатобластоме; Международной классификаци предложенной в Амстердаме в 2001 году (ABC - Amsterda ретинобластоме; SIOP (1992) при нефробластоме; Междун акушеров-гинекологов, предложившей в 1988 году класси яичников (FIGO - Federation of Gynecology and Obstetrics) (яичников; Международной классификации стадий гермино герминогенных опухолей яичек; Международной классифи предложенной в г. Анн-Арбор в 1971 году (Ann-Arbor (197 Международной классификации стадий неходжкинских ли (PNHLSS (2015) - для неходжинских лимфом. Также необх и после оперативного вмешательства, до и после проведен гистологического типа опухоли. При количественной оцен функций большое значение имеет наличие генетических м онкопрогноз: амплификация гена N-MYC и делеция корот (нейробластома); мутация гена RB1 (ретинобластома); мут (нефробластома); наличие изохромосомы i в 12p (гермино молекулярно-генетического исследования. Учитываются т возраст, соматический фон), вид и объем лечения (химиот

			лечение, лучевая терапия, перфузия противоопухолевыми видов лечения), наличие осложнений как самого заболева	
ественные разования		C00 - C97	Количественная оценка нарушенных функций организма, настоящей количественной системы оценки, при повторно учетом эффективности проведенного лечения, наличия рем метастазов, осложнений, продолженного роста опухоли по противопоказаний к оперативному лечению и возможност вмешательства, а также с учетом неэффективности провод терапия и их комбинации)	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при первичном освидетельствовании с любым видом и формой злокачественного новообразования с учетом классификации по системе TNMG (и (или) по международной системе стадирования) на весь период лечения при отсутствии осложнений и наличии положительного результата от проводимого лечения
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при первичном освидетельствовании с любым видом и формой злокачественного новообразования с учетом классификации по системе TNMG (и (или) по международной системе стадирования) на весь

			связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	период лечения при наличии осложнений; при резистентности опухоли к комбинированному лечению или его неэффективности
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения лечения и достижения стойкой ремиссии (5 лет и более) с благоприятным онкопрогнозом

			МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения лечения при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: в период проведения лечения и после завершения его при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма

			движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: в период проведения лечения и после завершения его при наличии рецидива, метастазов, продолженного роста опухоли после радикального лечения и других осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма

			310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	
	Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата Злокачественное новообразование сетчатки	C69 C69.2	Нарушения психических функций, функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 430 - 439, B 210 - 229, B 810 - 849	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведения операции по удалению глазного яблока в зависимости от имеющихся нарушений функций организма. Двухсторонняя ретинобластома после комплексного лечения в зависимости от имеющихся нарушений функций организма
бразования IN качественные вания бразования деленного или стного характера		D00 - D09 D10 - D36 D37 - D48	Количественная оценка стойких нарушений функций орга новообразованиях зависит от локализации и размера опухо активности, наличия рецидива или продолженного роста п близлежащие органы (сдавление, смещение); возможности проведенной операции (осложнение, дефицит структур, на гистологической структуры опухоли. Маркером неблагопр реабилитационного прогноза являются опухоли внутричер вызывающие сдавление и дислокацию ствола мозга; неэфф опухоли), невозможность хирургического лечения	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: доброкачественные опухоли различной локализации при: небольших размерах или отсутствии роста (медленном росте), опухоли без влияния на функцию смежных структур и (или) органов; гормонально неактивные опухоли; опухоли после проведенного радикального оперативного лечения при отсутствии признаков рецидива или продолженного роста опухоли

			ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: доброкачественные опухоли различной локализации при: больших размерах опухоли с влиянием на положение и функцию смежных органов, требующих оперативного лечения; при быстром росте опухоли с появлением влияния на положение и функцию смежных органов и невозможности радикального ее устранения (возможность лишь частичного удаления); гормонально активные опухоли, приводящие к умеренным нарушениям функций организма; после проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии умеренных нарушений функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: доброкачественные опухоли различной локализации (преимущественно головного и спинного мозга) при: быстром росте опухоли с выраженным влиянием на положение и функцию смежных органов и невозможности радикального ее удаления;

			функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639, B 810 - 899	гормонально активные опухоли, приводящие к выраженным нарушениям функций организма; после проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии продолженного роста опухоли; при наличии выраженных нарушений функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 -	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма, невозможность радикального оперативного лечения или после проведенного оперативного лечения

			439, B 610 - 639, B 810 - 849, B 898 - 899	
		D50 - D89	Количественная оценка степени выраженности стойких на крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, во от вида и тяжести течения заболевания (по данным клиник тяжести кризов, наличия и вида кровоизлияний во внутрен суставов (некритические или жизнеугрожающие), от пораж эффективности проводимого лечения (в том числе от регул гемопоэза, переливания компонентов крови или трансплан проводимой терапии; наличия осложнений (в том числе от нарушения функции других органов и систем организма, п	
е болезни крови и зворных органов		D70 - D77		
	Гипоспленизм Врожденные аномалии селезенки	D73.0 Q89.0		
			Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма при отсутствии селезенки
			Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие рецидивирующих инфекционных заболеваний, приводящих к осложнениям с умеренными нарушениями функций организма
	Агранулоцитоз	D70		
			Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при отсутствии осложнений после проведенного эффективного лечения и достижения стойкой длительной ремиссии
			Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений с умеренными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии
			Нарушение функций	Для детей в возрасте 0 - 17 лет:

			системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений с выраженными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии
			Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: рецидивирующее тяжелое течение заболевания, наличие инфекционных осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии. Необходимость трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
тические анемии	Серповидно-клеточные нарушения Другие апластические анемии Другие анемии	D55 - D59 D57 D61 D64		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: нетяжелая степень апластической анемии (отсутствие необходимости в регулярных трансфузиях эритроцитарной массы и (или) тромбоконцентрата); легкая форма гемолитической анемии (гемолитических кризов нет или они редкие, с интервалом в несколько лет); длительная ремиссия после спленэктомии по поводу гемолитической анемии; при серповидно-клеточных нарушениях - редкие (не чаще 2 раз в месяц) болевые кризы, купируемые нестероидными противовоспалительными препаратами (далее - НПВП) (общий режим)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая степень апластической анемии, гемолитическая анемия средней тяжести (наличие гемолитических кризов средней частоты 1 - 2 раза в год) на фоне постоянной базисной терапии с развитием анемии, требующей

			мочевыделительной функции; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	заместительной терапии, направленной на стабилизацию гемоглобина; при серповидно-клеточных нарушениях - частые (еженедельные) болевые кризы, купируемые ненаркотическими анальгетиками, требующие соблюдения домашнего режима или обращений за неотложной помощью
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушение психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сверхтяжелая степень апластической анемии; тяжелая форма гемолитической анемии (частые гемолитические кризы - более 2 раз в год); наличие осложнений заболевания и проводимого постоянного базисного лечения; при серповидно-клеточных нарушениях - частые (еженедельные) болевые кризы, купируемые анальгетиками (включая наркотические) и (или) требующие госпитализации
	Наличие других трансплантированных органов и тканей	Z94.8		

			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после трансплантации костного мозга на срок 5 лет (период лечения)

ерез 5 лет после трансплантации костного мозга)

			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма
			Нарушения функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма
			Нарушения функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма

			функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	
ения ваемости крови, а и другие агические ния		D65 - D69	Количественная оценка степени выраженности стойких на обусловленных геморрагической коагулопатией, тромбоци оценке тяжести заболевания, которая коррелирует с частот частотой и разновидностью кровотечений, а также с эффек	
	Наследственный дефицит фактора VIII Наследственный дефицит фактора IX Болезнь Виллебранда Наследственный дефицит фактора XI Наследственный дефицит других факторов свертывания Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами Приобретенный дефицит фактора свертывания	D66 D67 D68.0 D68.1 D68.2 D68.3 D68.4		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая форма заболевания при отсутствии кровотечений либо с редкими (не более 1 раза в год) кровотечениями, требующими обращения в медицинскую организацию, не требующих заместительной терапии и (или) не приводящими к развитию анемии; отсутствие кровоизлияний в суставы и (или) мышцы (внутренние органы); нерегулярное использование концентратов факторов свертывания крови и (или) препаратов крови с профилактической целью (при оперативных вмешательствах или травмах). Для гемофилии A и B - минимальная степень активности факторов свертывания VIII или IX 5% и более
			Нарушения функций	Для детей в возрасте 0 - 17 лет:

			системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	легкая и среднетяжелая форма заболевания с редкими (не более 3 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и (или) с развитием анемии; кровоизлияния в суставы и (или) мышцы (внутренние органы) не более 1 раза в год. Для гемофилии A и B - минимальная степень активности факторов свертывания VIII или IX от 2 до 5%
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая и тяжелая форма заболеваний с частыми повторными (от 1 до 6 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и госпитализации; кровоизлияния в суставы и (или) мышцы (внутренние органы) не более 2 - 3 раз в год. Наличие гемофилической артропатии 1 и более крупных суставов; наличие умеренной (выраженной) контрактуры одного крупного сустава. Для гемофилии A и B - минимальная степень активности факторов свертывания VIII или IX менее 1 - 2%. Регулярное использование концентратов факторов свертывания крови и (или) препаратов крови с профилактической целью

			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелые формы заболеваний с частыми повторными (6 и более раз в год) кровотечениями, со склонностью к частым (более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе спонтанным) на фоне постоянной терапии; кровоизлияния в суставы и (или) мышцы более 3 раз в год и (или) кровоизлияния во внутренние органы более 2 раз в год и (или) любой эпизод внутричерепного кровоизлияния и (или) повторные эпизоды почечных кровотечений. Для гемофилии A и B - минимальная степень активности факторов свертывания VIII или IX менее 1%. Наличие ингибиторной гемофилии с титром ингибитора > 0,6 БЕ
	Качественные дефекты тромбоцитов Другие первичные тромбоцитопении	D69.1 D69.4		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций;	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая форма заболевания при отсутствии кровотечений либо с редкими (не более 1 раза в год) кровотечениями, требующими обращения в медицинскую организацию; не требующих заместительной терапии и (или) не приводящими к развитию анемии; отсутствие кровоизлияний в суставы и (или) мышцы (внутренние органы); нерегулярное использование концентратов факторов свертывания крови и (или) препаратов крови с профилактической целью (при оперативных вмешательствах или травмах);

			МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	для гемофилии A и B - активность факторов свертывания VIII или IX более 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII или IX)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая и среднетяжелая форма заболевания с редкими (не более 3 раз в год) кровотечениями, требующих заместительной терапии и (или) с развитием анемии; кровоизлияния в суставы и (или) мышцы (внутренние органы) не более 1 раза в год; для гемофилии A и B - активность факторов свертывания VIII или IX от 2 до 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII или IX)
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая и тяжелая форма заболеваний с повторными (более 1 до 6 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и (или) госпитализации; кровоизлияния в суставы и (или) мышцы (внутренние органы) не более 2 - 3 раз в год; наличие хронического синовиита и (или) артропатии одного крупного сустава; для гемофилии A и B - активность факторов свертывания VIII или IX 1 - 2% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII или IX);

			психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	регулярное использование концентратов факторов свертывания крови и (или) препаратов крови с профилактической и гемостатической целью
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелые формы заболеваний с частыми повторными (6 и более раз в год) кровотечениями, со склонностью к частым (более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе спонтанным); кровоизлияния в суставы и (или) мышцы более 3 раз в год и (или) кровоизлияния во внутренние органы более 2 раз в год, и (или) любой эпизод внутричерепного кровоизлияния и (или) повторные эпизоды почечных кровотечений: признаки хронического синовиита и (или) артропатии более чем одного крупного сустава; для гемофилии A и B - активность факторов свертывания VIII или IX менее 1% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII или IX); наличие ингибиторной гемофилии с титром ингибитора > 0,6 БЕ
	Первичная тромбофилия дефицит Другая тромбофилия	D68.5 D68.6		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе, требующая первичной фармакологической антитромботической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее)

			и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая форма заболевания с однократным случаем спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию посттромбофлебитической болезни, требующая курса вторичной фармакологической профилактики
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая форма заболевания с повторными спровоцированными тромбозами (не более 2-х случаев) или с 1 случаем не спровоцированного тромбоза (идиопатический вариант); требующая курса вторичной профилактики. Дефицит протеина

			дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	C/S/антитромбина от 12 до 50% у детей в возрасте старше 1 года
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439; B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая и крайне тяжелая форма заболевания с более чем 2 случаями спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз) и (или) более чем с 1 случаем идиопатического тромбоза, и (или) с 2 и более случаями тромбоза сосудов центральной нервной системы, внутренних органов, тромбоэмболии легочной артерии вне зависимости от наличия (отсутствия) видимой причины для тромбоза; значительно выраженные нарушения функций организма. Дефицит протеина C/S антитромбина менее 12% у детей в возрасте старше 1 года
	Пурпура и другие геморрагические состояния Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура	D69 D69.3		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая форма заболевания (снижение тромбоцитов от 30 000 до 50 000/мкл), лечение преимущественно

				в амбулаторных условиях
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая форма заболевания (стойкое снижение тромбоцитов от 20 000 до 30 000/мкл) с необходимостью стационарного лечения, применения гормональной, цитостатической терапии, терапии агонистами тромбопоэтиновых рецепторов (далее - ТПО) и (или) необходимостью переливания компонентов крови реже 1 раза в месяц
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая форма заболевания (стойкое снижение тромбоцитов от 10 000 до 20 000/мкл) с необходимостью стационарного лечения, применения гормональной, цитостатической терапии, терапии агонистами ТПО и (или) необходимостью переливания компонентов крови не реже 1 раза месяц; наличие кровоизлияний во внутренние органы
			Нарушение функции системы крови и иммунной системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая форма заболевания, стойкое снижение тромбоцитов менее 10 000/мкл с необходимостью стационарного лечения, применения гормональной, цитостатической терапии или терапии агонистами ТПО длительно (до 6 месяцев и более) и (или) необходимостью переливания компонентов крови

			сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 710 - 789, B 410 - 429, B 440 - 449, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	чаще 1 раза в 1 месяц; кровоизлияния во внутренние органы, спонтанные кровотечения, опасные для жизни
ьные нарушения, ающие иммунный изм		D80 - D89		
	Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител Комбинированные иммунодефициты Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами Обычный вариабельный иммунодефицит Другие иммунодефициты Дефект в системе комплемента	D80 D81 D82 D83 D84 D84.1		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: без клинической симптоматики или с редкими (до 3 - 4 раз в год), недлительными (10 - 14 дней) инфекционными заболеваниями различной этиологии, поддающимися базисной терапии; минимальные изменения данных лабораторно-иммунологического обследования (согласно заключению иммунолога). Отсутствие осложнений или осложнения с незначительными нарушениями функций организма
			Нарушения функций системы крови и	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие инфекционных осложнений

			иммунной системы, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	с умеренными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие инфекционных осложнений с выраженными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии
		E00 - E90	Количественная оценка степени выраженности стойких на эндокринной системы, расстройствах питания и нарушени степени выраженности клинической симптоматики заболе инструментальных методов исследования, а также возмож с применением современных методов лечения и реабилита патологии детского возраста является компенсация на фон терапии, но в то же время, склонность к хроническому про при отсутствии компенсации на фоне заместительной тера функций организма, нарушение физического, полового и п ранних сроках развития (до 3 лет)	

и щитовидной		E00 - E07		
	Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом Врожденный гипотиреоз без зоба	E03.0 E03.1		
			Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399; B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии: 0 - 3 года: незначительное отставание физического, психомоторного и раннего речевого развития; 4 - 15 лет: коэффициент интеллекта (Intelligence Quotient; IQ) (далее - IQ) = 70 - 79 баллов (детский, тест Д. Векслера для исследования интеллекта у детей дошкольного и младшего школьного возраста (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence; WPPSI) (далее - WPPSI) или тест Д. Векслера для исследования интеллекта детей Wechsler Intelligence Scale for Children; WISC) (далее-WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (тест Д. Векслера (взрослый вариант) (Wechsler Adult Intelligence Scale; WAIS) (далее - взрослый WAIS)
			Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии: 0 - 3 года: умеренное отставание физического, психомоторного и раннего речевого развития; 4 - 15 лет: IQ = 55 - 69 баллов (детский, WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 55 - 64 баллов (взрослый WAIS)

			199, B 310 - 340, B 398, B 399; B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429	
			Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399; B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии: 0 - 3 года: выраженное отставание физического, психомоторного и раннего речевого развития 4 - 17 лет: IQ = 35 - 55 баллов)
			Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399; B 710 - 789, B 798, B 799, B 540 - 559, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии: 0 - 3 года: значительно выраженное отставание физического, психомоторного и раннего речевого развития, 4 - 17 лет: IQ < 35 баллов
ный диабет		E10 - E14	Количественная оценка степени выраженности стойких на обусловленных сахарным диабетом 1 типа в детском возра	

			течения заболевания в различные возрастные периоды, лаб также способность самостоятельно осуществлять контроль есть подсчет хлебных единиц (далее - ХЕ), оценку адекват технику введения инсулина, оценку потребности в инсули время суток с возможностью коррекции его дозы в зависим обученность ребенка производить измерения уровня глюк последующим анализом зарегистрированных показателей Данные навыки оцениваются, исходя из уровня эмоционал когнитивных процессов и уровня интеллектуального разви врачебной комиссии (далее - ВК) медицинской организаци показаниям психиатра) и в среднем формируются при дли	
	Сахарный диабет 1 типа	E10		
			Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии сформированного устойчивого самоконтроля за течением заболевания и осуществлением терапии при компенсации сахарного дибета и (или) при незначительном нарушении функции со стороны органов-мишеней и отсутствии осложнений
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 14 лет: при первичном освидетельствовании: впервые установленный диагноз; при повторном освидетельствовании: достижение полной или частичной эффективности проводимой терапии (адекватность инсулинотерапии, в том числе помповой), в возрастном периоде, в котором невозможен самостоятельный контроль за течением заболевания и осуществлением инсулинотерапии
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и	Для детей в возрасте 15 - 17 лет: при первичном освидетельствовании: впервые установленный диагноз; при повторном освидетельствовании

			связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	при наличии одного или нескольких показателей: - лабильного течения диабета (колебания гликемии в пределах 10 ммоль/л и более в течение 10 дней по данным глюкометра), в том числе на фоне помповой инсулинотерапии; наличие 1 и более верифицированных осложнений при длительности заболевания 3 и более лет с незначительными нарушениями функций организма; верифицированного осложнения (осложнений) с умеренными нарушениями функций организма: при отсутствии сформированного устойчивого самоконтроля за течением заболевания и осуществлением терапии при длительности заболевания не менее 3 лет (по заключению ВК медицинской организации)
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при повторном освидетельствовании при наличии верифицированного осложнения (осложнений) с выраженными нарушениями функций организма
	Другие нарушения внутренней секреции поджелудочной железы	E16		
	Другие формы гипогликемии	E16.1		
			Нарушение	Для детей в возрасте 0 - 17 лет:

			психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559	редкие (2 - 3 раза в год) легкие гипогликемии при отсутствии или наличии незначительных нарушений функций организма; 0 - 3 года: незначительное нарушения физического, психомоторного, раннего речевого развития; 4 - 17 лет: незначительные когнитивные нарушения
			Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: гипогликемии средней частоты (1 - 2 раза в месяц) с развитием умеренных нарушений функций организма; 0 - 3 года: умеренное нарушение физического, психомоторного, раннего речевого развития; 4 - 17 лет: умеренные когнитивные нарушения
			Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: частые тяжелые гипогликемии (более 2 раз в месяц), требующие помощи других лиц, с развитием выраженных нарушений функций организма. 0 - 3 года: выраженное нарушения физического, психомоторного, раннего речевого развития; 4 - 17 лет: выраженные когнитивные нарушения
ения других		E20 -		

инных желез		E35		
	Гипопаратиреоз Гипопаратироидизм, возникший после медицинских процедур	E20 E89.2	Количественная оценка стойких нарушений функций орга частоты и вида тетаний (судорожных сокращений скелетн желудочно-кишечного тракта), а также от степени выраже обмена при измерении показателей в условиях стационара ионизированного, фосфора и паратгормона в сыворотке кр	
			Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 540 - 559, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии редких тетаний преимущественно скелетных мышц, отсутствие или наличие незначительных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); 0 - 3 года: незначительное отставание физического, психомоторного, раннего речевого развития.
			Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 540 - 559, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии частых тетаний различных мышечных групп (скелетных, дыхательных, мышц желудочно-кишечного тракта (далее - ЖКТ) и (или) наличия умеренных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); 0 - 3 года: умеренное отставание физического, психомоторного, раннего речевого развития
			Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при

			нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 540 - 559, B 610 - 639	наличии частых тетаний различных мышечных групп (скелетных, дыхательных, мышц ЖКТ) и (или) наличия выраженных и значительно выраженных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); наличие резистентности к проводимой терапии активными метаболитами витамина D и их аналогами; 0 - 3 года: выраженное отставание физического, психомоторного, раннего речевого развития
	Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной (околощитовидной) железы	E21	Количественная оценка стойких нарушений функций орга нарушений функций опорно-двигательного аппарата (осте костей, патологические переломы), и висцеральных наруш	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 529, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма при отсутствии (или начальных проявлениях) клинико-лабораторных и рентгенологических признаков гиперпаратиреоза: Z-критерий соответствует остеопении или остеопорозу (от -1,0 до -2,0) и (или) незначительные изменения показателей фосфорно-кальциевого обмена при отсутствии Rg-признаков гиперпаратиреоза; отсутствие переломов длинных трубчатых костей; отсутствие костных деформаций или незначительные (в пределах 10°) деформации оси конечности или позвоночника без нарушения или с незначительным нарушением их функций; отсутствие или незначительные нарушения мочевыделительной системы и (или) функции пищеварительной системы
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма при наличии клинико-лабораторных и

			движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 529, B 610 - 639	рентгенологических признаков гиперпаратиреоза: Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу (от -2,0 и менее с переломами) и (или) наличие начальных Rg-признаков (кисты в трубчатых костях, субпериостальная резорбция концевых фаланг, снижение высоты тел позвонков) и (или) наличие умеренных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена; патологические переломы до 1 раза в год, требующие лечения (в том числе оперативного); деформация оси конечности более 10°, но менее 20°, вторичная деформация оси позвоночника (сколиоз 2 степени и 3 степени) с умеренным нарушением их функций; умеренные нарушения мочевыделительной системы (наличие нефролитиаза с хронической болезнью почек (далее - ХБП) до 3 стадии); эпизоды язвенных поражений верхних отделов ЖКТ
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 529, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма при наличии клинико-лабораторных и рентгенологических признаков гиперпаратиреоза: Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу (от -2,0 и менее с множественными переломами) и (или) наличие отчетливых Rg-признаков (кисты трубчатых костей, костей таза, компрессионные переломы тел позвонков) и (или) наличие выраженных (или значительно выраженных) изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена; частые спонтанные патологические переломы (более 1 раз в год), требующие лечения (в том числе-оперативного); выраженная (20° и более)

				деформация оси конечности, возникновение ложных суставов, вторичная деформация оси позвоночника с выраженным нарушением их функций; выраженные нарушения мочевыделительной системы (наличие нефролитиаза с ХБП 4 стадии); многократные эпизоды язвенных поражений верхних отделов ЖКТ
	Гипопитуитаризм Другие состояния гиперфункции гипофиза Преждевременное половое созревание Низкорослость (карликовость), не классифицированная в других рубриках Ахондроплазия Спондилоэпифизарная дисплазия Энхондроматоз Синдром гидантоинового плода Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью Синдром Тернера	E23.0 E22.8 E30.1 E34.3 Q77.4 Q77.7 Q78.4 Q86.1 Q87.1 Q96	Оценка физического развития и степень его задержки пров стандартных отклонений (SDS - Standard Deviation Score) (возраста и пола или по эпикризным срокам. Эпикризным с является 1 месяц, от 1 года до 2 лет - 3 месяца, от 2 до 3 ле закрытия ростовых зон критерием установления категории роста для соответствующего возраста. При оценке низкоро также нарушения функций органов и систем организма в с низкорослостью	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма: задержка роста от 2 до 3 SDS или 1 - 2 эпикризных срока до закрытия зон роста; после закрытия зон роста при достижении социально значимого роста

			510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма: задержка роста от 4 до 5 SDS или на 3 - 4 эпикризных срока при неэффективности заместительной терапии до закрытия зон роста; 14 - 17 лет: после закрытия зон роста социально значимый рост не достигнут
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма: задержка роста более 5 SDS или 5 и более эпикризных сроков при неэффективности заместительной терапии до закрытия зон роста; 14 - 17 лет: после закрытия зон роста социально значимый рост не достигнут
	Гиперфункция гипофиза	E22		

	Акромегалия и гипофизарный гигантизм	E22.0		
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: акромегалия (гипофизарный гигантизм) легкого течения с незначительными нарушениями функций организма
			Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: акромегалия (гипофизарный гигантизм) с умеренными нарушениями функций организма; при неэффективности оперативного лечения (невозможность радикального устранения) и сохранения после оперативного лечения повышенного уровня инсулиноподобного фактора роста 1 отсутствие снижения соматотропного гормона в ходе диагностического теста
	Несахарный диабет Нефрогенный несахарный диабет	E23.2 N 25.1		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: несахарный диабет (центральный или нефрогенный), компенсированный или субкомпенсированный на фоне

			(статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	проводимой терапии; тубулопатии с костными деформациями: варусная деформация нижних конечностей незначительной степени (до 10°); 0 - 3 года: незначительная задержка физического, психомоторного, раннего речевого развития
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма при декомпенсации несахарного диабета (центрального или нефрогенного) на фоне резистентности к терапии; тубулопатии с костными деформациями: деформация (варусная, вальгусная) нижних конечностей умеренной степени (более 10°, но менее 20°)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма при декомпенсации несахарного диабета (центрального или нефрогенного) на фоне резистентности к терапии; наличие осложнений; тубулопатии с костными деформациями, требующими оперативного лечения (на период его проведения)

			пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	
	Синдром и болезнь Иценко-Кушинга	E24	Количественная оценка степени выраженности стойких на обусловленных синдромом и болезнью Иценко-Кушинга, з неактивная), степени тяжести формы заболевания (легкая, наличия осложнений (миопатии, кардиомиопатия с проявл остеопороз, аменорея, атрофия мышц, спонтанные перелом нарушения, гипертоническая первично-сморщенная почка поражения центральной нервной системы, психические на злокачественных опухолей гипофиза, надпочечников и рез	
			Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая форма синдрома с отсутствием или незначительными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: гиперкортицизм средней тяжести синдрома без осложнений, с умеренными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая форма синдрома с прогрессирующим течением на фоне проводимой терапии с осложнениями, в том числе от оперативного и (или) лучевого

			(статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799, B 540 - 559, B 410 - 429, B 610 - 639	лечения опухолей надпочечников или гипофиза; наличие рецидива заболевания, приводящего к выраженным нарушениям функций организма
	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	E25.0	Количественная оценка степени выраженности стойких на врожденном адреногенитальном синдроме зависит от форм сольтеряющая, гипертензивная форма), а также характера жизнеугрожаюших состояний)	
			Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: вирильная форма
			Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сольтеряющая форма: при отсутствии кризового течения (жизнеугрожающих состояний) на фоне постоянной заместительной терапии
			Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сольтеряющая форма: при наличии жизнеугрожающих состояний (кризов), верифицированных в условиях медицинской организации на фоне постоянной заместительной терапии
			Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: гипертоническая форма
	Первичный гиперальдостеронизм	E26.0		
			Нарушения функций эндокринной системы и	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма на фоне проводимой

			метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429	терапии (в том числе хирургического вмешательства)
			Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, рецидивы, продолженный рост опухоли, резистентность к медикаментозной терапии)
			Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 540 - 559, B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, повторное оперативное лечение, продолженный рост опухоли, резистентность к медикаментозной терапии)
	Первичная недостаточность коры надпочечниковая	E27.1		
			Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 110 - 199, B 540 - 559, B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стабильное течение заболевания на фоне заместительной глюкокортикоидной и минералокортикоидной терапии, отсутствие аддисонических кризов
			Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 110 - 199, B 540 - 559, B 410 -	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие аддисонических кризов средней частоты (3 - 5 раз в год), верифицированных в условиях стационара

			429, B 440 - 450	
			Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: B 110 - 199, B 540 - 559, B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие частых аддисонических кризов (более 5 раз в год), верифицированных в условиях стационара
	Полигландулярная дисфункция Аутоимунная полигландулярная недостаточность Полигландулярная гиперфункция	E31 E31.0 E31.1	Количественная оценка стойких нарушений функций орга зависит от прогредиентного характера течения заболевани (количества и вида органов и (или) систем организма, вовл вида и степени нарушенных функций организма, сенсорны слепоты), статодинамических (множественные патологиче суставов, анкилозы), функций пищеварительной системы (болезнь), сердечно-сосудистой системы (ХСН различной с метаболизма (гипогликемический синдром, сахарный диаб различной стадии), функции кожи и связанных с ней систе стороны каждого "компонента" заболевания и эффективно	
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199; B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие клинико-функциональных проявлений заболевания на фоне проводимой терапии (в том числе хирургического лечения) или незначительные нарушения функций организма

			510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199; B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма при неэффективности лечения (в том числе хирургического)
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма при неэффективности лечения и (или) наличие осложнений со стороны органа и (или) системы, вовлеченной в синдром

			эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199; B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	
	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Другие уточненные формы избыточности питания	E66.0 E67.8		
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ожирение без осложнений либо в сочетании с незначительными нарушениями функций организма
			Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ожирение с индексом массы тела более 40,0 (или SDS индекса массы тела равно или более 4,0) в сочетании с умеренными нарушениями функций организма

			дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559	
ения обмена в		E70 - E90		
	Классическая фенилкетонурия Другие виды гиперфенилаланинемии	E70.0 E70.1	Количественная оценка стойких нарушений функций орга (далее - ФКУ), основывается, в первую очередь, на оценке физического и речевого развития ребенка, а также учитыва возможность достижения безопасного допустимого уровня возрастного периода, учитывает формирование способност за течением и терапией заболевания (соблюдение основны систематический контроль уровня фенилананина в сыворо уровне, осуществление самостоятельно диетотерапии). Да ребенка к 14 годам	
			Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при уровне ФА в крови в пределах от 2 до 6 мг/дл в период диагностики заболевания до начала соблюдения диеты или после верификации диагноза при уровне ФА от 2 до 6 мг/дл без соблюдения диеты в последующем при соответствующем возрасту физическом, психомоторном и речевом развитии
			Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 14 лет: с момента верификации диагноза до 14 лет при уровне ФА от 6 до 20 мг/дл (легкая и среднетяжелая форма ФКУ) при соблюдении диеты 15 - 17 лет: сохранение уровня ФА от 10 до 20 мг/дл на фоне диетотерапии при наличии умеренных нарушений функций организма: умеренное когнитивное снижение, умеренные речевые нарушения, умеренное снижение интеллекта (15 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский, WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов (взрослый WAIS); умеренная неврологическая симптоматика (умеренная полинейропатия); наличие

				белково-энергетической недостаточности (далее - БЭН) II степени
			Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 14 лет: с момента верификации диагноза до 14 лет при уровне ФА более 20 мг/дл: классическая (тяжелая) форма ФКУ, птерин-зависимая форма ФКУ; 15 - 17 лет: сохранение уровня ФА более 20 мг/дл на фоне диетотерапии при наличии выраженных нарушений функций организма: выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49); выраженные речевые нарушения и (или) выраженная неврологическая симптоматика (выраженная полинейропатия, мышечная дистония, парезы и прочее); наличие БЭН III степени
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 540 - 559, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сохранение уровня ФА более 20 мг/дл на фоне диетотерапии при наличии значительно выраженных нарушений функций организма: значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 35), значительно выраженная неврологическая симптоматика (гиперкинезы, пароксизмальные расстройства, мышечная дистония, парезы и прочее)
	Нарушение обмена ароматических аминокислот Нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью и обмена жирных кислот Другие нарушения обмена аминокислот Другие нарушения обмена	E70 E71 E72 E74	Количественная оценка степени выраженности стойких на орфанных заболеваниях, обусловленных нарушением обме разветвленной цепью, жирных кислот, сфинголипидов, гл оценке показателей нервно-психического, физического и р учитывает форму и тип течения заболевания (прогредиент полиморфизм симптоматики, возможность компенсации н патогенетическим лечением, прогноз течения заболевания Для заболеваний, при которых показана диетотерапия, учи	

	углеводов Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов Нарушения обмена гликозаминогликанов Нарушение обмена гликопротеинов Нарушения обмена липопротеидов и другие липидемии Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Нарушения обмена порфирина и билирубина Нарушения минерального обмена	E75 E76 E77 E78 E79 E80 E83	самостоятельно осуществлять контроль за течением и тера принципов расчета лечебного питания, систематический к метаболитов на допустимом безопасном уровне, осуществл	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: кризовое или прогредиентное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии умеренных нарушений функций организма; 0 - 3 года: умеренная задержка физического, психомоторного и раннего речевого развития
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: кризовое или прогредиентное течение заболевания с неблагоприятным прогнозом, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии выраженных нарушений функций организма; 0 - 3 года: выраженная задержка физического, психомоторного и раннего речевого развития

			пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 540 - 559, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: кризовое или прогредиентное течение заболевания с неблагоприятным прогнозом, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии значительно выраженных нарушений функций организма; 0 - 3 года: значительно выраженная задержка физического, психомоторного и раннего речевого развития
	Кистозный фиброз с легочными проявлениями Кистозный фиброз с другими проявлениями Кистозный фиброз неуточненный	E84.0 E84.8 E84.9	Количественная оценка стойких нарушений функций орга основывается на оценке фазы и активности процесса, хара генетических мутаций, степени выраженности проявлений дыхательной, сердечно-сосудистой эндокринной системы, микробного патогена дыхательного тракта, а также на нал	
			Нарушения функций дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 440 - 449, B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: формы заболевания без клинической симптоматики или легкое течение заболевания с незначительными нарушениями функции дыхательной и пищеварительной систем
			Нарушения функций	Для детей в возрасте 0 - 17 лет:

			пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449; B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	среднетяжелая форма заболевания с умеренными нарушениями функций организма, первичный или интермитирующий высев: P. aeruginosa, B. cepacia complex, (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; MRSA), Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter spp., нетуберкулезными микобактериями, грибами рода Aspergillus и других микробных патогенов, синдром потери соли, хроническая панкреатическая недостаточность, острый и рецидивирующий панкреатит, мекониевый илеус или синдром дистальной интестинальной обструкции, кровохарканье, цирроз печени без портальной гипертензии, нарушенная толерантность к глюкозе и диабет без потребности в инсулине, хронический панкреатит, белково-энергетическая недостаточность 1 - 2 степени.
			Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ; B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая форма заболевания с выраженными нарушениями функций организма; наличие тяжелых хронических инфекционных осложнений, вызванных: P. aeruginosa, B. cepacia complex, MRSA, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter spp., нетуберкулезными микобактерии, грибами рода Aspergillus и другими микробными патогенами, повторный синдром потери соли, мекониевый илеус или синдром дистальной интестинальной обструкции, легочное кровотечение, цирроз печени с портальной гипертензией, муковисцидоз-ассоциированный диабет с потребностью в инсулине, остеопороз, белково-энергетическая недостаточность 2 - 3 степени - носители гастростомы, панкреатическая недостаточность с высокой потребностью в панкреатических ферментах (> 10 000 Ед/кг или 4 000 Ед/грамм жира),

				частые обострения хронического панкреатита, пневмоторакс
			Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 110 - 199	Хроническая дыхательная недостаточность с кислородозависимостью, объем форсированного выдоха за первую секунду < 30% от должного, пациенты находящиеся в листе ожидания на трансплантацию легких или печени
		F00 - F99	Количественная оценка степени выраженности нарушений психическими расстройствами и расстройствами поведени выраженности, прогредиентности патопсихологической, п симптоматики в различные возрастные периоды с учетом и Независимо от нозологической формы психического расст выраженности психических функций учитывается уровень организма (фактор наследственности, половозрастные осо систем организма), реабилитационного потенциала личнос эмоционально-волевой компонент в зависимости от возрас социальной группы (семьи), характер получения образова общеобразовательным стандартам или по адаптированной (в возрасте старше 14 лет). Необходимой составляющей яв сферах жизнедеятельности ребенка (семейной, бытовой, со профессиональной сфере и прочих)	
ойства огического ия		F80 - F89		
омы и признаки, щиеся к речи и	Специфические расстройства развития речи и языка Специфические расстройства развития учебных навыков Смешанные специфические расстройства психологического развития Заикание (запинание) Симптомы, признаки, относящиеся к речи и голосу	F80 F81 F83 F98.5 R47 - R49	Количественная оценка степени выраженности нарушений возрасте 3 лет и старше зависит от уровня (степени) общег (далее соответственно - ОНР, СНР), от вида речевого синд устной речи (ринолалия, дизартрия, дислалия, заикание, а (дисграфия, дислексия, дискалькулия); нарушений голосо начала проведения мероприятий по комплексной реабилит коррекция, медикаментозная терапия, логопедическая, деф коррекция) и их эффективность. Заключение с указанием с недоразвития речи, конкретного вида речевого синдрома и специалист-логопед медицинской организации. При определении количественной оценки степени выраже возрасте до 3 лет необходимо учитывать темповую задерж	

			которая рассматривается как нестойкое нарушение языков языковых и речевых функций в этом возрастном периоде н входят в структуру различных клинических синдромов, об нервной системы, психической и (или) соматической сфер данный возрастной период оказывают влияние объем и кач лечения, в том числе педагогической и психологической ко	
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299	Для детей в возрасте 3 - 17 лет: ОНР 3 и 4 уровня речевого развития, СНР легкой степени, незначительные проявления речевых синдромов устной и письменной речи; незначительные нарушения психических и (или) сенсорных функций
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299	Для детей в возрасте 3 - 17 лет: ОНР 2 уровня речевого развития, СНР средней степени, умеренные проявления речевых синдромов устной и письменной речи; нарушения психических и (или) сенсорных функций (незначительные или умеренные)
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399, B 210 - 299	Для детей в возрасте 3 - 17 лет: ОНР 1 уровня речевого развития, СНР выраженной степени, выраженные проявления речевых синдромов устной и письменной речи; нарушения психических и (или) сенсорных функций (незначительные или умеренные или выраженные)
	Общие расстройства психологического развития	F84	Количественная оценка степени выраженности нарушений аутистического спектра основывается на оценке степени д социального взаимодействия; оценке "поведенческого сце защиты - моторные и речевые стереотипии, поведенческие патологические фантазии, "феномен тождества" или требо неадекватная реакция на сенсорные стимулы, постоянства является отсутствие или наличие специфических речевых недостаточности, психопатологических проявлений (катат нарушения в структуре аутизма). В возрастном периоде от 0 до 3 лет количественная оценка организма должна учитывать степень нарушения коммуни развития ребенка и формирования социальных и поведенч	

	Детский аутизм Атипичный аутизм Синдром Ретта Другое дезинтегративное расстройство детского возраста	F84.0 F84.1 F84.2 F84.3		
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ребенок самостоятельно устанавливает контакт, но испытывает трудности в организации общения (нервозность, робость, быстрое истощение, двигательная расторможенность). Нет активного избегания взгляда. "Поведенческий сценарий": сохранение постоянства среды за счет формирования штампов-образцов правильного социального поведения; защитные образования (стереотипии, ритуалы) минимальны, носят адекватный, компенсаторный характер и появляются в ситуации тревоги. 0 - 3 года: навыки формируются соответственно возрасту либо имеется незначительная задержка (регресс) психомоторного, речевого развития и социальных навыков. 4 - 17 лет: функции речи не нарушены либо имеются незначительные специфические нарушения речи (ОНР 3 или 4 уровня речевого развития или СНР легкой степени). Интеллект не снижен либо снижен незначительно: 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ребенок самостоятельно устанавливает минимальный контакт с окружающими, требуется постоянное побуждение. Во время контакта - повышенный уровень нервозности и боязни. Наличие кратковременного фиксированного визуального контакта. "Поведенческий сценарий": допускаются минимальные

				нарушения стереотипа общения, формируя сложные виды аффективной защиты (патологические увлечения, компенсаторные фантазии, лишенные социальной направленности). 0 - 3 года: не сформирована познавательная и коммуникативная функция речи, имеет место нарушение (регресс) психического, речевого развития и задержка формирования поведенческих и социальных навыков; 4 - 17 лет: нарушена коммуникативная функция речи, имеются умеренные специфические нарушения речи (ОНР 2 или СНР легкой или средней степени). Интеллект не снижен либо снижен от незначительной до умеренной степени (4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов)
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ребенок самостоятельно не устанавливает контакт с окружающими, возможно лишь кратковременное привлечение внимания после побуждения. Избегание визуального контакта. "Поведенческий сценарий": не допускаются нарушения стереотипа окружающей среды, формируются множественные стереотипии, поведенческие ритуалы; характерны выраженные фобии, обсессивно-компульсивные нарушения, регресс ранее сформированных социальных, учебных и речевых навыков. Возможно сочетание с различными вариантами кататонического синдрома. 0 - 3 года: стойкая выраженная задержка (регресс) психического, речевого развития и социальных навыков. 4 - 17 лет: выраженные

				специфические нарушения речи (ОНР 1 уровня или СНР тяжелой степени). Интеллект-выраженное снижение: IQ = 35 - 49 баллов
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: контакт с ребенком невозможен, привлечь внимание не удается. Отсутствие визуального контакта. Полное отсутствие вербального контакта. "Поведенческий сценарий": при малейшем изменении постоянства окружающей среды - неуправляемое хаотичное двигательное возбуждение либо полное отрешение от окружающего; многочисленные страхи, стереотипии, проявления кататонического синдрома. Методы аффективной защиты (ритуалы) не развиты. Возможно наличие эпилептических припадков. 0 - 3 года: значительно выраженное нарушение психического, речевого развития и отсутствие элементарных социальных и поведенческих навыков. Интеллект: значительно выраженное снижение (IQ < 34 баллов)
енная отсталость		F70 - F79	Количественная оценка степени выраженности нарушений отсталости у ребенка старше 3 лет основывается на степен интеллектуальной недостаточности, наличии, клиническом поведенческих нарушений, соматоневрологической патоло параличи, парезы, патология зрения и слуха и другие нару прогнозе на уровне адаптации ребенка в основных сферах В случае отсутствия в структуре умственной отсталости кл нарушений, соматоневрологической патологии количестве психических функций производится по степени интеллект У детей в возрасте 3 года и старше степень интеллектуаль клиническим проявлениям и данным адаптированных мето тест WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelli Scale for Children), у детей с нарушениями речи или слуха, запущенностью, с задержками навыков чтения и письма дл предпочтительнее использовать детский вариант теста Рав (от 7 до 15 лет 11 месяцев) и тест WAIS (Wechsler Adult In тестирования взрослых (от 16 лет и старше). При невозмож дефекта методикой Векслера в связи с особенностями кли	

			ребенка оценка производится только клинически по резул (заключение ВК психоневрологического диспансера). При наличии в структуре умственной отсталости системно количественно оцениваются и нарушения языковых и рече	
	Умственная отсталость легкой степени	F70		
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 3 - 17 лет: легкая умственная отсталость при отсутствии сопутствующей симптоматики, либо в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающими незначительной степени, что не приводит к существенным нарушениям адаптации 3 - 7: IQ = 70 - 79 баллов (детский WPPSI или WISC) 8 - 15: IQ = 70 - 79 баллов (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS)
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 3 - 17 лет: легкая умственная отсталость в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающими умеренной степени, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности. 3 - 7 лет: IQ = 50 - 79 баллов (детский, WPPSI или WISC); 8 - 15 лет: IQ = 50 - 79 баллов (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 69 баллов (взрослый WAIS)
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 3 - 17 лет: легкая умственная отсталость в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающими выраженной степени, что приводит к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. 3 - 7 лет: IQ = 50 - 79 баллов (детский, WPPSI или WISC). 8 - 15 лет: IQ = 50 - 79 баллов

				(детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 69 баллов (взрослый WAIS). Нарушение контроля функции тазовых органов
	Умственная отсталость умеренная	F71		
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 3 - 17 лет: умеренная умственная отсталость (IQ = 35 - 49 баллов) при отсутствии или в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающими выраженной степени, что приводит к выраженной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности, требующей частичного ухода и надзора. Нарушение контроля функции тазовых органов
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 3 - 17 лет: умеренная умственная отсталость (IQ = 35 - 49 баллов) в сочетании со значительно выраженными психопатологическими состояниями в структуре дефекта (некоррегируемые нарушения аффективной сферы, поведения, влечения, грубая соматоневрологическая симптоматика, значительно выраженные пароксизмальные расстройства и прочие расстройства), приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов
	Умственная отсталость тяжелая	F72		
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, нарушения функций пищеварительной системы, нарушения	Для детей в возрасте 3 - 17 лет: тяжелая умственная отсталость (IQ = 20 - 34 балла), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Нарушение или

			мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	отсутствие контроля функции тазовых органов
	Умственная отсталость глубокая	F73		
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 3 - 17 лет: глубокая умственная отсталость (IQ < 20 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Отсутствие контроля функции тазовых органов
рения, пические и ые расстройства		F20 - F29	Количественная оценка нарушений психических функций начала заболевания, темпа течения и стадии процесса, выр синдрома (синдромов) в приступе, длительности и частоть степени выраженности дефицитарной симптоматики; выра выраженности регресса, а также от этапа формирования, с ремиссии (дефекта), наличия критики к своему состоянию клинического прогноза, уровня социальной адаптации в ос (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обуч	
	Шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения	F20.x3		
	Параноидная шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения	F20.03		
	Гебефреническая шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения	F20.13		
	Кататоническая шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения	F20.23		
	Недифференцированная шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения	F20.33		
	Постшизофреническая Депрессия (шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения)	F20.43		
	Простой тип шизофрении, эпизодический ремиттирующий тип течения	F20.63		
	Другой тип шизофрении, эпизодический ремиттирующий	F20.83		

	тип течения Шизофрения неуточненная, эпизодический ремиттирующий тип течения Шизоаффективные расстройства	F20.93 F25		
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: обострения общей продолжительностью до 2 месяцев в год; стойкая ремиссия, наличие незначительной дефицитарной симптоматики без существенного влияния на социальную адаптацию и обучение ребенка
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: обострения общей продолжительностью от 2 до 4 месяцев в год; неполная ремиссия с резидуальной симптоматикой; наличие умеренной дефицитарной симптоматики, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: затяжные или частые обострения общей продолжительностью от 4 и более месяцев в год; неполная ремиссия с резидуальной симптоматикой, резистентной к терапии; наличие выраженной дефицитарной симптоматики, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
	Шизофрения: эпизодический тип течения с нарастающим дефектом Параноидная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом Гебефреническая шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом Кататоническая шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом Недифференцированная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом	F20.x1 F20.01 F20.11 F20.21 F20.31	Количественная оценка нарушений психических функций при шизофрении зависит от возраста начала заболевания, темп выраженности и стойкости основного синдрома (синдромо характера, динамики и степени выраженности дефицитарн выраженности регрессивных расстройств, этапа формиров ремиссии (дефекта), от наличия интеллектуального сниже процессуальных изменений личности и других синдромов, окружающей действительности; клинического прогноза; у сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой социально	

	Постшизофреническая депрессия (шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом) Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом Простой тип шизофрении, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом Шизофрения: эпизодический тип течения со стабильным дефектом Параноидная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом Гебефреническая шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом Кататоническая шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом Недифференцированная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом Постшизофреническая депрессия (шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом) Остаточная шизофрения, эпизодический тип течения со стабильным дефектом Простой тип шизофрении, эпизодический тип течения со стабильным дефектом	F20.41 F20.51 F20.61 F20.x2 F20.02 F20.12 F20.22 F20.32 F20.42 F20.52 F20.6		
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: обострения общей продолжительностью от 4 до 6 месяцев в год; неполная ремиссия с умеренной дефицитарной симптоматикой; умеренными эндогенными изменениями личности; незначительное (умеренное) снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов - детский WISC; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 (взрослый WAIS)

			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: обострения продолжительностью от 6 до 8 месяцев в год; неполная ремиссия с резидуальной симптоматикой, резистентной к терапии, выраженная дефицитарная симптоматика; выраженные эндогенные изменения личности; умеренное или выраженное (IQ 35 - 49 баллов) снижение интеллекта; нарушение контроля функции тазовых органов
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: обострения продолжительностью более 8 месяцев в год, частые обострения с продуктивной симптоматикой (аффективной, кататонической, гебефренной, гебоидной, галлюцинаторно-бредовой, с помрачением сознания); значительно выраженная дефицитарная симптоматика; эндогенные изменения личности; значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов); отсутствие контроля функции тазовых органов
	Шизофрения, непрерывный тип течения: Параноидная шизофрения, непрерывный тип течения Гебефреническая шизофрения, непрерывный тип течения Кататоническая шизофрения, непрерывный тип течения Недифференцированная шизофрения, непрерывный тип течения Остаточная шизофрения, непрерывный тип течения Простой тип шизофрении, непрерывный тип течения Другой тип шизофрении, непрерывный тип течения Шизофрения неуточненная, непрерывный тип течения	F20.x0 F20.00 F20.10 F20.20 F20.30 F20.50 F20.60 F20.80 F20.90	Количественная оценка нарушений психических функций типе течения зависит от возраста начала процесса, темпа т быстро-прогредиентного), ее формы, стадии процесса, выр синдрома (синдромов) "позитивного" спектра, синдромов динамики и степени выраженности дефицитарной симптом расстройств, этапа формирования, стойкости, выраженност шизофрении, наличия и степени интеллектуального сниже изменений личности (синдрома аутизма), наличия критики действительности; прогноза заболевания, уровня социальн жизнедеятельности (семейной, бытовой, социально-средов Указанные в подпунктах 5.3.3.1 - 5.3.3.4 настоящей количе нарушения функций организма, характерны для непрерыв шизофрении, средне-прогредиентного по темпу	
			Нарушения психических,	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: незначительная продуктивная и

			языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	(или) дефицитарная симптоматика, незначительные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский, WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS) с сохранением критики к ситуации в целом, не оказывающие существенного влияния на социальную адаптацию и обучение
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: умеренная продуктивная и (или) дефицитарная симптоматика, умеренные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); незначительное или умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 (взрослый WAIS), существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: выраженная продуктивная и (или) дефицитарная симптоматика; выраженные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); умеренное или выраженное (IQ = 35 - 49 баллов) снижение интеллекта; нарушение контроля функции тазовых органов, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: значительно выраженная продуктивная симптоматика и (или) дефицитарная симптоматика; значительно выраженные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); значительно выраженное снижение интеллекта: IQ < 34

			310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	баллов; нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: выраженная продуктивная симптоматика (кататоническая, кататоно-гебефренная, галлюцинаторная, бредовая и прочие виды сиптоматики), плохо поддающаяся терапии, выраженная симптоматика непсихотического регистра (неврозоподобные, психопатоподобные, аффективные расстройства); выраженная дефицитарная симптоматика; выраженные проявления синдрома аутизма; выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); нарушение контроля функции тазовых органов с быстрым формированием стойкого выраженного исходного состояния (дефекта) и социальной дезадаптации
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: выраженная продуктивная симптоматика (гебоидная, кататоническая, кататоно-гебефренная, кататоно-галлюцинаторная, бредовая и так далее), резистентная к терапии, значительно выраженная дефицитарная симптоматика; значительно выраженные проявления синдрома аутизма; значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов); нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов с быстрым формированием стойкого значительно выраженного исходного состояния (шизофренического слабоумия)
	Шизотипическое расстройство	F21	Указанные в подпунктах 5.3.4.1 - 5.3.4.4 настоящей количе	

			нарушения функций организма характерны для непрерывн шизофрении, медленно прогредиентного по темпу (вялоте	
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: медленно прогредиентное течение со стойкой незначительной симптоматикой непсихотического регистра, с незначительной дефицитарной симптоматикой, незначительными эндогенными изменениями личности, отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский, WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS), не оказывающие существенного влияния на социальную адаптацию и обучение ребенка
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: медленно прогредиентное течение со стойкой умеренной симптоматикой непсихотического регистра, умеренной дефицитарной симптоматикой, умеренными эндогенными изменениями личности; незначительное или умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 (взрослый WAIS), существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: медленно прогредиентное течение со стойкой выраженной симптоматикой непсихотического регистра, выраженной дефицитарной симптоматикой, выраженными эндогенными изменениями личности; умеренное или выраженное (IQ = 35 - 49 балла) снижение интеллекта; нарушение контроля функции тазовых органов, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушения	Для детей в возрасте 4 - 17 лет:

			психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	значительно выраженные психопатоподобные расстройства, сочетание психопатоподобных расстройств с гебоидным синдромом, значительно выраженная истеро-конверсионная симптоматика (истерический амавроз, истерический псевдопаралич нижних конечностей и прочие) с ситуативно-неадекватным поведением, отсутствием критики и некорректируемыми нарушениями патологических влечений; нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора
ойства настроения тивные ойства)		F30 - F39	Количественная оценка нарушений психических функций (маниакальных, депрессивных, смешанных) зависит от вид проявлений, частоты и длительности эпизодов, эффективн стойкости и длительности ремиссий, наличия критики к св действительности, клинической и социальной компенсаци социальной адаптации в основных сферах жизни ребенка (ситуации обучения)	
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 310 - 340, B 398, B 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: аффективные расстройства незначительные, купирующиеся фармакотерапией, со стойкой ремиссией, существенно не сказывающиеся на адаптации основных сфер жизнедеятельности
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкие затяжные или частые аффективные расстройства, умеренные, общей продолжительностью более 6 месяцев в год, затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушения психических, языковых и речевых функций;	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные аффективные расстройства, затяжные или частые, общей продолжительностью более

			МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	10 месяцев в год, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкие затяжные или частые значительно выраженные аффективные расстройства общей продолжительностью более 10 месяцев в год, с нуждаемостью в постоянном уходе и надзоре
тические, ные со стрессом и формные ойства		F40 - F48	Количественная оценка нарушений психических функций и подросткового возраста зависит от вида, длительности и (реакция, состояние, затяжное состояние, невротическое и личности), вида и выраженности невротического синдрома регресс навыков опрятности, моторных навыков), эффекти критики к своему состоянию и ситуации; клинической и со состояния (наличие защитных ритуалов, других методов а социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельно социально-средовой, в ситуации обучение). К незначитель относятся кратковременные невротические состояния (дли невротический синдром длительностью свыше 1 года с нез симптоматикой; к умеренным нарушениям - затяжное нев лет) при наличии стойких умеренных клинических проявл тревожной, обсессивно-компульсивной, депрессивной, ипо формирования экспрессивной речи, социальных навыков,	
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 7 лет: незначительные соматовегетативные расстройства, обсессии (фобии, идеаторные, моторные обсессии) с элементами чуждости, с формированием простых компенсаторных ритуалов, аффективные нарушения (адинамическая, тревожная депрессия и прочие), синдромы дереализации-деперсонализации, симптомы регресса
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 8 - 17 лет: незначительные невротические состояния (истерические, неврастенические, фобо-обсессивные и прочие), возможно присоединение ипохондрического синдрома без склонности к затяжному течению
			Нарушения психических, языковых и речевых	Для детей в возрасте 4 - 7 лет: сложные обсессии с элементами навязчивости, чуждости, с

			функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	формированием защитных формирований (ритуалов), аффективные нарушения (депрессия), синдромы дереализации-деперсонализации, синдромы регресса
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 8 - 17 лет: стойкие умеренные невротические состояния (истерические, неврастенические, фобо-обсессивные, и прочие), возможно присоединение ипохондрического синдрома со склонностью к затяжному течению.
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: затяжное течение стойких выраженных невротических состояний (истерические, неврастенические, фобо-обсессивные, сенесто-ипохондрические и прочие состояния) с возможным переходом в патологическое развитие личности
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 8 - 17 лет: стойкое невротическое или патохарактерологическое развитие личности с формированием сверхценной идеи со значительно выраженной истероконверсионной симптоматикой (истерический амавроз, истерический псевдопаралич нижних конечностей и прочие виды симптоматики)
ические, включая оматические еские ойства ональные ойства и ойства поведения, ющиеся обычно в м и подростковом те		F00 - F09 F90 - F98	Количественная оценка нарушений психических функций зависит от нозологической принадлежности, стадии заболе нарушений психических процессов (по органическому или психоорганический и астенический синдромы соответстве синдромов личностного регистра (неврозоподобных, психо сопутствующей симптоматики (психотической, аффективн симптоматики); наличия и степени снижения интеллекта, а также уровня социальной адаптации в основных сферах ж социально-средовой, в ситуации обучения)	
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные когнитивные нарушения, незначительная или умеренная астеническая симптоматика, незначительный

			310 - 399	гипердинамический синдром, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, незначительный психоорганический синдром, незначительные расстройства личностного регистра (неврозоподобные, психопатоподобные и прочие), незначительные аффективные и другие стойкие незначительные расстройства непсихотического регистра, не затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности. Отсутствие нарушения или незначительное нарушение языковых и речевых функций. Отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 3 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский WISC, WPPSI); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS)
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренное снижение когнитивных процессов, выраженная астеническая симптоматика, умеренный гипердинамический синдром, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, умеренный психоорганический синдром, умеренные расстройства личностного регистра (неврозоподобные, психопатоподобные и прочие), умеренные аффективные и другие стойкие умеренные расстройства непсихотического регистра, стойкие умеренные синдромы психотического регистра (синдром галлюциноза, бредовые расстройства), затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности. Возможно сочетание с незначительными (умеренными) нарушениями языковых и речевых функций и (или) с незначительным

				(умеренным) снижением интеллекта 3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 (взрослый WAIS)
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженное снижение когнитивных процессов, выраженный гипердинамический синдром, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, выраженный психоорганический синдром, выраженные расстройства личностного регистра (неврозоподобные, психопатоподобные), стойкие выраженные аффективные и другие выраженные расстройства непсихотического регистра, стойкие выраженные синдромы психотического регистра (синдром галлюциноза, бредовые расстройства), приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. Возможно сочетание с умеренными (выраженными) нарушениями языковых и речевых функций и (или) с умеренным (выраженным) (IQ = 35 - 49 баллов) снижением интеллекта. Нарушение контроля функции тазовых органов
			Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженное снижение когнитивных процессов и интеллекта (IQ < 34); отсутствие контроля функции тазовых органов, необходимость в постоянном уходе и надзоре.
дические и измальные ойства	Другие виды генерализованной	G40 - G47 G40.4	Количественная оценка выраженности нарушений психиче эпилептических синдромах зависит от возраста, в котором возникновения патологии (идиопатический или симптомат эпилептического очага, вида, частоты и тяжести эпилептич	

	эпилепсии и эпилептических синдромов Приобретенная афазия с эпилепсией (Ландау-Клеффнера)	F80.3	заболевания (прогредиентный, доброкачественный, ремит эффективности проводимой противоэпилептической терап длительности межприступного периода. Частота эпилепти протяжении календарного года, обязательным условием яв терапии. Необходимо также учитывать наличие, структуру патопсихологического уровня реагирования, интеллектуал расстройств устной и письменной речи; наличие и степень психомоторных, речевых, социальных навыков. Маркером реабилитационного прогноза при эпилепсии и эпилептичес являются злокачественные формы группы так называемых ранним дебютом (на первом году жизни), включающих си раннюю миоклоническую энцефалопатию, синдром Ленно энцефалопатию с продолженной спайк-волновой активнос энцефалопатий характерно злокачественное прогредиентн противосудорожной терапии; отсутствие прогресса психич ребенка на первом году жизни, формирование тяжелой и г недостаточности	
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 3 года: незначительные пароксизмальные расстройства: легкие припадки до 3 в день, тяжелые - 1 раз в месяц и реже, сумеречное расстройство сознания, особые состояния сознания, амбулаторный автоматизм - 1 раз и реже в 2 месяца; и (или) незначительная стойкая задержка психомоторного, речевого развития и социальных навыков в структуре основного заболевания
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: незначительные пароксизмальные расстройства: легкие припадки до 3 в день, тяжелые - 1 раз в месяц и реже, сумеречное расстройство сознания, особые состояния сознания, амбулаторный автоматизм - 1 раз и реже в 2 месяца; и (или) наличие незначительной патопсихологической симптоматики незначительного нарушения устной и (или) письменной речи; отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 4 - 17 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский, WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS)
			Нарушения	Для детей в возрасте 0 - 3 года:

			психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	легкие припадки (3 - 4 в день) в сочетании со стойкой умеренной задержкой психомоторного, речевого развития и социальных навыков; тяжелые припадки - 2 раза в месяц; выраженные дисфории - 1 раз и реже в месяц; сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз и реже в 1,5 месяца; амбулаторный автоматизм 2 - 3 раза в месяц, дисфории 1 раз и реже в месяц, эпилептический статус, серийные припадки - 1 раз в 3 месяца и (или) проявления стойкой умеренной задержки психомоторного, речевого развития и социальных навыков в структуре основного заболевания
			Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399	Дня детей в возрасте 4 - 17 лет: легкие припадки (3 - 4 в день) в сочетании с умеренными изменениями личности, умеренной патопсихологической симптоматикой; тяжелые припадки - 2 раза месяц; выраженные дисфории - 1 раз и реже в месяц; сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз и реже в 1,5 месяца; амбулаторный автоматизм 2 - 3 раза в месяц, эпилептический статус, серийные припадки - 1 раз в 3 месяца; и (или) умеренная патопсихологическая симптоматика (психопатоподобные расстройства, психоорганический синдром и прочие); умеренные нарушения устной и письменной речи; умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский, WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 балла (взрослый WAIS)
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных,	Для детей в возрасте 0 - 3 года: легкие припадки 5 и более в день в сочетании со стойкой умеренной задержкой психомоторного,

			нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539; B 610 - 639	речевого развития и социальных навыков; тяжелые припадки с частотой 3 раза в месяц, сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз в месяц, выраженные дисфории - 2 - 3 раза в месяц, амбулаторные автоматизмы 4 раза в месяц и более, эпилептический статус, серийные припадки любой частоты (не контролируемое течение, резистентность к терапии) и (или) проявления стойкой выраженной задержки (регресса) психомоторного, речевого развития и социальных навыков в структуре основного заболевания
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539; B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: легкие припадки 5 и более раз в день в сочетании с выраженной патопсихологической симптоматикой, выраженными изменениями личности; выраженным снижением интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); тяжелые припадки с частотой 3 раза в месяц, эпилептический статус, серийные припадки любой частоты, сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз в месяц, выраженные дисфории - 2 - 3 раза в месяц, амбулаторные автоматизмы 4 раза в месяц и более и (или) стойкая выраженная патопсихологическая симптоматика (психопатоподобные расстройства, психоорганический синдром и прочие), выраженная симптоматика психотического регистра; выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); нарушение контроля функции тазовых органов
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных,	Для детей в возрасте 0 - 3 года: синдромы группы "эпилептических энцефалопатий" (синдром Веста, Айкарди, Отахара Драве, ранняя

			нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	миоклоническая энцефалопатия, синдром Леннокса-Гасто, эпилептическая энцефалопатия с продолженной спайк-волновой активностью во сне и прочие синдромы) с ранним дебютом (на первом году жизни), прогредиентным течением, резистентностью к противоэпилептической терапии, значительно выраженной задержкой развития психомоторных, речевых и социальных навыков в структуре основного заболевания
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: тяжелые припадки - 4 и более раз в месяц, 2 и более сумеречных расстройства сознания или особых состояния сознания, 4 и более эпизодов выраженной дисфории, 1 и более эпистатус в месяц; и (или) значительно выраженная патопсихологическая симптоматика, симптоматика психотического регистра, отсутствие речи, значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов), отсутствие контроля функции тазовых органов
		G00 - G99	Количественная оценка степени выраженности стойких на обусловленная заболеваниями нервной системы, основыва выраженности двигательных нарушений (параличи, парез опору и передвижение, способность осуществлять просты оценке наличия и степени выраженности психических, реч функций организма. Учитываются также и другие факторы форма, тип и тяжесть течения заболевания, активность про наличие и курабельность пароксизмальных состояний; рас процесса, наличие осложнений, факторы клинического и р	
дствия травм, ений и других ствий внешних и		T90 - T98		
	Последствия травм головы Последствия воспалительных	T90 G09		

	болезней центральной нервной системы			
			Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения статодинамических функций: легкий гемипарез, легкий парез, парапарез; легкий атактический синдром и другие легкие очаговые нарушения. Незначительные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; 0 - 3 года: незначительная задержка психомоторного и речевого развития в структуре основного заболевания
			Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения статодинамических функций: легкий тетрапарез, умеренный гемипарез; умеренный парапарез; умеренный атактический синдром и другие умеренные очаговые нарушения. Умеренные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; 0 - 3 года: умеренная задержка психомоторного и речевого развития в структуре основного заболевания
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения статодинамических функций: умеренный тетрапарез, выраженный гемипарез, выраженный парапарез, выраженный парез; выраженный атактический синдром и другие выраженные очаговые нарушения. Выраженные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций. Нарушение контроля функции тазовых органов; 0 - 3 года: выраженная задержка психомоторного и речевого развития в структуре основного заболевания
			Нарушения психических,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения

			языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	статодинамической функции: значительно выраженный парапарез (либо параплегия), значительно выраженный гемипарез (либо плегия); выраженный (значительно выраженный) тетрапарез (тетраплегия); значительно выраженная статическая и динамическая атаксия (самостоятельное передвижение невозможно). Значительно выраженные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций. Отсутствие контроля функции тазовых органов. Вегетативное состояние
	Наследственная атаксия	G11		
	Врожденная непрогрессирующая атаксия Ранняя мозжечковая атаксия Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК Другая наследственная атаксия	G11.0 G11.1 G11.3 G11.8		
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; незначительные легкие сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые только при выполнении специальных тестов, не нарушающие адаптацию и функционирование ребенка. Незначительные нарушения функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; умеренные сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые при выполнении обычных движений, нарушающие опору и передвижение,

			движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429	препятствующие формированию возрастных навыков. Умеренные нарушения функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; выраженные сенситивно-мозжечковые нарушения (значительно затрудняется передвижение, выполнение обычных движений). Выраженные нарушения функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; значительно выраженные сенситивно-атактические нарушения. Значительно выраженные нарушения функций организма
	Наследственная спастическая параплегия	G11.4		
			Нарушения психических,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкий парез нижних конечностей

			языковых и речевых, сенсорных функций; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	(снижение мышечной силы до 4 баллов) без ограничения объема активных движений, нарушения опоры и передвижения, без деформаций стоп и формирования контрактур. Незначительные нарушения функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов) с умеренным нарушением способности к передвижению, формирование деформации стоп, контрактур в суставах. Умеренные нарушения функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов) с выраженным нарушением способности к передвижению, с формированием деформации стоп, контрактур в суставах. Выраженные нарушения функций организма
	Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы	G12		
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с	Для детей в возрасте 0 - 3 года: периферический легкий тетрапарез, умеренный парапарез и (или) умеренный парез проксимального отдела обеих нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов). Умеренные бульбарные

			движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	расстройства. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с умеренными нарушениями функций дыхательной системы. Нарушение формирования двигательных возрастных навыков
			Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 399, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: генерализация атрофического процесса: выраженный нижний парапарез, умеренный верхний парапарез. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с выраженными нарушениями функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Выраженные бульбарные расстройства. Нарушение контроля функции тазовых органов
			Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 310 - 399, B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: генерализация атрофического процесса: значительно выраженный периферический тетрапарез. Тяжелые деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз), нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, достигающих значительно выраженной степени. Значительно выраженные бульбарные и псевдобульбарные нарушения. Отсутствие контроля функции тазовых органов
пирамидные и двигательные ения		G20 - G26		
	Дистония Идиопатическая семейная дистония	G24 G24.1		

	Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения. Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках	G25 G26		
			Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкие фокальные и генерализованные гиперкинезы не изменяющие физиологическое положение тела, общая целенаправленность движений и действий сохранена. Наличие незначительных нарушений психических функций
			Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные фокальные и генерализованные гиперкинезы, изменяющие физиологическое положение тела и нарушающие последовательность и целенаправленность движений и действий. Наличие умеренных нарушений психических функций
			Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные фокальные и генерализованные гиперкинезы (торсионная дистония), сопровождающиеся стойким болевым синдромом, не контролируемые медикаментозным лечением, с фиксированным патологическим положением тела, нарушением равновесия, последовательности и целенаправленности движений и действий. Наличие выраженных нарушений психических функций
линизирующие и центральной й системы		G35 - G37		
	Рассеянный склероз Другая форма острой	G35 G36		

	диссеминированной демиелинизации Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы	G37		
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие признаков активности заболевания в соответствии с критериями, в том числе - по данным магнитно-резонансной томографии (далее - МРТ). Отсутствие или незначительные нарушения функций организма, в том числе - на фоне терапии препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза (далее - ПИТРС). Незначительные нарушения психических функций
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные парезы верхних и (или) нижних конечностей, умеренные бульбарные нарушения; частичная атрофия зрительных нервов с умеренными нарушениями сенсорных функций; другие умеренные нарушения функций организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС. Умеренные нарушения психических функций
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные парезы верхних и (или) нижних конечностей, выраженные бульбарные нарушения; нарушение контроля функции тазовых органов,

			скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	другие выраженные нарушения функций организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные парезы или параличи верхних и (или) нижних конечностей; значительно выраженные бульбарные нарушения, отсутствие контроля функции тазовых органов, другие значительно выраженные нарушения функций организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС
	Наследственная и идиопатическая невропатия Наследственная моторная и сенсорная невропатия	G60 G60.0		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкий парез нижних конечностей без нарушения опоры и передвижения (снижение мышечной силы до 4 баллов)

			вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 250 - 299	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 250 - 299	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов); изменение походки ("степаж"); незначительная деформация стоп
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной; вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 250 - 299	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов), деформация стоп, нарушающая опору и передвижение, нарушение координации движений
и -мышечного а и мышц		G70 - G73		
	Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса	G70		
			Нарушения языковых и речевых,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: локальные формы заболевания

			сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 440 - 449	(глазная), медленно текущие, с незначительными нарушениями функций организма. Генерализованная и бульбарная формы с незначительными нарушениями функций организма: полная компенсация при лечении антихолинэстеразными препаратами (далее - АХЭП) или АХЭП в сочетании с глюкокортикоидами или незначительная мышечная слабость и патологическая утомляемость, проявляющаяся только при многократных повторных движениях или длительном статическом напряжении отдельных групп мышц туловища, конечностей, окулярных и краниобульбарных мышц. Положительный результат тимэктомии, позволяющий контролировать заболевание, регресс симптомов
			Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 440 - 449	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: локальные формы заболевания (глоточно-лицевая) с умеренными бульбарными нарушениями, приводящими к умеренным нарушениям функций организма. Медленно текущая генерализованная форма без нарушения дыхания и сердечной деятельности при наличии умеренных статодинамических нарушений (относительная компенсация АХЭП). Умеренно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, краниобульбарных мышц на фоне базисной терапии с колебаниями и нарастанием симптомов в течение суток, усиливающаяся при физической нагрузке, с учетом удовлетворительного эффекта тимэктомии, приводящие к умеренным нарушениям функций организма

			Нарушения языковых, речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: глоточно-лицевая локальная форма с выраженными бульбарными нарушениями, приводящими к выраженным нарушениям функций организма. Генерализованная форма миастении с выраженными бульбарными расстройствами и миастеническими кризами; малоэффективная тимэктомия; относительная компенсация на фоне приема АХЭП Выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, краниобульбарных мышц на фоне недостаточно эффективной базисной терапии, тимомтимэктомии и лучевой терапии (при злокачественной тимоме), приводящие к выраженным нарушениям функций организма
			Нарушения языковых, речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 440 - 449; В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: генерализованная миастения со злокачественным или быстро прогрессирующим течением при неэффективности терапии, со значительно выраженными бульбарными нарушениями, приводящими к значительно выраженным нарушениям функций органов и систем организма. Значительно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища, конечностей, дыхательных и (или) краниобульбарных мышц (генерализованная форма), быстропрогрессирующее течение при неэффективной терапии, приводящие к значительно выраженному нарушению функций организма, что требует постоянного применения интубации трахеи с ИВЛ или без нее, использование зондового питания и необходимость в постоянной посторонней помощи и уходе

	Первичные поражения мышц	G71		
			Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: снижение мышечной силы верхних и (или) нижних конечностей до 4 баллов с сохранением активных движений в суставах в полном объеме. Незначительные нарушения функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: снижение мышечной силы верхних и (или) нижних конечностей до 3 баллов с умеренным ограничением амплитуды активных движений в суставах, гипотрофией мышц плечевого и тазового пояса. Умеренные нарушения функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: снижение мышечной силы верхних и (или) нижних конечностей до 2 баллов с выраженным ограничением амплитуды активных движений в суставах; выраженная гипотрофия мышц плечевого и тазового пояса. Выраженные нарушения функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: снижение мышечной силы до 1 балла в верхних и (или) нижних конечностях, с невозможностью самостоятельного передвижения.

			связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 410 - 429	Значительно выраженные нарушения функций организма
	Церебральный паралич	G80	Количественная оценка степени выраженности стойких на церебральном параличе (ДЦП) зависит от клинической фо выраженности двигательных нарушений (с использование больших моторных функций (Gross Motor Function Classifi возрасте 0 - 17 лет и Международной системы классифика (Manual Ability Classification System; MACS) (далее - MAC сочетания и степени выраженности нарушений психическ умственная отсталость различных степеней), псевдобульба нарушений языковых и речевых функций (дизартрия, дисг сенсорных функций, функций мочевыделительной системы функции тазовых органов)	
	Церебральный паралич со спастической тетраплегией Церебральный паралич со спастической диплегией Церебральный паралич со спастической гемиплегией Дискинетический церебральный паралич Атаксический церебральный паралич	G80.0 G80.1 G80.2 G80.3 G80.4		
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: 1-й или 2-й уровень функциональной активности по GMFCS и (или) MACS
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: 3-й уровень функциональной активности по GMFCS и (или) MACS. Умеренные нарушения психических,

			скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	языковых и речевых функций
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: 4-й уровень функциональной активности по шкале GMFCS и (или) MACS. Выраженные нарушения психических, языковых и речевых функций. Нарушение контроля функции тазовых органов
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: 5-й уровень функциональной активности по GMFCS и (или) MACS. Значительно выраженные нарушения психических, языковых и речевых функций. Значительно выраженные двигательные нарушения: выраженный или значительно выраженный тетрапарез, нижний спастический парапарез, значительно выраженный гемипарез или гемиплегия (мышечная сила 1 балл), нижняя параплегия (мышечная сила 0 баллов) с множественными комбинированными контрактурами суставов конечностей; фиксированным порочным положением стоп и (или) кистей;

				нарушение координации движений и равновесия, значительно затрудняющих вертикализацию, опору и передвижение, либо отсутствие произвольных движений в конечностях, туловище, фиксированное патологическое положение тела (в положении лежа), с незначительными нецеленаправленными движениями (поворот набок с помощью). Значительно выраженный спастико-гиперкинетический синдром: выраженный или значительно выраженный спастический тетрапарез, значительно выраженные асимметричные спастико-гиперкинетические парезы значительно выраженные комбинированные контрактуры в суставах конечностей; движения в суставах практически отсутствуют (в большей степени вследствие гиперкинезов), значительно выраженный атетоз и (или) двойной атетоз и (или) торсионная дистония с невозможностью вертикализации, опоры и передвижения. Значительно выраженная туловищная (статическая) атаксия, значительно выраженная динамическая атаксия, значительно выраженная мышечная гипотония, препятствующая точным движениям, схвату и удержанию предметов, формированию вертикальной позы и произвольных движений. Значительно выраженный псевдобульбарный синдром. Отсутствие устной и письменной речи. Значительно выраженные нарушения психических функций: 0 - 3 года: значительно выраженное нарушение психомоторного, речевого развития. Отсутствие возрастных и социальных навыков. 4 - 17 лет: значительно выраженное когнитивное снижение и (или)

				снижение интеллекта до уровня тяжелой или глубокой умственной отсталости (IQ < 34 баллов). Отсутствие контроля функции тазовых органов
		H00 - H59 T90.4 Q10 - Q17	Количественная оценка степени выраженности стойких на придаточного аппарата, обусловленных заболеваниями, по определяется с учетом возрастной оценки состояния основ в условных единицах (ед.) и поле зрения в градусах (°). Ст органа зрения, ответственных за зрительное восприятие, о функций лучше видящего (или единственного) глаза в усл переносимой) коррекции. При поражении обоих глаз необ каждого глаза отдельно. Кроме того, учитываются основные факторы патологическ степень нарушения зрительных функций: форма и стадия т который наступил зрительный дефект и степень адаптиров системность патологического процесса, результаты электр методов обследования, оптимальная (максимально перено лучше видящего глаза. В возрасте от 0 до 3 лет (3 г. 11 мес. включительно), а у не основных зрительных функций количественно (острота зр значительные трудности, связанные с особенностями зрит возможностью наличия нарушений психических функций таких детей можно получить не ранее 10 - 12 лет, в связи с оценку состояния зрительных функций, основанную на сл и содружественной реакции зрачка на свет, отсутствие усл приближение к глазу яркого предмета, наличие (отсутстви свету, отсутствие фиксации взора, слежения за движением определяемые нарушения структуры тканей глазного ябло преломляющих сред глаза, грубые пролиферативные изме очаговые изменения в центральных зонах сетчатки, призна сетчатки, а также изменение формы, размера и цвета диска оценка нарушенных сенсорных функций у детей до 3 лет п отсутствия предметного зрения. В возрасте 4 лет и старше количественное определение ос поле зрения, зрительная работоспособность) осуществляет экспертной офтальмологической практике. При необходим используются данные нистагмометрических, электрофизио ультразвуковых методов исследований, а также оптическо Гейдельбергской томографии	
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 0 - 3 года: наличие предметного зрения
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: B 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией более 0,3.

				Любая степень концентрического сужения полей зрения лучше видящего (единственного) глаза до 40° при отсутствии скотом
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 0 - 3 года: отсутствие предметного зрения
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией более 0,1 до 0,3 включительно. Концентрическое сужение поля зрения лучше видящего (единственного) глаза от 39° до 20° включительно. Центральные абсолютные скотомы лучше видящего (единственного) глаза, 5° и менее
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией 0,1 - 0,05 включительно. Концентрическое сужение полей зрения лучше видящего (единственного глаза) от 19° до 10° включительно. Центральные абсолютные скотомы лучше видящего (единственного) глаза менее 10 градусов, но более 5°
			Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения)	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией от 0,04 до 0 включительно. Концентрическое сужение полей зрения лучше видящего (единственного) глаза от 9° до 0° включительно. Центральные абсолютные скотомы лучше видящего (единственного) глаза 10° и более
		H60 - H95	Количественная оценка степени выраженности стойких на отростка, обусловленных заболеваниями, последствиями т преимущественно на оценке характера и степени выражен тугоухости), лучше слышащего (единственного) уха по ме Учитываются также и другие факторы патологического пр заболевания, возрастной период в котором наступил слухо	

			вид и особенности осложнений, сочетание с нарушением р факторы прогноза и прочее. При объективизации степени данные электрофизиологических и других специальных ме импедансометрия, тональная подпороговая аудиометрия, с коротколатентные слуховые вызванные потенциалы). У де нарушений сенсорных функций производится по результат аудиологического исследования: акустическая импедансом коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВ потенциалов (слуховой ответ на постоянный модулирован инструментальный тест, используемый у детей для объект (Auditory Steady State Response; ASSR-тест). При наличии в структуре тугоухости нарушений языковых оценка которых превышает количественную оценку степен проводится по ведущему речевому дефекту (см. подпункт оценки)	
и наружного уха и среднего уха и идного отростка		H60 - H62 H65 - H75 H80 - H83		
и внутреннего уха е болезни уха		H90 - H95		
			Нарушения сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: односторонняя тугоухость I - IV степени без речевых нарушений либо с незначительными нарушениями языковых и речевых функций
			Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: двусторонняя тугоухость I (26 - 40 дБ) и II степени (41 - 55 дБ) без речевых нарушений либо с незначительными нарушениями языковых и речевых функций. Двусторонняя тугоухость II степени (41 - 55 дБ) при наличии стойких незначительных нарушений языковых и речевых функций и (или) психических функций
			Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: двусторонняя тугоухость II степени (41 - 55 дБ) при наличии стойких умеренных нарушений языковых и речевых функций. Двусторонняя тугоухость III степени (56 - 70 дБ) при отсутствии или наличии стойких нарушений

				языковых и речевых и (или) психических функций (незначительных, умеренных)
			Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: двусторонняя тугоухость IV степени (71 - 90 дБ), в том числе после односторонней или двухсторонней кохлеарной имплантации. Наличие стойких незначительных или умеренных нарушений языковых и речевых функций и (или) психических функций
			Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: двусторонняя глухота (более 91 дБ), в том числе после односторонней или двухсторонней кохлеарной имплантации. Наличие стойких незначительных или умеренных нарушений языковых и речевых функций и (или) психических функций
			Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха); B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сочетание тугоухости III - IV степени (на одно ухо) и глухоты (на другое). Наличие стойких незначительных или умеренных нарушений языковых и речевых функций и (или) психических функций
			Слепоглухота	
			Нарушение сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 210 - 249 (слуха и зрения), B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: двусторонняя тугоухость III степени с высокой степенью слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией 0,1 - 0,05); наличие незначительных, умеренных или выраженных нарушений языковых и речевых и (или) психических функций
			Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха); B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: полная (тотальная) или практическая слепоглухота. Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III - IV степени односторонней или двусторонней; наличие нарушений языковых и речевых и (или)

				психических функций различной степени выраженности
			Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: высокая степень слабовидения (острота зрения (лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией в пределах 0,1 - 0,05) в сочетании с односторонней или двусторонней тугоухостью III - IV степени; наличие нарушений языковых и речевых и (или) психических функций различной степени выраженности
			Глухонемота	
			Нарушение сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: глухонемота при отсутствии или незначительных нарушениях психических функций
			Нарушения психических, сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: глухонемота с умеренными или выраженными нарушениями психических функций
			Нарушения психических, сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 230 - 249 (слуха), B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: глухонемота со значительно выраженными нарушениями психических функций
			Слепоглухонемота	
			Нарушения психических, сенсорных функций, нарушение языковых и речевых функций; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 249 (слуха и зрения), B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: врожденная либо приобретенная полная утрата зрения и слуха, немота; наличие нарушений психических функций различной степени выраженности
		I00 - I99	Количественная оценка степени выраженности стойких на системы организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловл кровообращения и патологией с поражением преимуществ основывается на оценке степени выраженности следующи недостаточность кровообращения, гипертонический синдр нарушения сердечного ритма, кардиогенные синкопальны	

			факторы патологического процесса: форма и тяжесть тече активности, частота и тяжесть обострений, распространен наличие осложнений.	
	Эссенциальная (первичная) гипертензия Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и почек Вторичная гипертензия Реноваскулярная гипертензия Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям Другая вторичная гипертензия	I10 I11 I12 I13 I15 I15.0 I15.1 I15.2 I15.8		
			Нарушения функций сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639, B 110 - 199, B 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев, резистентное к гипотензивной терапии. Индекс времени гипертензии по данным суточного мониторирования артериального давления (СМАД) 25 - 50%. Поражение органов-мишеней с незначительным нарушением их функции. Артериальная гипертензия I степени высокого риска (наличие 3 и более дополнительных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и (или) поражения органов-мишеней и (или) наличие сопутствующих состояний)
			Нарушения функций сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, нарушение психических,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев, резистентное к комбинированной гипотензивной терапии. Индекс времени

			сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 610 - 639, B 110 - 199, B 210 - 299	гипертензии по данным СМАД > 50%. Артериальная гипертензия II степени. Поражение органов-мишеней с умеренными нарушениями функций организма
			Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, нарушение психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450, B 610 - 639, B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев резистентное к комбинированной гипотензивной терапии. Индекс времени гипертензии по данным СМАД > 60%. Артериальная гипертензия II степени. Поражение органов-мишеней с выраженными нарушениями функций организма
			Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, нарушение психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450, B 610 - 639, B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев, резистентное к комбинированной гипотензивной терапии. Индекс времени гипертензии по данным СМАД 95 - 100%, среднее АД систолическое 150 - 160 мм рт.ст., АД диастолическое 90 мм рт.ст. Поражение органов-мишеней со значительно выраженными нарушениями функций организма
	Сердечная недостаточность Дилатационная кардимиопатия	I50 I42.0		

	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия Другая гипертрофическая кардиомиопатия Эндокардиальный фиброэластоз Другая рестриктивная кардиомиопатия Последствия травмы внутригрудных органов	I42.1 I42.2 I42.4 I42.5 T91.4		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН I стадия. Функциональный класс (далее - ФК) I, II
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIA стадии, ФК II, III
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIБ стадии, ФК III, IV
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии, ФК IV
ческие ические болезни	Неревматические поражения митрального клапана Неревматические поражения аортального клапана Неревматические поражения трехстворчатого клапана	I05 - I09 I34 I35 I36		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ревматические и неревматические болезни митрального, аортального, трикуспидального клапанов с незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН 0 или I стадии
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ревматические и неревматические болезни митрального, аортального, трикуспидального клапанов с

				умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН IIA стадии.
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ревматические и неревматические болезни митрального, аортального, трикуспидального клапанов с выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН IIБ стадии
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ревматические и неревматические болезни митрального, аортального, трикуспидального клапанов со значительно выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии
	Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов	Z95		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН 0 или I стадии
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIA. Наличие имплантированного ЭКС; наличие сосудистого импланта, периодически требующего замены в связи с ростом ребенка
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIБ стадии. Наличие ЭКС-зависимости при имплантированном ЭКС. Наличие имплантированного кардиовертера-дефибриллятора
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 110 - 199, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии

			410 - 429	
	Наличие трансплантированного сердца Наличие трансплантированных сердца и легкого	Z94.1 Z94.3		
			Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после трансплантации сердца или одновременно сердца и легкого в течение первых 2 лет
после 2х летнего наблюдения)				
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма
			Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 -	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма

			449, В 430 - 439	
	Другие уточненные нарушения проводимости Пароксизмальная тахикардия	I45.8 I47		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные пароксизмальные нарушения сердечного ритма: пароксизмы тахикардии (аритмии) редкие (до 3 - 4 раз в год), кратковременные (минуты, менее часа), непароксизмальные тахикардии (представленность эктопического ритма менее 35% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования). Ритм восстанавливается без лечебных мероприятий, при использовании немедикаментозных приемов или после однократного или двукратного приема антиаритмических препаратов. ХСН О или наличие ХСН I стадии
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные пароксизмальные нарушения сердечного ритма: пароксизмы тахикардии (аритмии), непароксизмальные тахикардии (представленность эктопического ритма 35 - 70% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования); показатель корригированного интервала QT более 470 мс (по данным ЭКГ); кардиогенные синкопальные состояния (частота сердцебиений и длительность пароксизма значения не имеют). Ритм восстанавливается при систематическом (по схеме) использовании антиаритмических препаратов. Наличие ХСН IIA стадии
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные пароксизмальные нарушения сердечного ритма: частые (более 1 раза в месяц) пароксизмы тахикардии (аритмии), непароксизмальные тахикардии (представленность эктопического

				ритма более 70% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования); стабильное увеличение среднего корригированного интервала QT более 490 мс (по данным суточного ЭКГ мониторирования); кардиогенные синкопальные состояния при неэффективности терапии и на фоне наличия кардиовертера-дефибриллятора (частота сердцебиений и длительность пароксизма значения не имеют). Ритм восстанавливается при систематическом (по схеме) использовании медикаментозных антиаритмических препаратов, применении дополнительной симптоматической терапии. Наличие ХСН IIБ стадии, аритмогенная дисфункция миокарда
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные пароксизмальные нарушения сердечного ритма: непрерывно рецидивирующие пароксизмы тахикардии (аритмии), длящиеся от нескольких часов до суток и более; могут возникать без каких-либо провоцирующих факторов; непароксизмальные тахикардии (представленность эктопического ритма за сутки более 80%); рецидивирующие кардиогенные синкопальные состояния. Ритм восстанавливается при систематическом использовании медикаментозных антиаритмических препаратов, электроимпульсной терапии, применении дополнительной симптоматической терапии. Наличие ХСН III стадии, аритмогенная дисфункция миокарда
	Предсердно-желудочковая блокада полная Фибрилляция и трепетание предсердий Другие нарушения сердечного	I44.2 I48 I49		

	ритма			
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: Стойкие незначительные нарушения сердечного ритма: плотность экстрасистолии менее 20% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования; синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений в пределах ниже 15 - 19% от возрастной нормы, превышение должной длительности пауз ритма по возрасту без нарушения глобальной функции сердца; центральная и периферическая гемодинамика не нарушены, или нарушены незначительно (ХСН 0 стадии или I стадии)
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкие умеренные нарушения сердечного ритма: плотность экстрасистолии более 20% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования; синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений ниже 20% от возрастной нормы вследствие синдрома слабости синусового узла или атриовентрикулярной блокады II степени (с минимальной частотой сердечных сокращений менее 40 ударов в минуту); полная атриовентрикулярная блокада с частотой сокращений желудочков менее 50% от возрастной нормы, паузы ритма более 3,0 секунд; умеренные нарушения глобальной функции сердца (аритмогенная дисфункция миокарда), коронарного кровообращения, церебральной гемодинамики; наличие ХСН IIA стадии
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: постоянные выраженные нарушения сердечного ритма: плотность экстрасистолии более 30% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования; синусовая

				брадикардия с частотой сердечных сокращений в пределах ниже 25% от возрастной нормы вследствие синдрома слабости синусового узла или атриовентрикулярной блокады I степени (с минимальной частотой сердечных сокращений менее 40 ударов в минуту); полная атриовентрикулярная блокада с частотой сокращений желудочков менее 50% от возрастной нормы, паузы ритма более 3,0 секунд; выраженные нарушения глобальной функции сердца, коронарного кровообращения, церебральной гемодинамики, в том числе синкопальные (обморочные) состояния: наличие ХСН IIБ стадии
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: постоянные значительно выраженные нарушения сердечного ритма с наличием двух и более форм нарушений, относящихся к категории выраженной степени; фибрилляция и трепетание предсердий, фибрилляция желудочков; полная атриовентрикулярная блокада с частотой сокращений желудочков менее 50% от нормы; паузы ритма более 3,5 секунд; выраженные нарушения глобальной функции сердца, коронарного кровообращения, церебральной гемодинамики, в том числе синкопальные (обморочные) состояния; наличие ХСН III стадии
	Первичная легочная гипертензия Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности	I27.0 I27.8		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: B 410 - 429, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма на фоне эффективной специфической терапии: ФК ЛГ I

			440 - 450	
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: ФК ЛГ II
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: ФК ЛГ III
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: ФК ЛГ IV
		J00 - J99	Количественная оценка степени выраженности стойких на возрасте до 18 лет, обусловленных болезнями органов дых выраженности хронической дыхательной недостаточности (клинические) факторы патологического процесса: форма обострений, распространенность патологического процесс необходимость подавления иммунитета, наличие осложне Степень тяжести ДН оценивается, исходя из газометричес кислорода крови (далее - PaO2) и сатурации крови кислоро 79 - 60 мм.рт.ст., SaO2 - 90 - 94%; ДН II степени - PaO2 59 степени - PaO2 < 55 мм.рт.ст., SaO2 < 85%	
	Хронические болезни нижних дыхательных путей Болезни легкого, вызванные внешними агентами Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей Другие болезни органов дыхания Синдром Вильсона-Микити Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде	J40 - J47 J60 - J70 J80 - J84 J85 - J86 J95 - J99 P27.0 P27.1		

			Нарушение функций дыхательной системы; МКФ: B 440 - 449	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая или среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с редкими обострениями (2 - 3 раза в год), с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии без дыхательной недостаточности (ДН 0 степени) либо с ДН I степени
			Нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: B 440 - 449; B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с обострениями 4 - 6 раз в год, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии при наличии ДН II степени; преходящей или постоянной легочной гипертензии (ХСН 0 стадии или ХСН 1 стадии)
			Нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая и тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с частыми обострениями (более 6 обострений в год) с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии при наличии ДН II, III степени, ХСН IIA стадии
			Нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств с частыми обострениями (обострения более 6 раз в год) либо непрерывно рецидивирующее течение заболевания с бронхиальной обструкцией; наличие осложнений, в том числе от оперативных вмешательств; ДН III степени, ХСН IIБ, III стадии
	Астма	J45		
			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, психических функций, функций системы крови и	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкое течение заболевания на фоне базисной терапии низкими дозами ингаляционных кортикостероидов; контролируемое или частично контролируемое, с редкими (3 и менее раз в год) сезонными

			иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 199, B 430 - 439, B 540 - 559	обострениями и (или) легкими приступами; ДН 0 степени или ДН I степени в межприступном периоде
			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 199, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелое и тяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии средними дозами ингаляционных кортикостероидов), частично контролируемое течение с более частыми (4 - 6 раз в год) обострениями средней или тяжелой степени тяжести; ДН II степени в межприступном периоде
			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 449, B 110 - 199, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелое, неконтролируемое течение на фоне базисной терапии высокими дозами ингаляционных кортикостероидов; с частыми (4 - 6 раз в год) тяжелыми приступами, требующими стационарного лечения, ДН II, ДН III степени в межприступном периоде
	Приобретенное отсутствие легкого (или его части)	Z90.2		
			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие единственного легкого (врожденное, после пульмонэктомии)

			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие единственного легкого (врожденное, после пульмонэктомии) с признаками ДН
	Наличие трансплантированного легкого	Z94.2		

			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 44 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после трансплантации легкого в течение первых 2 лет

о истечении срока 2х летнего наблюдения)

			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма
			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма
			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
	Респираторные нарушения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	J95		

			Нарушение функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 440 - 449, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие функционирующей постоянной трахеостомы, сохранная либо малоразборчивая речь; ДН 0 степени или ДН I степени
			Нарушение функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 440 - 449, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие функционирующей постоянной трахеостомы с выраженными нарушениями языковых и речевых функций, вплоть до потери экспрессивной речи, наличие ДН II степени или ДН III степени и других осложнений
		K00 - K93	Количественная оценка степени выраженности стойких на системы организма, обусловленных заболеваниями, после основывается на оценке формы и тяжести заболевания, акт обострений, распространенности патологического процесс (БЭН), включения органов-мишеней, наличия осложнений инструментальных методов исследования	
и пищевода, ка и щатиперстной		K20 - K31		
	Приобретенное отсутствие части желудка Синдромы оперированного желудка	Z90.3 K91.1		
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие незначительного синдрома оперированного желудка (демпинг-синдром, синдром приводящей петли и прочие синдромы) после резекции желудка в различных модификациях; отсутствие недостаточности питания либо наличие БЭН I степени
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы;	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие умеренного синдрома оперированного желудка (демпинг-синдром, синдром приводящей петли и прочие синдромы) после резекции желудка

			МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	в различных модификациях; наличие БЭН II степени
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие выраженного синдрома оперированного желудка (демпинг-синдром, синдром приводящей петли и прочие синдромы) после субтотальной или тотальной резекции желудка; наличие БЭН III степени
екционнный т и колит		K50 - 52		
	Болезнь Крона (регионарный энтерит) Язвенный колит Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	K50 K51 K52	Количественная оценка нарушений функций пищеварител при неспецифическом язвенном колите и болезни Крона за типа течения и тяжести заболевания, наличия осложнений перианальных), а также от эффективности терапии, ослож	
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: длительная клинико-лабораторная ремиссия (1 год и более) с отсутствием клинических симптомов заболевания и лабораторных признаков воспалительной активности, либо с минимальной активностью процесса хроническое течение заболевания (обострения 1 раз в год и реже) с минимальной активностью процесса (0 - 1 степени) при отсутствии терапии или на фоне проводимой терапии. Отсутствие осложнений заболевания и осложнений от проводимой медикаментозной терапии
			Нарушения функций пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хроническое рецидивирующее течение (обострения 2 - 3 раза в год) и хроническое непрерывное течение заболевания с умеренной активностью процесса, ведущие к умеренным нарушениям функций организма. Наличие кишечных осложнений, внекишечных проявлений заболевания на фоне проводимой базисной терапии

			психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 710 - 799, B 110 - 199	
			Нарушения функций пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 710 - 799, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хроническое рецидивирующее течение (обострения 4 - 5 раз в год) и хроническое непрерывное течение заболевания с высокой активностью процесса, свищевая, стенозирующая формы заболевания, ведущие к выраженным нарушениям функций организма. Наличие осложнений заболевания (любых) и осложнений от проводимой медикаментозной терапии
			Нарушения функций пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 410 - 429, B 430 - 439, B 710 - 799, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогрессирующее течение заболевания с тотальным поражением кишечника, значительно выраженными нарушениями функций организма (мальабсорбция и мальдигестия тяжелой степени, кахексия, последствия массивной резекции кишечника)
е болезни ника		K55 - K64		

и брюшины		K65 - K67		
	Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью	K56.5		
			Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: спаечная болезнь с редкими (1 - 4 раза в год) приступами кишечной непроходимости, купирующимися консервативными методами терапии (в амбулаторных условиях)
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: спаечная болезнь с приступами кишечной непроходимости 5 и более раз в год, купирующимися консервативными методами терапии в условиях стационара или требующие оперативного вмешательства (разделение спаек) не более 1 раза в год)
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: непрерывно рецидивирующее, прогрессирующее течение спаечной болезни, требующее стационарного лечения, не поддающееся консервативной терапии и требующее оперативного вмешательства (разделение спаек, резекция кишки, наложение стомы)
и печени ный гепатит		K70 - K77 B15 - B19	Количественная оценка нарушений функций пищеварител зависит от стадии фиброза печени (по Международной шк печени при вирусном гепатите (Meta-analysis of Histologica - METAVIR), Международной признанной шкале оценки с биохимических показателей крови и перевода полученных шкале FibroTest), стадии цирроза печени (класс по Между предназначенной для определения тяжести циррозов печен предложенной C. Child в 1972 году (далее - Чайлд-Пью), ф гистологической активности, степень цитолиза, холестаза) наличия осложнений (отечно-асцитический, геморрагичес расширенных вен пищевода, желудка, геморроидальных в формирование цирроза-рака и прочие), а также от развити (гепато-пульмонального, гепато-панкреатического, гепато-	
	Хронический вирусный гепатит Токсическое поражение печени Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Фиброз печени	B18 K71 K73 K74.0		
			Нарушение функций	Для детей в возрасте 0 - 17 лет:

			пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	хронический гепатит с незначительными признаками активности и прогрессирования. Отсутствие фиброза либо незначительные признаки фиброза (A1F0 или A1F1 по шкале METAVIR)
			Нарушения функций пищеварительной, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539; B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хронический гепатит с умеренными признаками активности и прогрессирования. Умеренные признаки фиброза (A2F2 по шкале METAVIR)
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хронический гепатит с выраженными признаками активности и прогрессирования. Исход в цирроз, выраженные признаки фиброза (A3F4 - по шкале METAVIR)
	Токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени Склероз печени Врожденные аномалии (пороки развития) желчного пузыря, желчных протоков и печени	K71.7 K74.1 Q44		
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: цирроз печени (A0-1, F4 по шкале METAVIR) компенсированный (класс А по Чайлд-Пью). Умеренные нарушения функций организма

			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет цирроз печени (A1-3, F4 по шкале METAVIR) субкомпенсированный (класс B по Чайлд-Пью) с выраженными нарушениями функций организма
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет Цирроз печени (A1-3, F4 по шкале METAVIR) декомпенсированный (класс C по Чайлд-Пью) со значительно выраженными нарушениями функций организма
	Портальная гипертензия Синдром Бадда-Киари	K76.6 I82.0	Количественная оценка нарушенных функций организма п гипертензии (далее - ПГ) основывается на стадии ПГ, степ расширенных вен пищевода (далее - ВРВП), наличия и час расширенных вен различной локализации, на нарушении ф осложнений (гепатолиенальный синдром, асцит, гидроперк печеночная энцефалопатия и прочие)	
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительное нарушение функций организма при ПГ I степени после оперативного лечения и на фоне стойкой длительной ремиссии (2 - 3 года). Наличие ВРВП 0 - I степени, без кровотечений в анамнезе
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренное нарушение функций организма при ПГ II степени после

			и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439	оперативного лечения и на фоне стойкой длительной ремиссии (2 - 3 года). Наличие ВРВП II степени
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженное нарушение функций организма при ПГ III степени с выраженными проявлениями гиперспленизма; при однократном кровотечении из варикозно расширенных вен (далее - ВРВ) различной локализации. Период послеоперационной компенсации и адаптации после портальной декомпрессии и сочетанных операций
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, психических функций; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 410 - 429, B 430 - 439, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженное нарушение функций организма при ПГ IV стадии со значительно выраженными проявлениями гиперспленизма; при повторяющихся кровотечениях из ВРВ различной локализации; при наличии осложнений. Паллиативное лечение (спленэктомия, гастротомия с перевязкой вен пищеводно-желудочного перехода, оментогепатопексия); неэффективность хирургического лечения
	Наличие трансплантированной печени	Z94.4		
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: состояние после трансплантации печени в течение первых 2 лет

			пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	
о истечении 2х летнего срока)				
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма
			Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма

			Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: B 430 - 439, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 510 - 539, B 610 - 639, B 110 - 199	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
и желчного , желчевыводящих и поджелудочной		K80 - 87		
	Другие хронические панкреатиты	K86.1		
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкое течение заболевания, показатель фекальной эластазы > 200 мкг/г; отсутствие признаков недостаточности питания на фоне заместительной терапии; незначительные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - 100 - 200 мкг\г, незначительные нарушения - уровень компенсации (гликированный гемоглобин HbA1c < 6,5%; гликемия натощак 4 - 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса. Незначительные нарушения SDS от -2,0 до -3,0
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелое течение заболевания, наличие обострений со стационарным лечением (до 3 раз в год включительно); наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (от 100 до 200 мкг/г) на фоне заместительной

				терапии, умеренные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы 60 - 100 мкг\г; умеренные нарушения эндокринной недостаточности (HbA1c < 7,5 - 9% гликемия более 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса. Умеренные нарушения SDS от -3,1 до -3,9
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелое течение заболевания, наличие частых обострений (более 4 раз в год); наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (менее 100 мкг/г) на фоне заместительной терапии; выраженные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - менее 50 мкг\г; выраженные нарушения HbA1c более 9%; гликемия более 9 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса Выраженные нарушения SDS отклонение более чем на -4 отклонения
ние, связанное с ем искусственного тия		Z93		
	Наличие гастростомы Наличие илеостомы Наличие колостомы Наличие другого искусственного отверстия желудочно-кишечного тракта	Z93.1 Z93.2 Z93.3 Z93.4		
			Нарушения функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие неустранимого аномального отверстия (стомы) желудочно-кишечного тракта в рамках паллиативной терапии
		L00 - L99	Количественная оценка степени выраженности стойких на систем основывается преимущественно на оценке распрос процесса, формы и тяжести течения заболевания, активнос обострений. Учитывается также необходимость подавления иммунитет органов и систем организма. К редко рецидивирующим фо случаи обострения не менее 1 раза в течение последних 3 л	

ные нарушения	Хроническая буллезная болезнь у детей Дерматит герпетиформный Субкорнеальный пустулезный дерматит	L10 - L14 L12.2 L13.0 L13.1		
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ограниченные проявления кожного процесса, наличие единичных пузырей на коже и (или) слизистых оболочках, требующие лечения и ухода
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: распространенные высыпания на коже и (или) слизистых оболочках (в том числе внутренних органов), локализованные высыпания на коже активных поверхностей тела (кожа кистей и стоп); требующие лечения и ухода
	Атопический дерматит	L20		
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ограниченный дерматит с площадью поражения до 10% поверхности тела или распространенный дерматит с площадью поражения от 10 до 30%; обострения до 3 раз в год на фоне проводимого лечения
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: распространенный или диффузный дерматит с площадью поражения более 30% поверхности тела; обострения более 3 раз в год; склонность к торпидному непрерывно рецидивирующему течению; резистентность к системному лечению
осквамозные ения		L40 - L45		
	Псориаз	L40		
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: псориаз с площадью поражения до 10% поверхности тела, редко рецидивирующие (до 2 раз в год) формы заболевания
			Нарушения функций кожи и связанных с	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: распространенные формы с

			ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899, B 710 - 799	площадью поражения поверхности кожи более 10%, частые обострения (более 2 раз в год); или непрерывно-рецидивирующее течение при неэффективности проводимого системного лечения; ладонно-подошвенный псориаз при неэффективности проводимого системного лечения
е болезни кожи и жной клетчатки		L80 - L99		
	Локализованная склеродермия (morphea) Линейная склеродермия	L94.0 L94.1		
			Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: поверхностные формы склеродерм без нарушений или с незначительными нарушениями функции кожи и связанных с ней систем
			Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899, B 710 - 799, B 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: глубокие формы склеродермии при вовлечении в процесс кожи и подкожной клетчатки, фасций, мышц, костей с образованием рубцов (вплоть до укорочения конечности и образования контрактур), сопровождающиеся умеренными нарушениями функций организма (в зависимости от локализации)
е врожденные ии (пороки ия)		Q80 - Q89		
	Врожденный ихтиоз Ихтиоз простой Ихтиоз, связанный с Х-хромосомой (Х-сцепленный ихтиоз) Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия	Q80 Q80.0 Q80.1 Q80.2 Q80.3		
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем;	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функции кожи и связанных с ней систем,

			МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	хорошо компенсирующиеся на фоне терапии
			Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899, B 710 - 799, B 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: генерализованные формы кератодермии, включая ладонно-подошвенную локализацию, сопровождающиеся нарушением целостности кожных покровов, резистентные к терапии
	Буллезный эпидермолиз	Q81		
			Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ограниченные формы
			Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной системы; МКФ: B 810 - 849, B 850 - 899, B 710 - 799, B 210 - 299, 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: поражения кожи (в том числе активных поверхностей - кистей, стоп), слизистых оболочек, приводящие к умеренным нарушениям функций организма
			Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, нарушение функций	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: поражения кожи, слизистых оболочек, в том числе внутренних органов приводящие к выраженным нарушениям функций организма

			пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899, В 710 - 799, В 210 - 299, В 510 - 539; В 410 - 429, В 610 - 639	
и придатков кожи		L60 - L75		
	Алопеция тотальная	L63.0		
			Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тотальное облысение с отсутствием бровей и ресниц
		M00 - M99	Количественная оценка степени выраженности стойких на системы и соединительной ткани организма, обусловленны или дефектами, основывается на оценке нарушений функц аппарата. При этом учитывается: нарушение функций суст позвоночника (каждого отдела и в целом), направление ос наличие патологических (порочных) установок, оценка со плечевого поясов. Имеют значение также и другие фактор наличие и частота обострений, распространенность и акти осложнений	
патии нные поражения ительной ткани илопатии		M00 - M25 M30 - 36 M45 - 49		
	Юношеский (ювенильный) артрит Юношеский (ювенильный) артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках Узелковый полиартериит и родственные состояния Другие некротизирующие васкулопатии	M08 M09 M30 M31	Количественная оценка степени выраженности стойких на системы и соединительной ткани организма обусловленны (юношеский артрит), системными поражениями соедините родственные состояния, другими некротизирующими васк волчанкой, дерматополимиозитом, системным склерозом, соединительной ткани), а также анкилозирующим спондил оценке степени выраженности нарушений функций органо выраженности нарушений функции суставов (наличие и ст позвоночника (степень ограничения подвижности позвоно изменений в суставах и позвоночнике, клинико-лаборатор воспалительного процесса, характеристике течения заболе заболевания, частоты, длительности и тяжести обострений стационара, а также на оценке функциональной способнос заболевания и эффективности проводимой медикаментозн постоянную потребность (объем и виды) иммуносупресси	

			нескольких фармакотерапевтических групп), на фоне кото ремиссии заболевания	
	Системная красная волчанка Дерматополимиозит Системный склероз Другие системные поражения соединительной ткани Анкилозирующий спондилит	M32 M33 M34 M35 M45		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие или незначительное нарушение функции суставов и (или) позвоночника; рентгенологическая стадия I, отсутствие прогрессирования заболевания; отсутствие или наличие обострений (не более 1 раза в год), отсутствие или I степень активности воспалительного процесса на фоне терапии; ФК I; отсутствие осложнений заболевания от проводимой медикаментозной терапии (НПВП)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренное нарушение функции суставов и (или) позвоночника (ФК II степени); рентгенологическая стадия II; вариант заболевания с поражением или без поражения глаз (увеит); прогрессирующее течение заболевания: обострения 2 - 4 раза в год, сохраняющаяся активность воспалительного процесса I или II степени на фоне иммуносупрессивной терапии; необходимость коррекции терапии, возможность достижения ремиссии

			эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	только при применении иммуносупрессивной терапии препаратами нескольких (2 и более) фармакотерапевтических групп (за исключением НПВП), в том числе генно-инженерными биологическими препаратами; наличие осложнений заболевания и проводимой медикаментозной терапии
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженное нарушение статодинамической функции, вследствие поражения суставов и (или) позвоночника; рентгенологическая стадия II или III, вариант заболевания с поражением или без поражения глаз (увеит); прогрессирующее течение заболевания; частые длительные обострения (более 4 раз в год), ФК II или III; сохраняющаяся активность воспалительного процесса 2 или 3 степени на фоне иммуносупрессивной терапии; возможность достижения ремиссии только при применении иммуносупрессивной терапии препаратами нескольких (2 и более) фармакотерапевтических групп (за исключением НПВП); в том числе генно-инженерными биологическими препаратами; наличие осложнений заболевания и проводимой медикаментозной терапии
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения статодинамических функций, обусловленные поражением суставов и (или) позвоночника; рентгенологическая стадия III или IV; вариант заболевания с поражением

			пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 510 - 539, B 440 - 469, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	или без поражения глаз (увеит); быстро прогрессирующее течение заболевания; активность воспалительного процесса 3 степени; ФК III или IV; низкая эффективность или резистентность к проводимой иммуносупрессивной терапии препаратами нескольких фармакотерапевтических групп (2 и более, включая генно-инженерные биологические препараты); наличие необратимых осложнений заболевания и проводимой медикаментозной терапии
мирующие атии енные аномалии и развития) очника и костей й клетки		M40 - M43 Q76	Количественная оценка степени выраженности стойких на возрасте до 18 лет, обусловленных деформацией позвоноч клинико-функциональных проявлений заболевания и данн вид деформации и степень ее выраженности, локализация деформации и степень ее мобильности, темп прогрессиров степень ограничения подвижности позвоночника, наличие нарушения функций других органов и систем организма, н вторичного дегенеративно-дистрофического поражения по результаты консервативного лечения, наличие показаний и хирургической коррекции, ее эффективность, осложнения, конструкции, завершенность периода активного роста ребе сочетание сколиоза с другими пороками развития других с (костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и д Также необходимо учитывать наличие факторов неблагопр реабилитационного прогноза: быстрое прогрессирование, н различных видов деформации дуги позвоночника; неэффе хирургической коррекции, дестабилизация металлоконстр	
	Кифоз и лордоз Сколиоз	M40 M41		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: медленно прогрессирующий или стабильный тип течения, низкая степень мобильности сколиотической дуги; инфантильные сколиозы (0 - 6 лет), ювенильный сколиоз (7 - 12 лет): I или II степень сколиоза без ограничения или с незначительным ограничением подвижности

				позвоночника; юношеские сколиозы (13 - 17 лет): I, II, III степень сколиоза с незначительным (умеренным) ограничением подвижности позвоночника; при III степени сколиоза - отсутствие неблагоприятных факторов прогноза. Наличие стабильной металлической конструкции в пределах одного отдела позвоночника
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пищеварительной системы; МКФ: B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: быстро прогрессирующий тип течения сколиоза, средняя или высокая степень мобильности сколиотической дуги; III степень сколиоза с умеренным ограничением подвижности позвоночника при наличии неблагоприятных факторов прогноза; III степень сколиоза с выраженным ограничением подвижности позвоночника. Наличие стабильной металлической протяженной конструкции более 1 отдела с выраженным ограничением подвижности позвоночника. Нестабильность металлоконструкции и другие осложнения оперативного лечения. Сочетание сколиотической деформации со стабильной кифотической деформацией III и выше степеней
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пищеварительной системы;	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: IV степень сколиоза, декомпенсированный, с выраженным нарушением функций организма.

			МКФ: B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539	
	Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости	Q76.3	Количественная оценка степени выраженности стойких на обусловленных врожденным сколиозом, основывается на с проявлений патологии и данных рентгенологического обсл (нарушение сегментации, слияния и формирования позвон аномалий позвонков и их распространенность, величина де деформации грудной клетки, наличие сочетания аномалии ребер и пороками развития других органов и систем, тип т компенсации, эффективность хирургической коррекции и конструкции. Также необходимо учитывать наличие факто реабилитационного прогноза: нарушение сегментации по т первичной деформации более 30°, грудопоясничная локал блокированных позвонков с одной стороны, "кифосколиоз спондилолистеза; наличие кифотического компонента	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; МКФ: B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сколиозы, обусловленные локальным пороком. Угол первичной деформации до 15 - 20°. Отсутствие противопоказаний для оперативного лечения; устранение деформации оперативным путем. Отсутствие осложнений и правильное стабильное расположение металлической конструкции
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; МКФ: B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сколиозы субкомпенсированные, имеющие прогрессирующее течение Угол первичной деформации от 21° до 30°, наличие прогностически неблагоприятных критериев. Недостаточная коррекция деформации после оперативного лечения; большая протяженность металлической конструкции, дестабилизация металлической конструкции, наличие осложнений
			Нарушения нейромышечных,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сколиозы декомпенсированные,

			скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	имеющие прогрессирующее и быстро прогрессирующее течение. Угол первичной деформации более 30°, наличие прогностически неблагоприятных критериев; сколиозы, сочетающиеся с аномалиями развития позвоночного канала и спинного мозга, других органов и систем; неудовлетворительный результат оперативного лечения (рецидив деформации), наличие осложнений с умеренными или выраженными нарушениями функций организма; наличие противопоказаний к оперативному вмешательству
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: неоперабельные деформации с выраженным или значительно выраженным нарушением функций организма
ения плотности		M80 - M85		
	Остеопороз с патологическим переломом Остеопороз без патологического перелома	M80 M81	Количественная оценка степени выраженности стойких на обусловленных проявлениями остеопороза различного ген возникновения патологических переломов, их множествен учетом срока консолидации, исходов. Необходимо приним по величине которого оценивается минеральная плотность возникновения патологических переломов. Учитываются р диагностики, а также результаты лабораторных показателе (содержание ионизированной фракции кальция в крови, со экскреция фосфора и кальция с мочой, экскреция кальция концентрации креатинина в этой же порции мочи)	
			Нарушения нейромышечных,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствуют переломы длинных

			скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559	трубчатых костей. Отсутствуют деформации или имеют место незначительные (менее 7 - 10°) деформации оси конечности или позвоночника, без нарушения или с незначительным нарушением их функций Z-критерий соответствует остеопении или остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена с незначительными отклонениями. Rg-признаки остеопороза отсутствуют
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: патологические переломы длинных трубчатых костей 1 раз в 2 - 3 года с длительным сроком консолидации, деформацией оси конечности более 10°, но менее 20°; вторичная деформация оси позвоночника (сколиоз II и III степени) Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена - умеренные изменения. Выявляются начальные Rg-признаки остеопороза
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: патологические переломы длинных трубчатых костей более 1 раза в год, спонтанные переломы. Длительные сроки консолидации. Выраженная (20 градусов и более) деформация оси конечности, возникновение ложных суставов, вторичная деформация оси позвоночника с умеренным нарушением их функций. Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу (очень высокий риск переломов). Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена - умеренные, выраженные и значительно выраженные изменения
			Нарушения нейромышечных,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: возникновение спонтанного

			скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559	перелома длинных трубчатых костей при незначительных двигательных и физических нагрузках, включая вес собственного тела. Невозможность вертикализации из-за высокого риска возникновения спонтанного перелома
	Другие нарушения плотности и структуры кости Единичная киста кости Аневризмальная костная киста Другие кисты костей	M85 M85.4 M85.5 M85.6	Кисты костей (солитарные кисты длинных трубчатых кост таза и телах позвонков) могут быть причиной патологичес развития неврологических осложнений (невропатия, радик степени выраженности стойких нарушений функций орган размеров кисты, характера патологического перелома, нал неврологических осложнений, эффективности проведенно конечности, степень выраженности контрактуры сустава, д рецидивов кист	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: весь период лечения при отсутствии осложнений; после завершения лечения - при расположении кисты вне зоны роста, правильном срастании перелома без деформации или с незначительной деформацией оси (плеча, бедра), отсутствии или незначительном ограничении объема движений в смежном суставе, отсутствии рецидивов заболевания после реконструктивной хирургической коррекции
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: укорочение конечности (при локализации кисты в зоне роста), требующее повторных оперативных вмешательств с целью ее удлинения (по мере роста ребенка). Выраженная деформация оси (плеча, бедра, конечности в целом), требующая оперативной коррекции, наличие неврологических осложнений с умеренным ограничением объема движения в суставах. Рецидив заболевания после проведенного оперативного лечения, требующий повторного оперативного вмешательства

е остеопатии		M86 - 90		
	Другой хронический остеомиелит Другие хронические гематогенные остеомиелиты Остеомиелит неуточненный	M86.6 M86.5 M86.9	Количественная оценка стойких нарушений функций орга остеомиелите зависит от распространенности, локализаци и длительности обострений, степени активности процесса, рентгенологические и лабораторные данные, состояния ок осложнений (нарушение роста кости, укорочение конечно контрактуры и анкилозы крупных суставов, патологически необходимости повторного оперативного лечения и его эф других органов и систем вследствие хронической интокси	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799; B 430 - 439; B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: редкие (1 раз в год и реже) непродолжительные (менее 3 недель) обострения
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799; B 430 - 439; B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: обострения свищевой формы остеомиелита средней частоты (до 2 раз в год), средней продолжительности (не менее 4 недель)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: рецидивирующий остеомиелит: обострения частые (3 - 4 раза в год), длительные (более 4 недель), формирование умеренных или выраженных контрактур в смежных суставах. Наличие осложнений (ложные суставы, патологические вывихи)

			систем, нарушение мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799; B 410 - 429, B 440 - 449, B 510 - 539, B 610 - 639; B 810 - 899	
опатии		M91 - 94		
	Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Легга-Кальве-Пертеса)	M91.1		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: IV или V стадии болезни Пертеса (стадия репарации, стадия исхода) с сохранением анатомических соотношений в тазобедренном суставе, восстановлением функции сустава, или с формированием легкой контрактуры в суставе
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: IV стадия (репарация): при необходимости соблюдения ортопедического режима с дозированной нагрузкой с дополнительной опорой. V стадия (исход): осложненная формированием выраженной контрактуры в тазобедренном суставе (с одной стороны), подвывиха бедра (с одной стороны) с выраженной гипотрофией мышц бедра и ягодичных мышц, с укорочением конечности (более 4 см)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: I и II стадия (некроз и импрессионный перелом), III стадия (фрагментации) на весь период полной иммобилизации
		N 00 - N 99	Количественная оценка степени выраженности стойких на обусловленных болезнями мочеполовой системы, основыв выраженности нарушения функции почек в соответствии с	

			также и другие факторы патологического процесса, форма активность процесса, наличие и частота обострений, распр включение органов-мишеней, необходимость подавления (вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь и прочие (за исключением болезней, указанных в подпунктах 14.3 и оценки) незначительная степень нарушения мочевыделите характеризуется отсутствием хронической болезни почек, стадии и ХБП 2 стадии); умеренная степень - наличием ХБ значительно выраженная степень нарушения мочевыделит хронической болезнью почек 4 и 5 стадий соответственно. лежит уровень скорости клубочковой фильтрации (далее - возрастов	
рулярные болезни интерстициальные и почек ная аточность		N 00 - N 08 N 10 - N 16 N 17 - N 19		
			Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на 10 - 20%; дети старше 1 года: ХБП 1 стадии, СКФ более 90 мл/мин/1,73 м2; ХБП 2 стадии, СКФ в пределах 89 - 60 мл/мин/1,73 м2
			Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439, B 540 - 559	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на 30%; дети старше 1 года: ХБП 3А стадии, СКФ 59 - 45 мл/мин/1,73 м2; ХБП 3Б стадии, СКФ 44 - 30 мл/мин/1,73 м2. Любая стадия ХБП при заболеваниях с частыми обострениями или при латентном течении заболевания с высокой степенью активности патологического процесса; нуждаемость в препаратах, подавляющих иммунитет; неэффективность лечения; при наличии осложнений
			Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на 40%; дети старше 1 года:

			иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439, B 540 - 559	ХБП 4 стадии, СКФ 29 - 15 мл/мин/1,73 м2
			Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 430 - 439, B 540 - 559	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на более 50%; дети старше 1 года: ХБП 5 стадии, СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м2
	Помощь, включающая диализ Подготовительные процедуры для проведения диализа Экстракорпоральный диализ Другой вид диализа	Z49 Z49.0 Z49.1 Z49.2		
			Нарушения мочевыделительной функции, статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639; B 710 - 789, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на более 40%; дети старше 1 года: СКФ 29 - 15 мл/мин/1,73 м2
			Нарушения мочевыделительной функции, статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы	Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы более 50%; дети старше 1 года: СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м2

			крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639; B 710 - 789, B 110 - 139, B 140 - 189, B 198, B 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	
аменная болезнь е болезни почки и чника	Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия Хронический обструктивный пиелонефрит Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный	N 13 N 11.1 N 11.8 N 11.9 N 20 - N 23 N 25 - N 29		
			Нарушения мочевыделительной функции, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: обструктивный уретерогидронефроз с обострением хронического пиелонефрита до 2 раз в год и реже, без нарушения функции почек либо с развитием ХБП 1 стадии или 2 стадии
			Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639; B 110 - 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: обструктивный уретерогидронефроз с обострением хронического пиелонефрита от 2 до 4 раз в год; развитие ХБП 3 стадии

			540 - 559	
			Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639; B 110 - 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: обструктивный уретерогидронефроз с обострением хронического пиелонефрита более 4 раз в год; развитие ХБП 4 стадии
	Приобретенное отсутствие почки Агенезия и другие редукционные дефекты почки	Z90.5 Q60		
			Нарушения мочевыделительной функции, функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: единственная почка, ХБП 1 стадии или 2 стадии
			Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639; B 110 - 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: единственная почка, ХБП 3 стадии
			Нарушения мочевыделительной функции,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: единственная почка; ХБП 4 стадии

			психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 110 - 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	
			Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 110 - 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хронический пиелонефрит единственной почки, ХБП 5 стадии
	Наличие трансплантированной почки	Z94.0		

			Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 710 - 799, B 110 - 199, B 410 - 429, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: состояние после трансплантации почки в течение первых 2 лет

			430 - 439, В 540 - 559	
о истечении 2х летнего срока)				
			Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 710 - 799, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма
			Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 710 - 799, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма
			Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма

			метаболизма; МКФ: B 610 - 639, B 710 - 799, B 110 - 199, B 410 - 429, B 430 - 439, B 540 - 559	
	Обтурация шейки мочевого пузыря Стриктура уретры Уретральный свищ Послеоперационная стриктура уретры Поликистоз почки аутосомно-рецессивный Врожденный гидронефроз Атрезия и стеноз мочеточника Врожденное расширение мочеточника (врожденный мегауретер) Врожденный пузырно-мочеточнико-почечный рефлюкс	N 32.0 N 35 N 36.0 N 99.1 Q61.1 Q62.0 Q62.1 Q62.2 Q62.7		
			Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после окончания оперативного лечения при наличии незначительного нарушения мочевыделительной функции: обострения вторичного пиелонефрита до 2 раз в год; отсутствие нарушений функции почек, ХБП 1 стадии или 2 стадии
			Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: на весь период проведения многоэтапного оперативного лечения, сопровождающегося наличием искусственных отверстий мочевого тракта; после окончания оперативного лечения при наличии умеренного нарушения мочевыделительной функции: обострения вторичного пиелонефрита от 2 до 4 раз в год, латентное течение пиелонефрита; ХБП 3 стадии
			Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: на весь период проведения многоэтапного оперативного лечения, сопровождающегося наличием мочевых свищей;

				длительной и (или) постоянной катетеризацией мочевого пузыря. После окончания оперативного лечения при наличии выраженного нарушения мочевыделительной функции: обострения вторичного пиелонефрита более 4 раз в год; ХБП 4 стадии
	Наличие цистостомы Наличие искусственных отверстий мочевого тракта	Z93.5 Z93.6		
			Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие неустранимого аномального отверстия (стомы) мочевого тракта в рамках паллиативной терапии
		Q00 - Q99	Количественная оценка нарушения функций организма ре аномалиях (пороках), деформациях и хромосомных болезн течения, степени нарушенных функций органов и систем о терапии, резистентности к ней, а также от прогноза врожде	
енные аномалии и развития) й системы		Q00 - Q07	Количественная оценка степени выраженности стойких на возрасте до 18 лет при врожденных аномалиях нервной си содержимого и локализации грыжевого мешка, размера ст или спинного мозга (по результатам компьютерной томогр проявлений порока или аномалии: выраженности двигател неврологического дефицита, когнитивного и интеллектуал пароксизмов и их вида, частоты, тяжести, резистентности Учитывается также клинический прогноз возможность хир эффективность, наличие осложнений, сочетание с порокам организма (зрения, слуха, опорно-двигательной, сердечно- нарушений психических, речевых и языковых, сенсорных, организма	
	Анэнцефалия и подобные пороки развития	Q00		
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, дыхательной,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ацефалия и гемицефалия со снижением интеллекта менее 34 баллов, значительно выраженными статодинамическими нарушениями (тетра-; геми-, парапарезы); значительно выраженными, резистентными к терапии пароксизмальными расстройствами; значительно выраженными псевдобульбарными и бульбарными

			пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639	нарушениями, отсутствием контроля функции тазовых органов
	Энцефалоцеле	Q01		
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 310 - 399, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: менингоцеле небольших размеров (дефект костей черепа не более 2 х 2 см) и средних размеров (более 2 х 2, но менее 3 х 3 см) после радикальной оперативной коррекции без осложнений при отсутствии или незначительных нарушениях функций организма: 0 - 3 года: развитие по возрасту или незначительное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; дети старше 3 лет: незначительные когнитивные нарушения; незначительное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов); редкие пароксизмальные расстройства; незначительные нарушения устной и (или) письменной речи; незначительные нарушения статодинамических и сенсорных функций (зрения и (или) слуха)
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, дыхательной систем,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: менингоцеле больших размеров (дефект костей черепа 3 х 3 см и более) после радикальной оперативной коррекции при наличии умеренных нарушений функций организма: 0 - 3 года: умеренное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; дети старше 3 лет: умеренные

			нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 540 - 550, B 610 - 639	когнитивные нарушения, умеренное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); умеренные пароксизмальные расстройства; умеренный псевдобульбарный синдром; умеренные нарушения устной и (или) письменной речи; двигательные нарушения (умеренные тетра, геми-, парапарезы); нарушения сенсорных функций и иные нарушения
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, дыхательной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 540 - 550, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: энцефаломенингоцеле после частичной оперативной коррекции при наличии осложнений, выраженных нарушений функций организма: 0 - 3 года: выраженное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; дети старше 3 лет: выраженные когнитивные нарушения; выраженное снижение интеллекта; (3 - 17 лет: IQ = 35 - 49 баллов); выраженные пароксизмальные расстройства, резистентные к терапии; выраженный псевдобульбарный синдром, выраженные нарушения устной и (или) письменной речи; нарушение контроля функции тазовых органов
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, дыхательной системы, нарушения мочевыделительной	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: энцефалоцистоменингоцеле больших размеров, не подлежащая радикальной оперативной коррекции; значительно выраженные нарушения функций организма: 0 - 3 года: значительно выраженное отставание в физическом, психомоторном и речевом развитии; отсутствие формирования социальных навыков; дети старше 3 лет: значительно выраженное снижение интеллекта (IQ = 34 балла для всех возрастов),

			функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539; B 540 - 550, B 610 - 639	значительно выраженный псевдобульбарный синдром; значительно выраженные речевые нарушения (возможно примитивное общение при помощи звуков, жестов либо устная речь отсутствует), значительно выраженные двигательные нарушения (тетра-, геми-, парапарезы или плегии в сочетании с гиперкинезами и атаксией), синдромы эпилептических энцефалопатий (синдромы Веста, Айкарди, Отахара, Леннокса-Гасто и прочие), резистентные к противосудорожной терапии, нарушения сенсорных функций и иные нарушения. Отсутствие контроля функции тазовых органов
	Микроцефалия Другие врожденные аномалии (пороки развития) мозга	Q02 Q04		
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: Незначительные нарушения функций организма: 0 - 3 года: незначительное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, в темпах формирования социальных навыков; дети старше 3 лет: незначительное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов); наличие незначительных когнитивных нарушений, нарушений устной и (или) письменной речи, редких пароксизмальных расстройств, незначительных нарушений сенсорных функций (зрения и (или) слуха)
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма: 0 - 3 года: умеренное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, в формировании социальных навыков;

			движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	дети старше 3 лет: умеренные когнитивные нарушения; умеренное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); умеренные нарушения устной и (или) письменной речи; пароксизмальные расстройства средней частоты; умеренные нарушения сенсорных функций
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма: 0 - 3 года: выраженное отставание физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; дети старше 3 лет: выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); выраженные когнитивные нарушения; выраженные нарушения устной и (или) письменной речи; частые пароксизмальные расстройства; выраженные нарушения сенсорных функций; нарушение контроля функции тазовых органов
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма: 0 - 3 года: значительно выраженное отставание физического, психомоторного, речевого развития; отсутствие формирования социальных навыков; дети старше 3 лет: значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов); значительно выраженные речевые нарушения (возможно примитивное общение при помощи звуков, жестов либо устная речь отсутствует), синдромы эпилептических энцефалопатий (синдромы Веста, Айкарди, Отахара, Леннокса-Гасто и прочие синдромы); резистентные к

				противосудорожной терапии, нарушения сенсорных функций. Отсутствие контроля функции тазовых органов
	Врожденная гидроцефалия	Q03		
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: удовлетворительные результаты проведения радикальной эндоскопической коррекции гидроцефалии (компенсация или субкомпенсация); компенсированная гидроцефалия в период динамического наблюдения без необходимости оперативного лечения (отсутствие ликвородинамических нарушений). Отсутствие нарушений или незначительные нарушения функций организма: 0 - 3 года: незначительное отставание физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; дети старше 3 лет: незначительное снижение когнитивных процессов, незначительное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов), незначительные нарушения устной и (или) письменной речи; незначительные нарушения сенсорных и статодинамических функций
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогрессирующий рост окружности головы несмотря на проводимое консервативное лечение; неэффективность эндоскопической коррекции гидроцефалии; установка имплантируемой клапанно-дренажной системы (шунтозависимая гидроцефалия) с наличием умеренного гипертензионно-гидроцефального синдрома с ликвородинамическими кризами средней частоты; с умеренными нарушениями функций организма:

				0 - 3 года: умеренное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; дети старше 3 лет: умеренное снижение когнитивных процессов, умеренное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); умеренные нарушения устной и (или) письменной речи; двигательные нарушения (легкий тетрапарез, умеренные геми-, парапарезы, умеренная динамическая атаксия), нарушения сенсорных функций
			Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогрессирующий рост окружности головы в динамике; нарастание неврологической симптоматики (активная гидроцефалия); неэффективность оперативного лечения, дисфункция шунта после вентрикулоперитонеального шунтирования (1 раз и более в год) с частыми ликвородинамическими кризами; повторное шунтирование. Выраженные нарушения функций организма; 0 - 3 года: выраженное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; дети старше 3 лет: выраженное снижение когнитивных процессов; выраженное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); выраженные нарушения устной и (или) письменной речи; двигательные нарушения (умеренный тетрапарез, выраженные пара-, гемипарезы); частые пароксизмальные расстройства; нарушения сенсорных функций. Нарушение контроля функции тазовых органов
			Нарушения психических,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: высокий темп прогрессирования

			языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 610 - 639	гидроцефалии несмотря на проводимое лечение со значительно выраженными нарушениями функций организма; 0 - 3 года: значительно выраженное отставание физического, психомоторного, речевого развития, отсутствие формирования социальных навыков; дети старше 3 лет: значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов), значительно выраженные речевые нарушения (возможно примитивное общение при помощи звуков, жестов либо устная речь отсутствует); наличие синдромов эпилептических энцефалопатий (синдромы Веста, Айкарди, Отахара, Леннокса-Гасто и прочие синдромы), резистентные к противосудорожной терапии, двигательные нарушения (параличи, парезы до плегии, атаксия); нарушения сенсорных функций (слепота, глухота). Отсутствие контроля функции тазовых органов
	Spina bifida (неполное закрытие позвоночного канала) Гипоплазия и дисплазия спинного мозга	Q05 Q06.1		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: расщепление позвоночника (2 - 3 позвонков) с формированием спинномозговой грыжи без элементов нервной ткани в грыжевом мешке (менингоцеле), с элементами корешков спинного мозга менингорадикулоцеле) с отсутствием или с минимальной неврологической симптоматикой, незначительными нарушениями статодинамических функций; с благоприятным прогнозом при своевременной оперативной коррекции
			Нарушения нейромышечных,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: расщепление позвоночника (3 - 5

			скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 610 - 639	позвонков) с формированием менингорадикулоцеле с умеренной неврологической симптоматикой, умеренными нарушениями статодинамических функций; возможны нарушения сенсорных функций (снижение остроты зрения и (или) слуха оценивается в зависимости от степени выраженности); нарушение контроля функции тазовых органов
			Нарушения психических, языковых и речевых; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 210 - 299, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: расщепление позвоночника на любом протяжении с вовлечением спинного мозга и (или) его элементов (менингомиелоцеле, мелоцистоцеле) с выраженной неврологической симптоматикой, с нарушениями сенсорных функций (снижение остроты зрения и (или) и слуха), с нарушением контроля функции тазовых органов, с формированием различных деформаций нижних конечностей, приводящих к выраженным нарушениям статодинамических функций. Любой вариант спинномозговой грыжи, сочетающийся с пороками развития головного или спинного мозга на другом уровне с выраженными нарушениями функций организма
			Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: B 110 - 199, B 310 - 399, B 710 - 799, B 210 - 299, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: расщепление позвоночника на любом протяжении с вовлечением в порок развития спинного мозга и (или) его элементов (менингомиелоцеле, миелоцистоцеле) со значительно выраженной неврологической симптоматикой (нижняя параплегия, значительно выраженный нижний парапарез), с отсутствием контроля функции тазовых органов, с формированием различных деформаций нижних конечностей, приводящих к значительно

			610 - 639	выраженным нарушениям статодинамических функций. Любой вариант спинномозговой грыжи, сочетающийся с пороками развития головного или спинного мозга на любом уровне со значительно выраженными нарушениями функций организма
енные аномалии и развития) ы кровообращения		Q20 - Q28		
	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечных камер и соединений Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца	Q20 Q21 Q22 Q23 Q24		
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: B 410 - 429	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: пороки сердца и крупных сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока, не приводящие к недостаточности кровообращения или с незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН 0 стадии или I стадии, ФК I; без нарушений либо с незначительными нарушениями сердечного ритма и проводимости, гемодинамически не значимыми
			Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: пороки сердца и крупных сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока с умеренными нарушениями гемодинамики и функций сердечно-сосудистой системы: ХСН IIA стадии, ФК II

			440 - 450, В 610 - 639, В 110 - 199, В 210 - 299	(подтвержденные клинико-лабораторными данными и данными инструментальных методов обследования); умеренные нарушения сердечного ритма и проводимости: желудочковые экстрасистолы (представленность эктопического ритма от 10 до 20% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования) или наджелудочковые экстрасистолы и наджелудочковые тахикардии (представленность эктопического ритма от 20 до 30% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования), атриовентрикулярная или синоатриальная блокада 2 степени, требующие постоянной медикаментозной коррекции. Наличие осложнений (рестеноз, дисфункция клапана, реканализация дефекта, инфекционный эндокардит) после оперативной коррекции порока и (или) наличие отягощающей сопутствующей патологии с умеренными нарушениями функций организма. Необходимость в повторном хирургическом вмешательстве, в том числе с использованием протезных материалов. Сложные пороки на период проведения этапного хирургического лечения или паллиативного лечения
			Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450, В 610 - 639, В 110 - 199, В 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: пороки сердца и крупных сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока с выраженными нарушениями гемодинамики и функций сердечно-сосудистой системы: ХСН IIБ, ФК III, выраженные нарушения сердечного ритма и проводимости - трепетание и мерцание предсердий, частые

				желудочковые экстрасистолы (представленность эктопического ритма более 20% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования) или наджелудочковые экстрасистолы и залпы наджелудочковой тахикардии (представленность эктопического ритма более 30% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторирования) атриовентрикулярная блокада 3 степени; наличие осложнений после оперативной коррекции порока и (или) наличие отягощающей сопутствующей патологии с выраженными нарушениями функций организма. Неудовлетворительный результат оперативного лечения сложных пороков, необходимость повторных оперативных вмешательств, в том числе с использованием протезных материалов
			Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций; МКФ: B 410 - 429, B 440 - 450, B 610 - 639, B 110 - 199, B 210 - 299	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: пороки сердца и крупных сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока со значительно выраженными нарушениями гемодинамики и функций сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии, ФК IV. Наличие осложнений после оперативной коррекции порока и (или) наличие отягощающей сопутствующей патологии со значительно выраженными нарушениями функций организма. Возможность проведения только паллиативных операций при сложных сочетанных пороках; неоперабельные пороки сердца и крупных сосудов
	Врожденные аномалии (пороки развития) крупных артерий Врожденные аномалии (пороки развития) крупных вен Другие врожденные аномалии (пороки развития) системы	Q25 Q26 Q27	Количественная оценка стойких нарушений функций орга ангиодисплазиях проводится с учетом вида порока (мальф венозные, артериовенозные, лимфатические и различные и распространенности аномалии (конечности, легкие, головн степени выраженности хронической недостаточности кров (сегментах) или органе (органах), выраженности трофичес	

	периферических сосудов Другие врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения	Q28	других изменений в пораженных органах, эффективности осложнений, наличия и степени выраженности вторичных аппарата. В зависимости от этого выделяют состояния: компенсации без ее деформации и без трофических нарушений, отсутст гемодинамики, наличие эффективного коллатерального кр (увеличение объема, длины конечности, ее деформация, тр изъязвления, начальные признаки перегрузки правого желу кровообращение малоэффективно); декомпенсация (увели более, длины конечности на 7 - 8 см и более по сравнению конечности, трофические нарушения кожи в виде эрозии, т коллатерального кровотока)	
			Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 410 - 429, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: локальные или распространенные формы ангиодисплазий в фазе компенсации кровообращения (ХАН 0 степени или 1 степени, ХВН 0 степени или 1 степени); 0 - 6 лет: увеличение объема конечности на 1,0 - 1,5 см без ее деформации, увеличение длины конечности на 2,0 - 2,5 см, компенсируемое ортопедической стелькой или коском. 7 - 17 лет: увеличение объема и длины конечности до 4,0 см без ее деформации, компенсируемое ортопедической стелькой или коском. Начальные признаки вторичных изменений в позвоночнике. Незначительное ограничение объема движений в суставах конечности (конечностей)
			Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 -	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: локальные или распространенные формы ангиодисплазий в стадии субкомпенсации кровообращения (ХАН 2 степени, ХВН 2 степени); преимущественная локализация на активных поверхностях конечностей (ладони и стопы); 0 - 6 лет: увеличение объема конечности до 2,0 - 4,0 см, увеличение длины конечности на 3,0 - 4,0 см, компенсируемое сложной ортопедической обувью. 7 - 17 лет: увеличение объема конечности на 5,0 см и более,

			450, B 710 - 799	увеличение длины конечности на 5,0 см и более, компенсируемое сложной ортопедической обувью. Статический сколиоз 2 или 3 степени, умеренное ограничение объема движений в суставах конечности (конечностей), признаки неврологических осложнений (нейропатии), наличие болевого синдрома. Наличие неврологической симптоматики и умеренные нарушения функций организма при локализации соустий в головном или спинном мозге
			Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 450, B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: декомпенсация кровообращения в пораженной конечности (конечностях) со стойким болевым синдромом, с глубокими трофическими нарушениями (длительно незаживающие язвы) кровотечениями различной интенсивности; с тяжелыми деформациями конечности, локализация соустий на открытых частях тела после лечения вторичные изменения в суставах и позвоночнике (контрактуры, сколиозы, дегенеративно-дистрофические изменения), неврологические осложнения (тяжелые нейропатии). Выраженные нарушения функций организма при локализации соустий в головном или спинном мозге, сердце и легких и при различных их сочетаниях
			Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: декомпенсация кровообращения: обширное поражение сосудистой системы, неустранимые тяжелые трофические нарушения, тяжелые осложнения в виде нарушения мозгового кровообращения и кровообращения в спинном мозге с развитием параличей, отсутствием контроля функции тазовых органов

			движением (статодинамических) функций; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 450, B 710 - 799	
енные аномалии и развития) в дыхания		Q30 - Q34		
			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: редкие обострения воспалительных бронхолегочных заболеваний (2 - 3 раза в год, продолжительностью в пределах 3 недель), без дыхательной недостаточности (ДН 0 степени) либо наличие ДН I степени
			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199, B 410 - 429, B 440 - 449, B 430 - 439, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функции дыхательной системы: обострения воспалительных бронхолегочных заболеваний 4 - 6 раз в год, продолжительностью от 3 до 6 недель; необходимость в многоэтапных оперативных коррекциях, осложнения хирургических вмешательств, наличие ДН II степени, преходящей или постоянной легочной гипертензии (ХСН 0 стадии или ХСН I стадии)
			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 110 - 199,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функции дыхательной системы: обострения воспалительных бронхолегочных заболеваний 4 - 6 раз в год, продолжительностью от 3 до 8 недель; наличие осложнений (стенозы, свищи дыхательной системы), приводящие к необходимости дальнейших хирургических вмешательств;

			В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439, В 540 - 559	наличие ДН II степени, ДН III степени, ХСН II А стадии
			Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439, В 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функции дыхательной системы: обострения воспалительных бронхолегочных заболеваний более 6 раз в год, продолжительностью более 8 недель; последствия и осложнения оперативных вмешательств, наличие ДН III степени в сочетании с ХСН II Б стадии или III стадии
лина губы и неба губа и волчья		Q35 - 37	Количественная оценка нарушений функций организма ре челюстно-лицевых аномалиях основывается на оценке тяж возможности использования ортеза и адаптации к нему, дл реконструктивного оперативного лечения (восстановление взаимоотношений структур артикуляционного аппарата на завершении последнего), на оценке нарушений функции п параметров физического развития и их возрастная динами артикуляционной моторики (степень ограничения ее при с артикуляционных движений), на степени выраженности ре (ринолалия, ринофония, дислалия), а также на оценке фун (сенсорные функции, функции носового дыхания). Степень выраженности речевых синдромов (ринолалия, ри письменной речи) оценивается по заключению логопеда м (степень) общего или системного недоразвития речи). При языковых и речевых функций, указанных в подпункте 5.1. оценки	
	Расщелина неба (волчья пасть) Расщелина губы (заячья губа) Расщелина неба и губы (волчья пасть с заячьей губой)	Q35 Q36 Q37		
			Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510 - 539, В 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: расщелина мягкого неба, мягкого и частично (задняя треть) твердого неба, изолированная расщелина верхней губы; расщелина мягкого и твердого неба при использовании ортеза и адаптации к нему; незначительное нарушение функций сосания, глотания, жевания; параметры физического развития соответствуют возрасту или

				незначительно снижены. Незначительные нарушения языковых и речевых функций
			Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 510 - 539, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: полная расщелина твердого и мягкого неба, верхней губы (одно- и двусторонняя) на период реконструктивного оперативного лечения; неудовлетворительный результат оперативного лечения (грубые деформации, послеоперационные изъяны твердого неба, выраженный челюстной дисбаланс), требующие повторных оперативных вмешательств и (или) длительного аппаратного ортодонтического лечения; умеренное нарушение функций сосания, глотания, жевания; умеренное снижение параметров физического развития. Умеренные нарушения языковых и речевых функций
			Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: B 510 - 539, B 310 - 399	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сложные врожденные пороки развития челюстно-лицевой области в сочетании с другими аномалиями развития, с выраженными нарушениями функций организма; нарушение акта жевания с возможностью приема только протертой пищи, выраженное снижение параметров физического развития. Выраженные нарушения языковых и речевых функций
е врожденные ии (пороки ия) органов арения		Q38 - Q45	Количественная оценка степени выраженности нарушений врожденных аномалиях (пороках развития) желудочно-ки локализации порока, объема и характера оперативного леч резекции и прочее) объема и видов мероприятий по реабил частота и эффективность), степени недостаточности анал том числе осложнений оперативного лечения, необходимо операций), рецидива заболевания (рестеноз-компенсирова декомпенсированный), поражения других органов (характ ребенка	
	Атрезия пищевода без свища Атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищом	Q39.0 Q39.1		

	Врожденный стеноз и стриктура пищевода Дивертикул пищевода Другие врожденные аномалии пищевода	Q39.3 Q39.6 Q39.8		
			Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведенного одноэтапного оперативного вмешательства с наложением прямого анастомоза. После завершения всех этапов оперативного лечения при отсутствии затруднений приема пищи или с незначительными нарушениями функций пищеварительной системы. Необходимость планового бужирования (3 и менее раз в год)
			Нарушения функций пищеварительной системы, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: на весь период этапного хирургического реконструктивного лечения. По завершении всех этапов оперативного лечения при наличии умеренных нарушений функций пищеварительной системы: дисфагия с возможностью приема только протертой и жидкой пищи; необходимость планового бужирования (более 3 раз в год). Наличие осложнений, в том числе осложнений оперативного лечения, с умеренными нарушениями функций организма
			Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 440 - 449, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведения первого этапа оперативного лечения (наложение гастростомы) на весь последующий период лечения, включая восстановление анатомической целостности пищевода и его проходимости; после завершения оперативного лечения (пластики пищевода) при наличии выраженных нарушений функций пищеварительной системы. Наличие осложнений, в том числе осложнений оперативного лечения, с выраженными нарушениями

				функций организма. Рестеноз пищевода. Необходимость повторных оперативных вмешательств
	Другие уточненные пороки развития желудка Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз двенадцатиперстной кишки Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз тощей кишки Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз подвздошной кишки Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз других уточненных частей тонкого кишечника	Q40.2 Q41.0 Q41.1 Q41.2 Q41.8		
			Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведенного оперативного вмешательства в случаях небольшой протяженности участка резекции кишечника при физиологических параметрах физического развития или незначительных нарушениях функции пищеварительной системы
			Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведенного оперативного вмешательства при наличии осложнений (синдром короткой кишки) с умеренными нарушениями функции пищеварительной системы
			Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведенного оперативного вмешательства при наличии осложнений (синдром короткой кишки) с выраженными нарушениями функции пищеварительной системы. Необходимость повторных оперативных вмешательств, наличие стомы
	Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки со свищем Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки без свища Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода со	Q42.0 Q42.1 Q42.2	Количественная оценка нарушений функций пищеварител пороках развития прямой кишки и ануса зависит от тяжест оперативного лечения (необходимость наложения стомы, мероприятий по реабилитации (нарушение эвакуаторной ф объективизированного в условиях стационара), степени не (объективизированной в условиях стационара), наличия ос оперативного лечения, необходимость повторных реконстр сопряженных органов (характер, тяжесть), уровня физичес	

	свищем			
			Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведенного реконструктивного оперативного лечения с восстановлением анатомических структур аноректальной области: I степень недостаточности функции запирательного аппарата прямой кишки; Отсутствие осложнений и показаний к повторному оперативному лечению
			Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при сложных пороках - на весь период этапного оперативного лечения и последующей реабилитации. По завершении лечения - при наличии II степени недостаточности функции запирательного аппарата прямой кишки
			Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: с момента диагностики врожденной клоаки на весь период лечения; после завершения лечения - нарушение контроля функции тазовых органов. По завершении этапов оперативного лечения других пороков - при наличии III степени недостаточности функции запирательного аппарата прямой кишки
	Болезнь Гиршпрунга	Q43.1		
			Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения оперативного лечения - восстановление пассажа по толстой кишке; хронический запор: самостоятельный стул на фоне диеты или эффективного консервативного лечения (объективизированного в условиях стационара); I степень недостаточности анального сфинктера (объективизированная в условиях стационара); отсутствие осложнений
			Нарушение функций пищеварительной	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при многоэтапном оперативном лечении

			системы; МКФ: B 510 - 539	(на весь период лечения). После завершения этапного оперативного лечения: отсутствие самостоятельного стула на фоне диетотерапии и консервативного лечения (объективизированное в условиях стационара); II степень недостаточности анального сфинктера (объективизированная в условиях стационара)
			Нарушение функций пищеварительной системы МКФ: B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения хирургического лечения - отсутствие самостоятельного стула, формирование копролитов, признаки хронической интоксикации и анемии (объективизированные в условиях стационара) III степень недостаточности анального сфинктера. Энкопрез. Необходимость повторных оперативных вмешательств
	Врожденные аномалии (пороки развития) желчного пузыря, желчных протоков и печени Другие врожденные аномалии печени	Q44 Q44.7	Количественная оценка нарушений функций организма пр желчных протоков зависит от вида порока (атрезия, гипоп протоков) и степени выраженности, варианта течения забо выраженности симптомов холестаза, механической желту гипертензии, геморрагического синдрома, желудочно-киш степени выраженности необратимых морфологических (ст цирроз), степени нарушений функций других органов и си	
			Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: B 510 - 539, B 410 - 429, B 710 - 799, B 110 - 199, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при прогредиентном течении заболевания с умеренными нарушениями функций организма

			210 - 299, B 610 - 639	
			Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: B 510 - 539, B 410 - 429, B 710 - 799, B 110 - 199, B 210 - 299, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при прогредиентном течении заболевания с выраженными нарушениями функций организма
			Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: B 510 - 539, B 410 - 429, B 710 - 799, B 110 - 199, B 210 - 299, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при прогредиентном течении заболевания со значительно выраженными нарушениями функций организма
енные аномалии и развития) ой системы		Q60 - Q64	Клинико-функциональная характеристика и количественна дефектов почки, кистозной болезни почек, а также врожде лоханки и врожденных аномалий мочеточник, указанных количественной системы оценки	
	Экстрофия мочевого пузыря	Q64.1		
			Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: частичная эписпадия - после проведения оперативного лечения при отсутствии или незначительных нарушениях мочевыделительной функции

			Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: экстрофия мочевого пузыря (с тотальной эписпадией или без нее) после завершения реконструктивного хирургического лечения при умеренных нарушениях мочевыделительной функции
			Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: экстрофия мочевого пузыря (с тотальной эписпадией и без нее) после завершения реконструктивного хирургического лечения с развитием осложнений с выраженными нарушениями мочевыделительной функции
енные аномалии и развития) и мации -мышечной ы		Q65 - Q79		
	Врожденный вывих бедра односторонний Врожденный вывих бедра двусторонний Врожденный подвывих бедра односторонний Врожденный подвывих бедра двухсторонний	Q65.0 Q65.1 Q65.3 Q65.4	Количественная оценка степени выраженности нарушений врожденными аномалиями развития тазобедренного суста (врожденный вывих бедра, врожденный подвывих бедра, д поражение), степени выраженности морфологических и ст результатам УЗИ и Rg-исследования), своевременности ди эффективности лечения, наличия осложнений, возникающ головки бедра), наличия рецидива, состояния компенсатор системы, наличия и характера сопутствующей патологии	
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 3 года: при своевременной диагностике и адекватном лечении: на весь период лечения (при одностороннем вывихе, одно- и двухстороннем подвывихе и дисплазии тазобедренных суставов) и при сохранении достигнутого результата (вправление вывиха или подвывиха); 4 - 17 лет: при эффективном оперативном лечении вывиха бедра (одно- и двухстороннего); полное восстановление опороспособности конечности (конечностей); при сохранной структуре сустава (суставов); отсутствии или незначительном ограничении объема движений в тазобедренном (тазоберденных) суставе (суставах)

			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 3 года: при наличии осложнений на фоне проводимого лечения, рецидив патологии после начала самостоятельной ходьбы; 4 - 17 лет: при поздней диагностике врожденного вывиха бедра на весь период лечения; наличие осложнений на фоне проводимого лечения (кроме аваскулярного некроза головки бедренной кости); наличие вторичных изменений в суставах нижних конечностей, позвоночнике (артроз, остеохондроз, спондилоартроз) с умеренным нарушением их функции; рецидив вывиха. Последствия проведенного оперативного лечения с умеренными нарушениями статодинамических функций
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 4 - 17 лет: при наличии осложнений в виде аваскулярного некроза головки бедренной кости на весь период иммобилизации; При двустороннем вывихе бедра после неэффективного лечения (отсутствие центрации головок бедренных костей в вертлужных впадинах, формирование неоартрозов) с нарушением опороспособности конечностей
	Конско-варусная косолапость Пяточно-варусная косолапость Пяточно-вальгусная косолапость Врожденная плоская стопа (pes planus). Другие врожденные деформации стопы	Q66.0 Q66.1 Q66.4 Q66.5 Q66.8	Количественная оценка степени нарушений функций опор двусторонней врожденной косолапости (эквино-кава-варус уровне голеностопного, подтаранного, Шопарова и Лисфр деформации (типичная и атипичная, изолированная или в с степени выраженности и тяжести деформации. Также оцен стойкость достигнутого эффекта (наличие или отсутствие установок стопы), объем движений в голеностопых суста изменений в костях и суставах стопы голеностопных суста изменения на подошвенной поверхности стоп(пы) в виде г сопутствующая патология	
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с	Для детей в возрасте 0 - 3 года: косолапость легкой и средней степени (одно- и двухсторонняя) на этапе консервативного лечения;

			движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	4 - 17 лет: при условии удовлетворительного результата лечения и при сохранении достигнутого результата по мере роста и развития ребенка
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: неудовлетворительный результат лечения (рецидив и прогрессирование деформации); нуждаемость в повторных реконструктивных операциях. Врожденная двусторонняя плоско-вальгусная стопа тяжелой степени ("стопа-качалка")
	Синдактилия	Q70		
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: неполная простая форма синдактилии II - V пальцев обеих кистей. Полная простая форма синдактилии всех пальцев одной или обеих кистей после завершения реконструктивного оперативного лечения. Другие (сложные) формы синдактилии после завершения реконструктивного оперативного лечения при условии полного восстановления или при незначительном нарушении функции кисти (кистей) (схвата и удержания)
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: полная простая форма синдактилии всех пальцев одной или обеих кистей на весь период реконструктивного оперативного лечения. Другие (сложные) формы синдактилии на весь период реконструктивного оперативного лечения или при нарушениях основных функций кисти (схвата и удержания)
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: другие (сложные) формы синдактилии, в том числе в сочетании с другими пороками развития кисти (кистей) с

			(статодинамических) функций МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	выраженным нарушением функций кисти (схвата и удержания)
	Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность	Q71	Количественная оценка нарушенных функций при врожде конечностей зависит от вида порока (фокомелия - отсутств проксимальных отделов конечностей, вследствие чего кис непосредственно к туловищу; перомелия - отсутствует кон пальца; эктромелия - отсутствие одной конечности, двух в отсутствие дистального отдела конечности при нормально распространенности патологии (изолированный порок раз наследственного синдрома), возможности протезирования ребенка к пороку, а при последующем протезировании - к возраст, в котором выполнено первичное протезирование,	
	Врожденное полное отсутствие верхней (верхних) конечности (конечностей) Врожденное отсутствие плеча и предплечья при наличии кисти Врожденное отсутствие предплечья и кисти	Q71.0 Q71.1 Q71.2		
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии грубой аномалии развития одной конечности или при отсутствии кисти; при наличии культи предплечья, плеча на границе верхней и средней трети, при сохранной функции локтевого и плечевого суставов
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: полное отсутствие одной верхней конечности; короткая культя плеча. Экзартикуляция плечевой кости с резекцией части ключицы и (или) лопатки
	-		Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: полное отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (кистей, предплечий, плеч); полное отсутствие одной и недоразвитие другой верхней конечности с выраженным или значительно выраженным нарушением ее функции

	Врожденное отсутствие кисти и пальца (пальцев)	Q71.3		
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие одного пальца (II, III, IV или V) кисти, в том числе с соответствующей пястной костью. Сочетание двух отсутствующих пальцев (исключая I) при сохранных пястных костях. Отсутствие I пальца одной кисти. Отсутствие дистальных фаланг пальцев кисти: I, II, III, IV, V
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие всех фаланг I пальца обеих кистей. Отсутствие всех фаланг двух пальцев, включая I палец, вместе с пястными костями на одной кисти. Отсутствие всех фаланг трех пальцев, исключая I палец, вместе с пястными костями на одной кисти. Отсутствие всех фаланг трех любых пальцев, включая I палец. Отсутствие всех фаланг четырех пальцев, при наличии анатомически и функционально полноценного I пальца на одной кисти. Отсутствие всех фаланг пяти пальцев на одной руке
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие двух пальцев, включая I палец, вместе с пястными костями на обеих кистях. Отсутствие трех пальцев, исключая I палец, вместе с пястными костями на обеих кистях. Отсутствие всех фаланг четырех пальцев при наличии анатомически и функционально полноценного I пальца на обеих кистях. Отсутствие всех фаланг трех любых пальцев, включая I палец, на обеих кистях на период реконструктивного оперативного лечения. Отсутствие трех любых пальцев, включая I палец, на обеих кистях
			Нарушение нейромышечных,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие всех 10 пальцев

			скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	
	Продольное укорочение лучевой кости Продольное укорочение локтевой кости	Q71.4 Q71.5	Количественная оценка нарушений функций верхней (верх косорукости зависит от варианта косорукости (полное или локтевой кости на одной или двух конечностях), сохранно степени отклонения кисти в лучевую или локтевую сторон величины анатомического укорочения сегмента конечност	
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при одностороннем и двустороннем поражении: лучевая косорукость I степени, I тип кисти; локтевая косорукость I степени; незначительное нарушение функции кисти и суставов верхней конечности
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при одностороннем и двустороннем поражении: лучевая косорукость II степени, II тип кисти; локтевая косорукость II степени; умеренное нарушение функции кисти и суставов верхней конечности. Сочетание косорукости I степени с нормальной кистью на доминантной конечности и лучевой косорукости II степени со II типом кисти или локтевой косорукостью II степени на контрлатеральной конечности. Лучевая косорукость III степени, III тип кисти; локтевая косорукость III степени, выраженное нарушение функции кисти и суставов верхней конечности
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: Двусторонняя лучевая косорукость III степени, III тип кисти; локтевая косорукость III степени, выраженное нарушение функции кистей и суставов верхней конечности

			МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	
	Клешнеобразная кисть Врожденное расщепление стопы	Q71.6 Q72.7		
ция подпунктов соответствует официальному источнику.				
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: Клешнеобразные кисти. Клешнеобразные стопы при отсутствии опороспособности на период ортезирования и приобретения навыков стояния и ходьбы
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сочетание двух клешнеобразных кистей с выраженным нарушением функции схвата и удержания предметов с двумя клешнеобразными стопами с нарушением опороспособности
ты, ивающие нижнюю ость		Q72		
	Врожденное полное отсутствие нижней (нижних) конечности (конечностей) Врожденное отсутствие бедра и голени при наличии стопы Врожденное отсутствие голени и стопы Продольное укорочение бедренной кости Продольное укорочение большеберцовой кости Продольное укорочение малоберцовой кости	Q72.0 Q72.1 Q72.2 Q72.4 Q72.5 Q72.6		
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799	Для детей в возрасте 0 - 5 лет: врожденное укорочение любого сегмента и всей нижней конечности в целом до 3 см (по сравнению со здоровой) при отсутствии других аномалий конечности; 6 - 17 лет: при анатомическом укорочении до 6 см., функциональном - до 4 см.

			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии аномалии развития одной конечности (отсутствие стопы, культя голени на границе верхней и средней трети при сохранной функции коленного и тазобедренного суставов). Протезированная культя бедра одной конечности на границе верхней и средней трети. Отсутствие обеих стоп на уровне костей предплюсны (уровень сустава Шопара). Врожденное укорочение любого сегмента и всей нижней конечности в целом более чем на 3 см в возрасте 0 - 3 года, более чем на 6 см в возрастном периоде 6 - 17 лет (по сравнению со здоровой) при отсутствии других аномалий конечности. Иное сочетание аномалий развития конечностей с умеренным нарушением статодинамических функций
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии аномалии развития двух конечностей: отсутствие стоп с костями предплюсны, культи голеней на границе верхней и средней трети при сохранной функции коленного и тазобедренного суставов после эффективного протезирования и приобретения навыков стояния и ходьбы на протеза Культи обеих голеней при двустороннем порочном положении культи на период реконструктивного лечения и протезирования Культя бедра одной конечности на границе верхней и средней трети при сохранной функции тазобедренного сустава на период протезирования либо при наличии медицинских противопоказаний к протезированию. Аномалия развития одной верхней и одной нижней конечности до уровня

				верхней трети плеча и до границы верхней трети бедра. Аплазия одного из сегментов конечности с нарушением функции смежных суставов на период реконструктивного оперативного лечения и протезирования. Иное сочетание аномалий развития конечностей с выраженным нарушением статодинамических функций
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: культя обоих бедер и голеней на любом уровне на период протезирования и адаптации к протезам. Короткая культя обоих бедер при наличии медицинских противопоказаний к протезированию. Сочетание с другими аномалиями развития конечностей со значительно выраженным нарушением статодинамических функций
	Врожденное отсутствие стопы и пальца (пальцев) стопы	Q72.3		
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие всех фаланг пальцев обеих стоп или одной стопы с сохранными плюсневыми костями. Отсутствие пальцев до уровня нижней трети плюсневых костей с одной стороны
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие пальцев вместе с плюсневыми костями с одной стороны у детей раннего возраста на период формирования ходьбы как сложного стереотипа (до возраста 7 лет). Отсутствие пальцев вместе с плюсневыми костями с обеих сторон у детей любого возраста
	Другие врожденные аномалии верхней конечности	Q74.0		

	(конечностей) включая плечевой пояс			
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: одно- или двустороннее поражение при супинации-пронации в функционально выгодном диапазоне (от 50 - 60° до 150 - 160°) либо анкилоз в среднем положении между пронацией и супинацией (около 90 градусов)
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: одно- или двустороннее поражение при супинации менее 50 - 60°; либо анкилоз в функционально невыгодном положении
			Деформация Шпренгеля	
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: мышечная форма болезни с незначительным нарушением функции плечевого сустава при эффективности консервативного лечения; отсутствие сочетания с другими аномалиями развития конечностей или их наличие с незначительным нарушением функции пораженного сегмента (сегментов)
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведенного оперативного лечения с умеренным нарушением функции плечевого сустава в сочетании с другими аномалиями развития конечностей с умеренным нарушением функции пораженного сегмента (сегментов). После проведенного оперативного лечения с выраженным нарушением функции плечевого сустава. При наличии осложнений оперативного лечения, в том числе с повреждением плечевого сплетения
	Врожденный спондилолистез	Q76.2.	Количественная оценка степени выраженности стойких на основывается на степени спондилолистеза, оценке его стаб	

			осложнений, а также нуждаемости в оперативном лечении	
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: спондилолистез I и II степени, стабильный, без неврологической симптоматики. Отсутствие сочетания со спондилолизом. Спондилолистез III и IV степени после эффективного оперативного лечения с незначительным ограничением подвижности позвоночника
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: спондилолистез любой степени с наличием неврологических осложнений с умеренными нарушениями функций организма при неэффективности консервативного лечения
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799, B 510 - 539, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: спондилолистез любой степени с наличием неврологических осложнений с выраженными нарушениями функций организма при неэффективности консервативного лечения
	Другие пороки развития костно-мышечной системы	Q79.8		
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: гипоплазия и аплазия большой грудной мышцы, отсутствие деформации или незначительная деформация грудной клетки, отсутствие нарушений или незначительные нарушения функции

			МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	органов грудной клетки
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: левосторонняя аплазия большой грудной мышцы, отсутствие ребер слева со значительной деформацией грудной клетки с умеренными нарушениями функции органов грудной клетки. Сочетание с другими аномалиями развития конечности с нарушением функции схвата и удержания предметов
	Врожденный множественный артрогрипоз	Q74.3	Количественная оценка нарушенных функций при артрогр и укорочений верхних и нижних конечностей, выраженно приводящих к нарушению опоры и передвижения, наруше Учитываются другие аномалии развития или метаболичес центральной нервной системы	
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: дистальная форма артрогрипоза с умеренным нарушением функции схвата и удержания обеих кистей, с умеренным нарушением функции стояния и ходьбы. Генерализованная форма артрогрипоза с наличием умеренных контрактур суставов конечностей
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B 798, B 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: формирование выраженных контрактур крупных суставов верхних и нижних конечностей в функционально невыгодном положении; двусторонняя косолапость, косорукость, полный высокий двусторонний вывих бедра с выраженными нарушениями статодинамических функций. Генерализованная форма артрогрипоза с выраженными нарушениями статодинамических функций
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 789, B	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: формирование анкилозов в крупных суставах верхних и нижних конечностей в функционально невыгодном положении со значительно выраженными нарушениями статодинамических функций.

			798, B 799	Генерализованная форма артрогрипоза со значительно выраженными нарушениями статодинамических функций
	Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника Ахондрогенезия Точечная хондродисплазия Ахондроплазия Дистрофическая дисплазия Хондроэктодермальная дисплазия Спондилоэпифизарная дисплазия Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба неуточненная	Q77 Q77.0 Q77.3 Q77.4 Q77.5 Q77.6 Q77.7 Q77.8 Q77.9	Количественная оценка степени выраженности стойких на обусловленных группой врожденных наследственных забо сопровождающиеся системным поражением скелета - осте дефектами роста трубчатых костей и позвоночника провод (комбинации) поражения костно-мышечной системы, вклю дисморфизма; наличия стойкого болевого синдрома; нару суставах вследствие контрактур (от умеренной до выражен укорочения; наличия прогрессирующих деформаций с нар формированием ее функционально невыгодного положени деформаций костной системы, мобильность (фиксированн осложнений, сенсорных нарушений; заинтересованности з или их наличие с учетом частоты за календарный год; част прогрессирующем пролиферативном процессе костной тка	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: медленно прогрессирующая деформация костной системы, отставание в росте (SDS роста - 1 - 3); укорочение длины конечности до 30% от длины сегмента у детей раннего возраста, у детей школьного возраста - до 4,0 см; ограничение объема активных движений в суставах конечностей без нарушения функции схвата и удержания предметов незначительной степени с функционально выгодным положением конечности с возможностью коррекции деформации (укорочения) с помощью малосложной ортопедической обуви; незначительное ограничение подвижности без стойкого болевого синдрома, с незначительным нарушением функций конечностей.
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогрессирующая деформация костной системы, отставание в росте (SDS роста - 4); укорочение длины

			движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 430 - 439	конечности более 30% (до 50%) от длины сегмента конечности у детей раннего возраста, у детей школьного возраста - на 4,0 - 7,0 см; ограничение объема активных движений в суставах верхних и (или) нижних конечностях умеренной степени при наличии патологической деформации конечности, затрудняющих схват и удержание предметов, опору и передвижение при невозможности коррекции деформации (укорочения) с помощью малосложной ортопедической обувью; ограничение подвижности позвоночника с быстрым прогрессированием деформации (более 7 градусов за год), ее мобильность, со стойким болевым синдромом, возможно, с умеренным парезом конечности (3 балла)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 430 - 439	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: быстро прогрессирующая деформация костной системы, отставание в росте (SDS роста - более 4); укорочение длины конечности более 50% от длины сегмента, у детей школьного возраста укорочение конечности более 7,0 см; ограничение объема активных движений в суставах верхних и (или) нижних конечностях выраженной степени, наличие стойких контрактур, затрудняющих схват и удержание предметов, опору и передвижение (при двустороннем поражении), выраженная деформация позвоночника со стойким болевым синдромом
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: множественные грубые деформации скелета со стойкими выраженными контрактурами в порочном положении конечностей с невозможностью самостоятельного схвата и удержания предметов, опоры и передвижения.

			и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: B 710 - 799, B 540 - 559, B 430 - 439	
	Другие остеохондродисплазии Незавершенный остеогенез Полиостозная фиброзная дисплазия Остеопетроз Прогрессирующая диафизарная дисплазия Энхондроматоз Метафизарная дисплазия Множественные врожденные экзостозы Другие уточненные остеохондродисплазии Остеохондродисплазия неуточненная	Q78 Q78.0 Q78.1 Q78.2 Q78.3 Q78.4 Q78.5 Q78.6 Q78.8 Q78.9	Количественная оценка нарушенных функций при незавер тяжести переломов костей различной локализации, от нали трубчатых костей и позвоночника; от нарушения функции контрактур), наличия и степени снижения слуха; от наруш при наличии грыж передней брюшной стенки	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие переломов длинных трубчатых костей. Отсутствие деформаций или незначительные (менее 10 градусов) деформации оси конечности или позвоночника, без нарушения или с незначительным нарушением их функций. Отсутствие или незначительное отставание в физическом развитии. Z критерий по данным денситометрии - 1,0. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма
			Нарушения нейромышечных, скелетных и	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: переломы длинных трубчатых костей. Консолидация перелома

			связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639	(переломов) с деформацией оси конечности более 10°, но менее 20°, с укорочением конечности; деформация оси позвоночника (сколиоз или кифоз 2 или 3 ст) с умеренным нарушением их функций. Умеренное отставание в физическом развитии. Z критерий по данным денситометрии - 1,0 - 2,5 Умеренные нарушения функции организма
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия повторных переломов длинных трубчатых костей с выраженными нарушениями статодинамических функций. Выраженная (20° и более) деформация оси конечности, деформация оси позвоночника с выраженным нарушением его функции. Выраженное отставание в физическом развитии. Выраженные нарушения функций организма. Z критерий по данным денситометрии < -2,5 с наличием повторных переломов длинных трубчатых костей
			Нарушения нейромышечных, скелетных и	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: повторные переломы длинных трубчатых костей при

			связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 510 - 539, B 540 - 559, B 430 - 439, B 610 - 639	незначительных двигательных и физических нагрузках. Наличие множественных металлических конструкций после проведенных операций. Выраженные деформации конечностей, требующие оперативного лечения. Значительно выраженные нарушения функции суставов конечностей (нестабильность до степени разболтанности, контрактуры). Значительно выраженная задержка физического развития. Значительно выраженные нарушения функции организма. Z критерий по данным денситометрии < -2,5
е врожденные ии (пороки ия) сомные аномалии, ссифицированные их рубриках		Q80 - Q89 Q90 - Q99	Количественная оценка нарушенных функций организма п аномалиях, не классифицированных в других рубриках, за клинико-функциональных проявлений (клинического поли зрения, слуха, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой выраженности неврологического дефицита; наличия когни судорожных пароксизмов (их вида, частоты, тяжести) и др течения заболевания. Учитываются также клинический пр нарушенных функций организма патогенетическим лечени	
	Факоматозы, не классифицированные в других рубриках	Q85		
	Другие уточненные синдромы врожденных аномалий (пороков развития), затрагивающих несколько систем	Q87		
	Синдром Дауна	Q90		
	Синдром Эдвардса и синдром Патау	Q91		
	Другие трисомии и частичные трисомии аутосом, не классифицированные в других рубриках	Q92		
	Моносомии и утраты части аутосом, не классифицированные в других рубриках	Q93		
	Сбалансированные перестройки и структурные маркеры, не	Q95		

	классифицированные в других рубриках Другие аномалии хромосом, не классифицированные в других рубриках	Q99		
			Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогредиентное течение заболевания, компенсируемое патогенетической терапией при наличии незначительных нарушений функций организма, в том числе: 0 - 3 года: незначительная задержка физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; 4 - 17 лет: незначительное когнитивное снижение, отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов; незначительные нарушения устной и письменной речи
			Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогредиентное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией при наличии умеренных нарушений функций организма, в том числе: 0 - 3 года: умеренная задержка физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; 4 - 17 лет: умеренное когнитивное снижение, умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов; умеренные нарушения устной и письменной речи

			кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	
			Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогредиентное течение заболевания с неблагоприятным прогнозом, не компенсируемое патогенетической терапией при наличии выраженных нарушений функций организма, в том числе: 0 - 3 года: выраженная задержка физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; 4 - 17 лет: наличие выраженного когнитивного снижения, выраженного снижения интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); выраженные нарушения устной и письменной речи. Нарушение контроля функции тазовых органов
			Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогредиентное течение заболевания с неблагоприятным прогнозом, не компенсируемое патогенетической терапией при наличии значительно выраженных нарушений функций организма: 0 - 3 года: значительно выраженная задержка физического, психомоторного, речевого развития, отсутствие формирования социальных навыков; 4 - 17 лет: значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34

			эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 110 - 199, B 210 - 299, B 710 - 799, B 510 - 539, B 410 - 429, B 440 - 450, B 540 - 559, B 610 - 639, B 810 - 899	баллов); отсутствие устной и письменной речи. Отсутствие контроля функции тазовых органов
		S00 - T98		
ческие и ческие ожоги глаза их внутренних в		T26 - T28		
	Термический ожог пищевода Химический ожог пищевода	T28.1 T28.6	При определении количественной оценки степени выраже пищевода необходимо учитывать вид ожога (термический, тяжелые), степень ожога, распространенность ожога, длите его результаты (степень рубцового сужения пищевода), не его, исход, наличие осложнений	
			Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода I степени или II степени после проведенного лечения с затруднением прохождения только твердой пищи, без потери массы тела
			Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени (субкомпенсация) с необходимостью планового бужирования.

				Наличие искусственного пищевода с умеренным нарушением функций пищеварительной системы
			Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, дыхательной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 440 - 449	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени и выше (декомпенсация) с нарушением приема пищи (зондовое питание, наличие гастростомы и питание через нее); наличие осложнений (свищи) с выраженными нарушениями функций организма
			Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, дыхательной системы; МКФ: B 510 - 539, B 540 - 559, B 440 - 449	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: декомпенсация пищеварения (кахексия); неустранимые тяжелые последствия болезни; неэффективность многоэтапных реконструктивно-восстановительных хирургических вмешательств
	Последствия термических и химических ожогов и отморожений	T95		
	Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности	T95.0 T95.1 T95.2 T95.3	При определении количественной оценки степени выраже термических травмах любой локализации необходимо учи ожога (отморожения); поражение других органов - верхни лечения (консервативное, реконструктивное хирургическо эффективность (приживление трансплантатов, площадь во качество образовавшихся рубцов (поверхностные, глубоки или ригидность), формирование контрактур суставов, кист дефекта, показания для реконструктивно-пластических оп организма подробно изложены в соответствующих раздела	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной,	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия термических поражений III степени на ограниченных участках туловища и конечностей с вовлечением одного-двух смежных суставов ("стягивающие рубцы") и формированием умеренной контрактуры в функционально выгодном положении

			пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия термических поражений III степени с вовлечением одного-двух смежных суставов ("стягивающие рубцы") и формированием выраженной контрактуры в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с умеренными нарушениями функций организма
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия термических поражений III степени с вовлечением 2 и более суставов ("стягивающие рубцы") и формированием резко выраженных контрактур и (или) анкилозов в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с выраженными нарушениями функций организма

			кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: B 710 - 799, B 210 - 299, B 410 - 429, B 440 - 450, B 510 - 539, B 610 - 639, B 810 - 899	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия распространенных термических поражений III степени и виде множественных порочных установок крупных суставов и ригидных деформаций скелета. Наличие осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма
	Последствия травм головы	T90		
	Последствия открытого ранения головы Последствия перелома черепа и костей лица	T90.1 T90.2		
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: дефект костей черепа размером 3 х 3 см и менее с пластикой и без нее
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: дефект костей черепа размером более 3 х 3 см при наличии пульсации твердой мозговой оболочки в области дефекта

			функций; МКФ: B 710 - 799	
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительный дефект костей черепа размером 10 х 10 см и более
дствия травм шеи и ща		T91		
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: B 710 - 799, B 610 - 639, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия неосложненных переломов позвоночника с незначительным или умеренным ограничением объема движений позвоночника, без неврологической симптоматики. Наличие стабильной металлоконструкции небольшой протяженности (в пределах одного отдела позвоночника)
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: B 710 - 799, B 610 - 639, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия осложненных переломов позвоночника с наличием неврологической симптоматики, достигающей умеренной степени. Нестабильность металлоконструкции любой протяженности после проведенного оперативного лечения
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия осложненных переломов позвоночника с выраженной неврологической симптоматикой

			системы; МКФ: B 710 - 799, B 610 - 639, B 510 - 539	
			Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: B 710 - 799, B 610 - 639, B 510 - 539	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия осложненных переломов позвоночника с полным анатомическим прерыванием спинного мозга, со значительно выраженной неврологической симптоматикой, нарушением функции тазовых органов
я травма ерической нервной ы		P14	При определении количественной оценки степени выраже родовых травмах периферической нервной системы необх (Эрба-Дюшена-проксимальный паралич верхней конечнос верхней конечности, тотальный парез), степень двигательн параличе Эрба-Дюшена); наличие патологической установ (схват и удержание предметов)	
	Паралич Эрба при родовой травме Паралич Клюмпке при родовой травме	P14.0 P14.1		
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие патологических установок конечности, незначительное ограничение движений в плечевом и в локтевом суставах, вследствие контрактуры или пареза (снижение силы мышц до 4 баллов), сохранной основной функции кисти
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренный вялый парез доминантной конечности (снижение силы мышц до 2 баллов в проксимальном, до 3 баллов в дистальном отделах), с ограничением объема активных движений, укорочением конечности (более 7 см) с нарушением схвата и удержания предметов
			Нарушение нейромышечных, скелетных и	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие движений в любой верхней конечности (плегия) с

			связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	полным отсутствием функции конечности
ы, захватывающие ько областей тела	Последствия травм верхней конечности Последствия травм нижней конечности Последствия травм, захватывающие несколько областей тела, и травм неуточненной локализации	T00 - T07 T92 T93 T94		
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие одного или двух пальцев (любых, включая I) на одной кисти. Отсутствие I пальца одной кисти на любом уровне; в том числе с пястной костью. Функциональное укорочение верхней конечности до 7 см (по сравнению со здоровой) вследствие различных причин, без нарушения функции крупных суставов конечностей, без нарушения функции кисти (схвата и удержания). Функциональное укорочение любого сегмента или всей нижней конечности в целом до 3 см (по сравнению со здоровой) в результате неправильно сросшихся переломов. Незначительные (менее 10°) деформации оси конечности в результате неправильно сросшегося перелома длинных трубчатых костей без нарушения или с незначительным нарушением их функций. Отсутствие одного или двух пальцев (любых) одной стопы или обеих стоп на любом уровне. Отсутствие пальцев обеих стоп или одной стопы с сохранными плюсневыми костями. Отсутствие всех пальцев до уровня

				нижней трети плюсневых костей с одной стороны. Анкилоз одного сустава в функционально выгодном положении. Эндопротез одного тазобедренного или одного коленного сустава (при правильном его положении и стабильности всех компонентов). Последствия изолированных переломов костей таза без нарушения целостности тазового кольца. Любые иные последствия травм конечностей в различном их сочетании с незначительными нарушениями статодинамических функций организма
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие I пальца на обеих кистях. Отсутствие двух пальцев, включая I палец, вместе с пястными костями. Отсутствие трех пальцев, исключая I палец, вместе с пястными костями. Отсутствие трех любых пальцев, включая I палец, при наличии пястных костей на одной кисти. Отсутствие всех четырех пальцев на любом уровне на одной кисти при сохранных пястных костях и наличии анатомически и функционально полноценного I пальца. Отсутствие сегмента (сегментов) верхней конечности (кисти, предплечья на границе верхней и средней трети) при сохранной функции локтевого и плечевого суставов. Отсутствие сегмента (сегментов) нижней конечности (стопы, голени на границе верхней и средней трети) при сохранной функции коленного и тазобедренного суставов. Отсутствие стопы на уровне костей предплюсны с обеих сторон у детей любого возраста. Отсутствие стопы на уровне костей предплюсны или на уровне нижней

				трети плюсневых костей с одной стороны у детей раннего возраста на период формирования ходьбы как сложного стереотипа. Протезированная культя бедра одной конечности при сохранной функции тазобедренного сустава (при хорошей адаптации к протезу и приобретении навыков ходьбы на нем) с уровнем двигательной активности 2 или выше. Укорочение нижней конечности в целом на 4 см и более (по сравнению со здоровой) или деформация оси конечности более 10°, но менее 20° с умеренным нарушением их функций в результате неправильно сросшихся переломов. Анкилоз одного сустава в функционально невыгодном положении. Эндопротез двух тазобедренных или двух коленных суставов, эндопротез тазобедренного сустава на одной конечности и эндопротез коленного сустава на другой конечности (при правильном их положении и стабильности всех компонентов). Последствия переломов костей таза с нарушением целостности тазового кольца и повреждением крестцово-подвздошного сочленения с неврологическими осложнениями (с умеренным парапарезом, монопарезом, выраженным в проксимальных, умеренным в дистальных отделах нижней конечности); Любые иные последствия травм конечностей в различном их сочетании с умеренным нарушением статодинамических функций организма
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие двух пальцев, включая I палец, вместе с пястными костями на обеих кистях. Отсутствие трех пальцев, исключая I

			(статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	палец, вместе с пястными костями на обеих кистях. Отсутствие четырех пальцев на обеих кистях на уровне головок пястных костей при наличии анатомически и функционально полноценного I пальца; Короткая культя плеча, экзартикуляция на уровне плечевого сустава при сложности или невозможности протезирования; на период протезирования и адаптации к протезу. Культя обеих голеней на границе верхней и средней трети на период протезирования и адаптации к протезам. Культя бедра одной конечности на период протезирования и адаптации к протезу. Культя одной верхней и одной нижней конечностей на период протезирования и адаптации к протезу. Любые иные последствия травм конечностей в различном их сочетании с выраженным нарушением статодинамических функций организма
			Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: B 710 - 799	Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие трех пальцев с пястными костями, включая I палец, на обеих кистях. Отсутствие всех пальцев на обеих кистях. Отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (обеих кистей, предплечий, обоих плеч); Отсутствие обеих голеней при двустороннем функционально невыгодном положении культи на период реконструктивного оперативного лечения и протезирования. Культи обоих бедер на любом уровне на период протезирования и адаптации к протезам. Короткая культя обоих бедер при наличии медицинских противопоказаний к

				протезированию. Отсутствие трех конечностей на любом уровне в различных сочетаниях. Любые иные последствия травм конечностей в различном их сочетании со значительно выраженным нарушением статодинамических функций организма

<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

<2> Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, одобренная на пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 22 мая 2001 г.